

2024 年广西壮族自治区阳朔县《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题真题题库及答案【精选题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下述保肝药在静脉滴注时必须用不含电解质的溶液稀释的是

- A: 还原型谷胱甘肽
- B: 多烯磷脂酰胆碱
- C: 复方甘草酸苷
- D: 门冬氨酸钾镁

答案：B

2. 作用于 DNA 拓扑异构酶 II 的抗肿瘤药物是

- A: 顺铂
- B: 依托泊苷
- C: 来曲唑
- D: 紫杉醇

答案：B

3. 对女性能促进和维持黄体功能使黄体合成孕激素，对男性能使垂体功能不足者的睾丸产生雄激素，促使睾丸下降和男性第二性征的发育，从妊娠期妇女尿中提取的促性腺激素类药物是

- A: 溴隐亭
- B: 双炔失碳酯
- C: 戈那瑞林
- D: 绒促性素

答案：D

4. 患者，男，17 岁。拔牙 2 天后出现寒战、高热，伴咳嗽、咳痰，迁延未愈。12 天后突然咳出大量脓臭痰及坏死组织，并有咯血，来诊。查体：T39℃，脉搏 89 次/分，右肺部叩诊呈浊音，可于右肺底听到湿啰音。实验室检查：WBC $28 \times 10^9/L$

A: 咳出的痰进行细胞培养

B: 通过环甲膜穿刺吸取痰液，进行痰涂片和需氧、厌氧菌检查

C: 咳出的痰直接涂片

D: 痰细胞学检查

答案：B

5. 以下关于 PPI 用法用量的描述，错误的是

A: 艾司奥美拉唑口服用于 Hp 根除时，一次 40mg，一日 2 次

B: 奥美拉唑口服用于 Hp 根除时，一次 40mg，一日 2 次

C: 泮托拉唑口服用于 Hp 根除时，一次 40mg，一日 2 次

D: 泮托拉唑静脉给药用于急性上消化道出血时，一次 40mg~80mg，每日 1~2 次

答案：B

6. 属于时间依赖性且短 PAE 的大环内酯类药是

A: 克拉霉素

B: 氨曲南

C: 阿奇霉素

D: 红霉素

答案：D

7. 可用于降低眼压的药物是()

- A: 利福平
- B: 阿托品
- C: 左氧氟沙星
- D: 卡替洛尔

答案：D

8. 临床作为控制复发和阻止疟疾传播的首选药的药物是()。

- A: 氯喹
- B: 奎宁
- C: 甲硝唑
- D: 伯氨喹

答案：D

9. 关于应对顺铂所致肾毒性的措施，下列说法错误的是

- A: 定期检测电解质、肾功能，同时观察 24h 尿量及尿颜色
- B: 必要时给予碳酸氢钠碱化尿液和别嘌醇
- C: 使用时应充分水化，并及时给予利尿剂
- D: 肾功能不全者可以使用

答案：D

10. (2016 年真题) 属于钠通道阻滞剂的抗心律失常药是

- A: 美托洛尔
- B: 利多卡因
- C: 硝酸甘油
- D: 索他洛尔

答案：B

11. 使用后可出现口腔苦味

- A: 利巴韦林
- B: 四环素可的松
- C: 更昔洛韦
- D: 氯霉素

答案：D

12. (2015 年真题) 属于 α -葡萄糖苷酶抑制剂的是 ()。

- A: 二甲双胍
- B: 阿卡波糖
- C: 罗格列酮
- D: 西格列汀

答案：B

13. 下述药物用于治疗消化性溃疡时，不属于抑制胃酸分泌的药物是

- A: 奥美拉唑
- B: 氢氧化铝
- C: 雷尼替丁
- D: 泮托拉唑

答案：B

14. (2018 年真题) 2 岁以下儿童用药可能会发生致死性肝损害, 临床用药需要重点关注的抗癫痫药是 ()

- A: 丙戊酸钠
- B: 苯巴比妥
- C: 苯妥英钠
- D: 氯硝西洋

答案：A

15. 患者，男性 35 岁，大面积烧伤后铜绿假单胞菌感染，同时伴肾功能严重损害，应选用的药物是

- A: 庆大霉素
- B: 林可霉素
- C: 氯霉素
- D: 哌拉西林

答案：D

16. 治疗阴道滴虫病的首选药是（）。

- A: 阿苯达唑
- B: 甲硝唑
- C: 吡喹酮
- D: 噻嘧啶

答案：B

17. （2019 年真题）长期大量使用可致泌尿系统尿酸盐、半胱氨酸盐或草酸盐结石的维生素是（）

- A: 维生素 A
- B: 维生素 B2
- C: 维生素 B6
- D: 维生素

答案：D

18. 适用心绞痛患者的钙通道阻滞剂药物是

- A: 硝酸甘油
- B: 普萘洛尔
- C: 哌唑嗪
- D: 硝苯地平

答案：D

19. 患者，男，60 岁，诊断为冠心病，经皮冠状动脉介入术置入支架。医生给予氯吡格雷、阿司匹林抗血小板治疗。

- A: 快代谢型患者
- B: 超快代谢型患者
- C: 慢代谢型患者
- D: 中间代谢型患者

答案：C

20. 细胞内液的主要阳离子是

- A: 钙
- B: 钾
- C: 钠
- D: 镁

答案：B

21. 患者，男，70 岁。进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示胃多发性溃疡(A

- A: 埃索美拉唑钠
- B: 美托洛尔
- C: 替米沙坦
- D: 胶体果胶铋胶囊

答案：D

22. 患者，女，63 岁。急性心肌梗死行经皮冠状动脉介入（PCI）治疗，术后为预防支架内血栓形成，常与阿司匹林联合使用的药物是

- A: 奥美拉唑

- B: 华法林
- C: 双氯芬酸
- D: 氯吡格雷

答案：D

23. 阿司匹林与华法林合用

- A: 心源性水肿
- B: 头晕、头痛、血压下降
- C: 抗凝血作用增强
- D: 诱发胃肠道溃疡出血

答案：C

24. 患者女，55 岁。晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院，查体：138 / 90mmHg，心率 120 次 / 分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

- A: 4 周
- B: 1 周
- C: 2 周
- D: 3 周

答案：C

25. 口服吸收差，血药浓度低，仅适用于肠道感染及下尿路感染的是()

- A: 呋喃唑酮
- B: 磺胺嘧啶
- C: 甲氧苄啶
- D: 诺氟沙星

答案：A

26. 关于替加环素的使用，错误的是

- A: 8 岁以下儿童禁用替加环素
- B: 替加环素是 P—gp 的底物
- C: 替加环素抑制 CYP1A2、2C8、2C9、2C19、2D6 和 3A4 介导的药物代谢
- D: 肾功能不全或接受血液透析患者无需对替加环素进行剂量调整

答案：C

27. 可用于急慢性支气管炎的治疗，还能用于环磷酰胺出血性膀胱炎治疗的药物是

- A: 羧甲司坦
- B: 乙酰半胱氨酸
- C: 氨溴索
- D: 溴己新

答案：B

28. 通过保护胃黏膜起到抗消化性溃疡目的的药物是

- A: 西咪替丁
- B: 硫糖铝
- C: 碳酸钙
- D: 奥美拉唑

答案：B

29. 治疗绝经后妇女的骨质疏松选用

- A: 阿仑膦酸钠
- B: 阿法骨化醇
- C: 鲑降钙素
- D: 奥利司他

答案：A

30. 患者，男性，46 岁，经常头痛，头晕近 8 年。2 天来头痛加重，伴有恶心、呕吐送往急诊。查体：神志模糊，血压 230 / 120mmHg。尿蛋白(++)，尿糖(+)。入院治疗，经处理，血压仍为 202 / 120mmHg，且气急不能平卧，心率 108 次 / 分，早搏 3 次 / 分。两肺底有湿啰音。

A: 可使用微量输液泵

B: 使用 5%葡萄糖注射液配制后保存与应用不应超过 24 小时

C: 紧急时可静脉注射

D: 在避光输液瓶中使用

答案：C

31. 不可逆地抑制血小板 I 相和 II 相聚集的药物是

A: 华法林

B: 肝素

C: 尿激酶

D: 噻氯匹定

答案：D

32. (2020 年真题) 服药期间须大量饮水，防止发生结晶尿的药物是

A: 左氧氟沙星

B: 头孢呋辛

C: 克林霉素

D: 磺胺甲噁唑

答案：D

33. 可对第八对脑神经造成损害的是()

A: 乙胺丁醇

- B: 利福平
- C: 链霉素
- D: 异烟肼

答案: C

34. 下列抗心律失常药中，属于 I a 类钠通道阻滞药的是()

- A: 奎尼丁
- B: 普罗帕酮
- C: 苯妥英钠
- D: 利多卡因

答案: A

35. 属于核苷(酸)类抗肝炎病毒药的是

- A: 恩替卡韦
- B: 司他夫定
- C: 奥司他韦
- D: 阿昔洛韦

答案: A

36. 属于多巴胺受体阻断剂的止吐药物是

- A: 甲地孕酮
- B: 甲氧氯普胺
- C: 格雷司琼
- D: 阿瑞吡坦

答案: B

37. 某患者，63 岁，诊断为"慢性支气管炎急性发作"，痰培养为"铜绿假单胞菌"，下列哪种药物对铜绿假单胞菌无效()

- A: 头孢他啶
- B: 头孢哌酮
- C: 头孢克洛
- D: 哌拉西林

答案：C

38. 可用于烧伤及伤后感染的是()

- A: 磺胺甲噁唑
- B: 磺胺米隆
- C: 柳氮磺吡啶
- D: 磺胺嘧啶

答案：D

39. 可用于治疗老年骨质疏松，属于维生素 D 代谢产物的是

- A: 利拉鲁肽
- B: 葡萄糖酸钙
- C: 骨化三醇
- D: 瑞格列奈

答案：C

40. 可诱发哮喘且变异型心绞痛不宜选用的药物是

- A: 硝酸甘油
- B: 硝苯地平
- C: 洛伐他汀
- D: 普萘洛尔

答案：D

41. (2016 年真题) 患者，女，26 岁，妊娠 3 个月，因肺炎住院治疗，应禁用的抗菌药物是

- A: 青霉素 G
- B: 阿莫西林
- C: 头孢氨苄
- D: 左氧氟沙星

答案：D

42. 可引起心率加快，瞳孔散大、视物模糊及中枢镇静作用的药物是

- A: 后马托品
- B: 东莨菪碱
- C: 山莨菪碱
- D: 阿托品

答案：B

43. 以下通过增加组织与肝脏对胰岛素的敏感性而降糖的是()

- A: 利拉鲁肽
- B: 二甲双胍
- C: 瑞格列奈
- D: 吡格列酮

答案：D

44. 咪唑类药物的抗真菌作用机制是()

- A: 影响真菌细胞膜通透性
- B: 抑制以 DNA 为模板的 RNA 多聚酶，阻碍 mRNA 合成
- C: 竞争性抑制鸟嘌呤进入 DNA 分子中，阻断核酸合成
- D: 影响二氢叶酸合成

答案：A

45. 关于外用糖皮质激素类药物的说法错误的是

- A: 外用糖皮质激素可增加感染风险
- B: 外用糖皮质激素具有抗炎、抗过敏等作用
- C: 治疗全身性或严重过敏疾病时,不宜合用口服抗过敏药
- D: 外用糖皮质激素不应长期、大面积应用

答案: C

46. (2021 年真题) 患者, 男, 46 岁。新诊断为高血压, 最高血压 155/95mmHg, 心率 100 次 1 分, 交感神经兴奋性明显增高, 首选的治疗药物是 ()

- A: 硝酸甘油
- B: 氢氯噻嗪
- C: 美托洛尔
- D: 氯沙坦

答案: C

47. 下列唯一被批准用于临床的选择性胆固醇吸收抑制剂是

- A: 非诺贝特
- B: 瑞舒伐他汀
- C: 依折麦布
- D: 盐酸

答案: C

48. 奥司他韦治疗流行性感冒时, 首次用药的时间是

- A: 出现流感症状 72 小时内
- B: 出现流感症状 96 小时内
- C: 出现流感症状 100 小时内

D: 出现流感症状 48 小时内

答案: D

49. 与其他 NSAID 合用时疗效并不增强，但可增加其他部位出血风险的是

A: 吲哚美辛

B: 塞来昔布

C: 对乙酰氨基酚

D: 阿司匹林

答案: D

50. 糖皮质激素禁用于低血钾患者是因为

A: 水钠潴留

B: 抑制免疫功能只抗炎不抗菌

C: 促进胃酸分泌

D: 抑制蛋白质合成

答案: A

51. 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的调节血脂药是()

A: 辛伐他汀

B: 依折麦布

C: 非诺贝特

D: 烟酸

答案: A

52. 患者女性，30 岁。以肺结核收治入院，给予抗结核治疗，链霉素肌肉注射后，10 分钟后患者出现头晕、耳鸣、乏力、呼吸困难等症状，继而出现意识模糊、晕倒、血压下降、心律失常等症状。

- A: 葡萄糖酸钙
- B: 葡萄糖
- C: 胺碘酮
- D: 利多卡因

答案：A

53. 红霉素易被胃酸破坏，口服吸收少，故临床一般服用其肠衣片或酯化物。

- A: 克拉霉素
- B: 罗红霉素
- C: 万古霉素
- D: 红霉素

答案：D

54. 患者，女性，57 岁。高血压病史 20 年，伴慢性心功能不全，给予地高辛每日维持量治疗，突然出现窦性心动过缓，宜选用的治疗药物是

- A: 维拉帕米
- B: 阿托品
- C: 苯妥英钠
- D: 普萘洛尔

答案：B

55. 磷霉素的主要抗菌作用机制是

- A: 增加细菌胞浆膜的通透性
- B: 抑制细菌蛋白质合成
- C: 抗叶酸代谢
- D: 干扰细菌细胞壁的合成

答案：D

56. 通过抑制 5-HT 和去甲肾上腺素（NA）再摄取，增加突触间隙 5-HT 和 NA 浓度从而增强中枢 5-HT 和 NA 能神经功能而发挥抗抑郁作用的药物是

- A: 舍曲林
- B: 度洛西汀
- C: 阿米替林
- D: 吗氯贝胺

答案：B

57. 主要通过选择性抑制 5-HT 再摄取而引起抗抑郁作用的药物是（）

- A: 帕罗西汀
- B: 度洛西汀
- C: 吗氯贝胺
- D: 马普替林

答案：A

58. 可用于肝硬化腹水以及加速某些毒物排泄的药物是

- A: 乙酰唑胺
- B: 氨苯蝶啶
- C: 托拉塞米
- D: 氢氯噻嗪

答案：C

59. 老年患者长期大剂量使用可引起骨折的药物是（）

- A: 奥美拉唑
- B: 替普瑞酮

C: 胶体果胶铋

D: 复方碳酸钙

答案: A

60. 患者，女，49 岁。身高 164cm，体重 55kg，因更年期月经不调，经药物治疗效果不佳，而行“子宫切除术”。无药物过敏史。

A: 替考拉宁

B: 克拉霉素

C: 米诺环素

D: 拉氧头孢

答案: D

61. 只对癌细胞起作用而对正常体细胞几乎没有伤害的是

A: 曲妥珠单抗

B: 氟他胺

C: 他莫昔芬

D: 阿那曲唑

答案: A

62. 属于人体必需、人体不能合成或合成速度不能满足人体需要

A: 赖氨酸

B: 复方氨基酸注射液(3AA)

C: 精氨酸

D: 复方氨基酸(18AA)

答案: A

63. 红霉素在下列哪种组织中浓度较低

A: 胆汁

B: 脑

C: 肝

D: 肺

答案：B

64. (2018 年真题) 可用于静脉给药的胰岛素/胰岛素类似物是 ()

A: 预混胰岛素注射液

B: 甘精胰岛素注射液

C: 普通胰岛素注射液

D: 精蛋白锌胰岛素注射液

答案：C

65. 原形从肾脏排泄率最高的喹诺酮类药物是 ()

A: 培氟沙星

B: 环丙沙星

C: 氧氟沙星

D: 诺氟沙星

答案：C

66. 通过与寄生虫肠细胞微管蛋白特异性结合而干扰其细胞微管形成，可使寄生虫肠道超微结构退化，从而破坏寄生虫对葡萄糖的吸收及消化功能，最终导致寄生虫死亡的药物是

A: 哌嗪

B: 左旋咪唑

C: 阿苯达唑

D: 甲苯咪唑

答案：D

67. 治疗间日疟和三日疟首选的联合方案是

- A: 静脉滴注奎宁
- B: 咯萘啶或甲氟喹
- C: 氯喹+伯氨喹
- D: 乙胺嘧啶+磺胺药

答案：C

68. 氯吡格雷与奥美拉唑因竞争共同的肝药酶而避免联合应用，该肝药酶是

- A: CYP1A2
- B: CYP2C19
- C: CYP2E1
- D: CYP2D6

答案：B

69. 抑制碳酸酐酶，利尿作用弱的药物是

- A: 氨苯蝶啶
- B: 呋塞米
- C: 乙酰唑胺
- D: 氢氯噻嗪

答案：C

70. 用于单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的 2 型糖尿病患者宜首选

- A: 格列喹酮
- B: 低精蛋白锌胰岛素
- C: 二甲双胍
- D: 普通胰岛素

答案：C

71. 膦甲酸钠不能与静脉滴注喷他脒联合使用，以免发生

- A: 高钾血症
- B: 低钙血症
- C: 高钙血症
- D: 低钾血症

答案：B

72. 与可待因合用，不仅加重便秘，还可增加麻痹性肠梗阻和尿潴留危险的是

- A: 美沙酮
- B: 阿托品
- C: 硫酸镁
- D: 哌替啶

答案：B

73. 患者，女，63 岁，因心绞痛急诊就医，诊断为 ST 段抬高心肌梗死，血压 175/95mmHg，心率 110 次/分，该患者适使用的药物是

- A: 氨氯地平
- B: 硝普钠
- C: 贝那普利
- D: 美托洛尔

答案：D

74. 对贝特类（苯氧芳酸类）的叙述正确的是

- A: LDL-CC 主要用于原发性高胆固醇血症
- B: 可降低 HDL-C
- C: 可升高 T

D: 能明显降低血浆 TG

答案: D

75. (2016 年真题) 可用于治疗甲癣、足癣、体癣和股癣等浅表性真菌感染的药品是

- A: 氟胞嘧啶
- B: 两性霉素 B
- C: 特比萘芬
- D: 伏立康唑

答案: C

76. 长期服用可导致结肠黑变病的药物是

- A: 番泻叶
- B: 聚乙二醇
- C: 乳果糖
- D: 液体石蜡

答案: A

77. 下列哪个选项不属于十一酸睾酮的适应症

- A: 乳腺癌转移的姑息性治疗
- B: 女性儿童体质性青春期延迟
- C: 原发性或继发性睾丸功能减退
- D: 前列腺增生引起的排尿障碍

答案: D

78. 对大多数肠杆菌科细菌和厌氧菌有活性，但对铜绿假单胞菌、不动杆菌及革兰阳性菌（尤其是肠球菌和耐青霉素肺炎球菌）的活性不及其他碳青霉烯类药物的是

- A: 亚胺培南
- B: 美罗培南
- C: 厄他培南
- D: 西司他丁

答案：C

79. 体内缺乏维生素 E 会导致

- A: 夜盲症
- B: 脚气病
- C: 不孕症
- D: 佝偻病

答案：C

80. (2020 年真题) 曲妥珠单抗的适应证是

- A: 人表皮生长因子受体-2 (HER-2) 过度表达的乳腺癌
- B: 转移性结直肠癌
- C: 晚期恶性黑色素瘤
- D: 表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变阴性的转移性非小细胞肺癌

答案：A

81. (2018 年真题) 同时具有短效和长效 (双时相) 作用的胰岛素/胰岛素类似物是 ()

- A: 精蛋白锌胰岛素注射液
- B: 甘精胰岛素注射液
- C: 预混胰岛素注射液
- D: 普通胰岛素注射液

答案：C

82. 长期服用雌激素可导致

- A: 高血压
- B: 阴道出血
- C: 脱发
- D: 体重下降

答案：B

83. 青霉素 G

- A: 对 G⁺、G⁻球菌，特别是对 G⁻杆菌有效
- B: 对 G⁺、G⁻球菌及螺旋体等有效
- C: 对支原体有效
- D: 抗菌作用强，对铜绿假单胞菌、厌氧菌有效

答案：B

84. 柔红霉素可引起心脏毒性，临床应用的解毒方案是

- A: 在用柔红霉素前 30 分钟，使用柔红霉素 10 倍量的右雷佐生
- B: 在用柔红霉素的同时，使用柔红霉素等量的右雷佐生
- C: 在用柔红霉素后 30 分钟，使用柔红霉素两倍量的右雷佐生
- D: 在用柔红霉素前 30 分钟，使用柔红霉素两倍量的氟马西尼

答案：A

85. 煤焦油治疗银屑病的机制是

- A: 能抑制皮肤角质形成细胞的过度增生和诱导其分化，从而使银屑病表皮细胞的增生和分化得到纠正
- B: 与维 A 酸细胞核受体有较高亲和力
- C: 可抑制表皮细胞的有丝分裂，使皮肤增生速率恢复正常
- D: 通过角蛋白表达正常化，促进角质细胞末端分化

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/937112112052010024>