

1、以下哪些组织或器官易被误认为是腹部肿块?(多选)

- A、充盈膀胱
- B、妊娠子宫
- C、肝脏和游离肾
- D、脾脏囊肿
- E、腰椎

您的答案：没有答题 正确答案：A,B,C,E

2、MRI 在显示肿瘤钙化、骨质的细微破坏和硬化方面优于 CT。(单选)

- A、正确
- B、错误

您的答案：没有答题 正确答案：B

3、生命质量的健康新概念不仅仅是在没有患病和衰弱的基础上构建的，而且是现代医学模式的体现。(单选)

- A、正确
- B、错误

您的答案：没有答题 正确答案：A

4、治疗肿瘤及肿瘤化疗相关性贫血的 2011 年指南提到，有治愈意图的骨髓抑制性化疗时，不推荐使用 EPO。包括的病种有 (多选)

- A、晚期乳腺癌
- B、霍奇金淋巴瘤
- C、非霍奇金淋巴瘤
- D、睾丸癌
- E、早期的非小细胞肺癌

您的答案：没有答题 正确答案：B,C,D,E

5、直接攻击 DNA 或抑制其合成及功能的药物属于生物反应调节剂。(单选)

- A、正确
- B、错误

您的答案：没有答题 正确答案：B

6、肿瘤的全身表现 由下列哪些因素引起?(多选)

- A、肿瘤转移
- B、副癌综合征
- C、肿瘤迅速生长而消耗大量的营养物质以及肿瘤分泌的细胞因子
- D、肿瘤组织坏死或合并感染
- E、瘤体迅速增长

您的答案：没有答题 正确答案：A,B,C,D

7、胃癌定性诊断方法是什么?(单选)

- A、纤维胃镜检查 (病理学检查)
- B、钡餐检查
- C、CT
- D、MRI

您的答案：没有答题 正确答案：A

8、ABO 血型系统的凝集素（抗体）存在于血清中，凝集原（抗原）存在于红细胞膜上，ABO 血型以红细胞膜上所携带的凝集原（抗原）来决定。对于 A 型血来说，以下哪种说法不正确：（单选）

- A、血清中无 A 抗体（凝集素）
- B、红细胞膜上有 A 抗原（凝集原）
- C、血清中有 B 抗体（凝集素）
- D、红细胞膜上有 B 抗原（凝集原）

您的答案：没有答题 正确答案：D

9、造血干细胞的特性：（多选）

- A、高度自我更新能力
- B、多向分化潜能
- C、静止性
- D、不均一性
- E、表面标记

您的答案：没有答题 正确答案：A,B,C,D,E

10、成人红细胞在发育过程中的主要变化是（多选）

- A、红细胞体积逐渐变小
- B、红细胞体积逐渐变大
- C、红细胞核逐渐消失
- D、红细胞核变大
- E、血红蛋白量逐渐减少

您的答案：没有答题 正确答案：A,C

11、在中国，男性的正常血红蛋白水平下限是（多选）

- A、11g/dl
- B、12g/dl
- C、13g/dl
- D、120g/L

您的答案：没有答题 正确答案：B,D

12、为什么肿瘤化疗患者易发生贫血？（多选）

- A、某些化疗药物导致的呕吐和进食减少引起营养不良
- B、某些化疗药物损伤肾功能，而肾脏是成人最主要的 EPO 分泌器官。
- C、某些化疗药物具有骨髓抑制作用。
- D、某些化疗药物导致铁的吸收利用差，而铁是 Hb 合成的主要原料

您的答案：没有答题 正确答案：A,B,C

13、以下哪种说法是对的：（多选）

- A、红细胞是血液中数量最多的血细胞。
- B、成熟红细胞有核和细胞器。
- C、成熟红细胞为双凹碟形。
- D、网织红细胞有核。

您的答案：没有答题 正确答案：A,C

14、适龄期妇女贫血大部分属于： (单选)

- A、慢性炎症性贫血
- B、缺铁性贫血
- C、慢性失血性贫血
- D、再生障碍性贫血

您的答案：没有答题 正确答案：B

15、肿瘤是局部组织的 (单选)

- A、变性
- B、化生
- C、畸形
- D、异常增生
- E、再生

您的答案：没有答题 正确答案：D

16、由于 36000U 制剂辅料中不含人血白蛋白，因此 (多选)

- A、制剂更稳定
- B、促红素的吸收更快
- C、发生 HCV,HBV 的风险更低
- D、发生过敏反应的可能性更小

您的答案：没有答题 正确答案：C,D

17、子宫内膜癌的早期诊断方法是： (单选)

- A、阴道脱落细胞学检查
- B、宫颈刮片细胞学检查
- C、诊断性刮宫
- D、分段诊断性刮宫（最严格病理学检查）

您的答案：没有答题 正确答案：D

18、关于再生障碍性贫血，下列说法错误的是 (单选)

- A、全血细胞减少
- B、骨髓在某些部位可见增生灶
- C、骨髓非造血细胞增多
- D、巨核细胞多数增加
- E、骨髓铁染色细胞外铁增加

您的答案：没有答题 正确答案：D

19、急性白血病可包括： (多选)

- A、急性非淋巴细胞白血病（或急性髓性白血病，ANLL）
- B、急性淋巴细胞白血病(ALL)
- C、慢粒
- D、MDS

您的答案：没有答题 正确答案：A,B

20、间叶组织包括： (多选)

- A、肌肉脂肪组织
- B、成纤维组织
- C、血管、淋巴管
- D、骨及软骨组织
- E、淋巴造血组织

您的答案：没有答题 正确答案：A,B,C,D,E

21、原发免疫性血小板减少症的表现有： (多选)

- A、出血时间延长
- B、凝血时间延长
- C、脾脏不增大或轻度增大
- D、活化部分凝血活酶时间延长
- E、以上都不对

您的答案：没有答题 正确答案：A,C

22、生物细胞分裂的直接意义是：(单选)

- A、产生新个体
- B、增强生活力
- C、增加变异性
- D、改变遗传性

您的答案：没有答题 正确答案：A

23、肿瘤药物临床试验中，常用“有效率”这个指标来评价该药物的抗肿瘤疗效。有效率实际是指 (单选)

- A、CR
- B、PR
- C、CR+PR
- D、CR+PR+SD

您的答案：没有答题 正确答案：C

24、年龄超过 50 岁的男性发现全身多发性骨转移癌时，应首先考虑的原发肿瘤是： (单选)

- A、胃癌
- B、肠癌
- C、肺癌
- D、前列腺癌

您的答案：没有答题 正确答案：D

25、常见的子宫切除术有： (多选)

- A、经腹子宫切除术
- B、经腹腔镜子宫切除术
- C、经阴道子宫切除术
- D、经背子宫切除术

您的答案：没有答题 正确答案：A,B,C

1、调节红细胞生成的主要体液因素是 (单选)

- A、胆固醇
- B、促红细胞生成素
- C、雌激素
- D、红细胞提取物

您的答案：没有答题 正确答案：B

2、经腹子宫切除术大约术中失血为： (单选)

- A、200-300ml
- B、500-800ml
- C、1000-1500ml
- D、1500-2000ml

您的答案：没有答题 正确答案：B

3、由于骨与软组织的 X 线成像有良好的自然对比性，且检查方法简便、费用较低，所以，X 线平片仍是目前骨肿瘤常用的首选影像检查方法。 (单选)

- A、正确
- B、错误

您的答案：没有答题 正确答案：A

4、以下哪些疾病可致贫血： (多选)

- A、急性失血
- B、消化道溃疡
- C、钩虫病

您的答案：没有答题 正确答案：A,B,C

5、乳腺癌属于妇科恶性肿瘤。 (单选)

- A、正确
- B、错误

您的答案：没有答题 正确答案：B

6、以下哪种肿瘤外科手术不作为首选方案? (单选)

- A、舌癌
- B、颊癌
- C、腭部混合瘤
- D、鼻咽癌

您的答案：没有答题 正确答案：D

7、化疗除了给病人带来强烈的不适外，化疗的副作用还会影响患者的外在形象。 (单选)

- A、正确
- B、错误

您的答案：没有答题 正确答案：A

8、继发性血小板减少症可见于： (多选)

- A、再生障碍性贫血
- B、脾功能亢进
- C、MDS（骨髓增生异常综合征）
- D、白血病
- E、SLE（红斑狼疮）
- F、药物性免疫性血小板减少

您的答案：没有答题 正确答案：A,B,C,D,E,F

9、益比奥 36000IU/ml/支与 10000IU/ml/支的区别在于（多选）

- A、主药促红素生物学特性不同
- B、主药促红素的含量不同
- C、前者不含人血白蛋白
- D、剂量调整的原则不同

您的答案：没有答题 正确答案：B,C

10、以下哪些说法是对的？（多选）

- A、红细胞可以输送 O₂ 和 CO₂
- B、红细胞可以输送 N₂ 和 CO₂
- C、血小板具有止血功能
- D、血小板具有凝血功能

您的答案：没有答题 正确答案：A,C,D

11、胆囊癌在组织学上最多见的是下列哪种类型？(单选)

- A、未分化癌
- B、腺鳞癌
- C、腺癌
- D、鳞癌

您的答案：没有答题 正确答案：C

12、最常引起肝、脾、淋巴结肿大及脑膜白血病的是（单选）

- A、急性粒细胞白血病
- B、急性单核细胞白血病
- C、急性淋巴细胞白血病
- D、慢性粒细胞白血病
- E、慢性淋巴细胞白血病

您的答案：没有答题 正确答案：C

13、益比奥现有规格中，哪个规格在制剂辅料中不含人血白蛋白？（单选）

- A、3000U
- B、4000U
- C、10000U
- D、36000U

您的答案：没有答题 正确答案：D

14、影响肿瘤患者生活质量的因素有 (多选)

- A、癌痛
- B、贫血
- C、疲乏
- D、失眠

您的答案：没有答题 正确答案：A,B,C,D

15、随着年纪的增加，老年人的贫血发生率要远高于年轻人。 (单选)

- A、正确
- B、错误

您的答案：没有答题 正确答案：A

16、急性溶血性贫血患者外周血中不会出现 (单选)

- A、幼稚红细胞
- B、网织红细胞减少
- C、MCHC 正常
- D、MCV 正常
- E、MCH 正常

您的答案：没有答题 正确答案：B

17、近距离放疗最常为： (单选)

- A、单独使用
- B、外照射补充
- C、术后补充
- D、术前放疗用

您的答案：没有答题 正确答案：B

18、特比澳的说明书用法是什么？ (单选)

- A、上次化疗血小板值 $\leq 50 \times 10^9/L$ ，本次化疗后 6-24 小时皮下注射特比澳
- B、上次化疗血小板值 $\leq 75 \times 10^9/L$ ，本次化疗后 6-24 小时皮下注射特比澳
- C、本次化疗血小板值 $\leq 50 \times 10^9/L$ 时皮下注射特比澳
- D、本次化疗血小板值 $\leq 75 \times 10^9/L$ 时皮下注射特比澳

您的答案：没有答题 正确答案：B

19、骨髓增生异常综合征 (myelodysplastic syndromes, MDS) 的分型包括： (多选)

- A、难治性贫血 (refractory anemia, RA)
- B、环形铁粒幼细胞性难治性贫血 CRA with ringed sideroblasts. RAS)
- C、难治性贫血伴原始细胞增多 CRA with excess blasts, RAEB)
- D、难治性贫血伴原始细胞增多转变型 (RAEB in transformation .RAEB-t)
- E、慢性粒-单核细胞性白血病 C chronic myelomonocytic leukemia, CMML)

您的答案：没有答题 正确答案：A,B,C,D,E

20、益比奥为生物制剂，不可在常温下保存，但是可以冷冻保存，以保持其生物活性。 (单选)

- A、正确
- B、错误

您的答案：没有答题 正确答案：B

21、以下关于骨髓增生异常综合征(myelodysplastic syndromes , MDS)的描述错误的是： (单选)

- A、原发性 MDS 的病因尚不明确
- B、继发性 MDS 见于烧化剂、放射线、有机毒物等密切接触者
- C、MDS 是起源于造血干细胞的克隆性疾病。异常克隆细胞在骨髓中分化、成熟障碍.出现病态造血，在骨髓原位或释放入血后不久被破坏.导致无效造血
- D、部分 MDS 患者可发现有原癌基因突变或染色体异常
- E、MDS 无基因异常

您的答案：没有答题 正确答案：E

22、EPO 对 PFS 和 OS 的影响尚有争议，不建议在肿瘤患者不贫血的情况下预防性应用 EPO。该说法是否正确？ (单选)

- A、正确
- B、不正确

您的答案：没有答题 正确答案：A

23、哪些患者是禁用 EPO 的？ (多选)

- A、未控制的重度高血压患者
- B、有血栓高危因素者
- C、合并感染者，宜控制感染后再使用本品
- D、对 EPO 及其他哺乳动物细胞衍生物过敏者

您的答案：没有答题 正确答案：A,C,D

24、一旦发现膀胱癌应尽早全膀胱切除。 (单选)

- A、正确
- B、错误

您的答案：没有答题 正确答案：B

25、血清与血浆的区别在于前者 (多选)

- A、缺乏纤维蛋白原
- B、含有较多的葡萄糖
- C、缺乏凝血酶原
- D、含大量白蛋白
- E、含有大量球蛋白

您的答案：没有答题 正确答案：A,C

1、上段食道癌首选治疗方案是： (单选)

- A、食管腔内放射治疗
- B、食管癌切除，食管胃吻合术
- C、化学治疗
- D、化学治疗加放射治疗

您的答案：没有答题 正确答案：B

2、7. 术后贫血可认为是单纯性缺铁性贫血 (单选)

- A、正确
- B、错误

您的答案：没有答题 正确答案：B

3、肿瘤相关性贫血与缺铁性贫血的区别在于： (多选)

- A、肿瘤相关性贫血患者不缺铁
- B、尽管拥有同样程度的贫血客观指标，但肿瘤相关性贫血患者较缺铁性贫血患者的 EPO 水平低
- C、肿瘤患者 Hb 和 EPO 之间的反馈调节是减弱的
- D、尽管拥有同样程度的贫血客观指标，可肿瘤患者可能更容易出现贫血症状

您的答案：没有答题 正确答案：B,C,D

4、按 NCI 贫血分级标准，10g/dL 属于 (单选)

- A、不贫血
- B、轻度贫血
- C、中度贫血

您的答案：没有答题 正确答案：B

5、临床上发现颈部转移性肿瘤时首选的诊治方案是： (单选)

- A、颈部肿块活检
- B、颈淋巴清扫
- C、放射治疗
- D、检查寻找原发灶

您的答案：没有答题 正确答案：D

6、3. EPO 有明显的术前红细胞动员作用，能够避免患者输血。 (单选)

- A、正确
- B、错误

您的答案：没有答题 正确答案：B

7、生命质量的健康新概念不仅仅是在没有患病和衰弱的基础上构建的，而且是现代医学模式的体现。 (单选)

- A、正确
- B、错误

您的答案：没有答题 正确答案：A

8、贲门痉挛病程一般较长，且症状进展缓慢，可有间歇性加重而出现吞咽困难。（单选）

- A、正确
- B、错误

您的答案：没有答题 正确答案：A

9、临床上类白血病反应最常见于（单选）

- A、严重感染
- B、恶性肿瘤骨转移
- C、有机磷农药或一氧化碳中毒
- D、急性溶血或出血
- E、外伤或大面积烧伤

您的答案：没有答题 正确答案：A

10、下列哪项不作为食管癌手术的禁忌证？（单选）

- A、声音嘶哑
- B、食管严重狭窄
- C、持续性胸背痛
- D、锁骨上淋巴结转移

您的答案：没有答题 正确答案：B

11、诊断恶性肿瘤的主要依据是：（单选）

- A、肿瘤有出血坏死
- B、肿瘤的异型性
- C、肿瘤的大小
- D、肿瘤的肉眼形态
- E、肿瘤有溃疡形成

您的答案：没有答题 正确答案：B

12、患者男性，20岁，吞咽不畅，胸骨后沉重不适，症状时轻时重，偶有呕吐，呕吐物为潴留食物。有类似病史2年，用药后症状有一定程度缓解。食管钡餐提示食管下端鸟嘴样狭窄。该病人可能的诊断是：（单选）

- A、食管癌
- B、食管良性肿瘤
- C、贲门失迟缓症
- D、食管炎

您的答案：没有答题 正确答案：C

13、应用EPO治疗MDS症状性贫血时须注意，达到靶目标值不是停药，而是减量维持治疗。该说法是否正确？（单选）

- A、正确
- B、不正确

您的答案：没有答题 正确答案：A

14、肿瘤的发生和演进是一个简单的生物学过程，涉及多因素的作用、多基因的参与和多阶

段的演变。(单选)

- A、正确
- B、错误

您的答案：没有答题 正确答案：B

15、骨髓增生异常综合征 (myelodysplastic syndromes , MDS) 的分型包括： (多选)

- A、难治性贫血 (refractory anemia , RA)
- B、环形铁粒幼细胞性难治性贫血 CRA with ringed sideroblasts. RAS)
- C、难治性贫血伴原始细胞增多 CRA with excess blasts , RAEB)
- D、难治性贫血伴原始细胞增多转变型 (RAEB in transformation .RAEB-t)
- E、慢性粒-单核细胞性白血病 C chronic myelomonocytic leukemia , CMML)

您的答案：没有答题 正确答案：A,B,C,D,E

16、再障的诊断，下列哪项不正确 (单选)

- A、发热、出血、贫血
- B、一般无肝脾和淋巴结肿大
- C、中性粒细胞碱性磷酸酶阳性率和积分降低
- D、血象表现为全血细胞减少，网织红细胞绝对值减少
- E、骨髓可呈灶性增生，但巨核细胞减少
- F、末梢血淋巴细胞比例增高

您的答案：没有答题 正确答案：C

17、促红素改善贫血的速度相对输血来讲比较慢。为了尽快让医生了解益比奥对某患者是否有效，可以推荐在治疗 1 周时测定 (单选)

- A、Hct
- B、Hb
- C、MCV
- D、Ret

您的答案：没有答题 正确答案：D

18、8. 术后贫血的原因主要有 (多选)

- A、术中失血
- B、术后慢性失血
- C、术前患者可能就处于贫血状态
- D、大手术术后有插导尿管

您的答案：没有答题 正确答案：A,B,C

19、当 epo 治疗 CRA 初期疗效欠佳时，我们需要考虑 (多选)

- A、上调 EPO 剂量
- B、酌情补充铁剂
- C、酌情补充维生素 C
- D、酌情补充维生素 B12
- E、酌情补充叶酸

您的答案：没有答题 正确答案：A,B,D,E

20、多发性骨髓瘤 (multiple myeloma, MM) 临床可发生: (多选)

- A、感染
- B、出血
- C、鼻出血、牙龈出血或和皮肤紫癜
- D、蛋白尿
- E、急、慢性肾衰竭

您的答案：没有答题 正确答案：A,B,C,D,E

21、在中国 EPO 的使用推荐等级应比欧美国家要强，主要原因在于 (单选)

- A、中国的促红素价格比国外便宜很多
- B、中国的血源更紧张
- C、在中国，输血导致病毒性肝炎的风险更高
- D、中国的医护资源更有限

您的答案：没有答题 正确答案：C

22、血红蛋白 (Hb) 的成分包括: (多选)

- A、血红素
- B、珠蛋白
- C、铁
- D、原卟啉
- E、白蛋白

您的答案：没有答题 正确答案：A,B,C,D

23、以下哪种说法是对的: (多选)

- A、成熟红细胞无核、无细胞器
- B、成熟红细胞有核、无细胞器
- C、网织红细胞无核、无细胞器
- D、网织红细胞无核、有残留细胞器

您的答案：没有答题 正确答案：A,D

24、就造血多能干细胞而言，下述概念正确的是: (多选)

- A、存在于骨髓和血液中，其形态和淋巴细胞相似
- B、在特定条件下，可在脾内形成造血结节
- C、它既能产生骨髓干细胞，又能产生淋巴细胞干细胞
- D、其增殖形式为对称性增殖（即“自杀性”增殖）

您的答案：没有答题 正确答案：A,B,C

25、FAB 是法美德协作组的简称，其创建的 MDS 分型虽然比 WHO 分型时间晚，但在临床中的接受度高。该说法正确否? (单选)

- A、正确
- B、不正确

您的答案：没有答题 正确答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/938007040141006032>