

317普通外科学模拟考试(一)

(考试时间90分钟,总分100分)

准考证号:_____姓名:_____

一、客观选择题（共50题，每题2分，共计100分）

() 1、患者，男性，40岁，因进行阑尾炎住院手术治疗，拟进行腰麻

术后1周，患者出现剧烈头痛、畏光、眩晕，可能是因为

- A、颅内感染
- B、麻醉液渗入大脑
- C、脑神经麻醉
- D、脑脊液漏
- E、粘连性蛛网膜炎

() 2、患者女，26岁。1周前当地诊断为“甲状腺功能亢进”，未进一步治疗，来院就诊，要求手术。查体：心率104次/分，血压120/70mmHg。

此时合理的处理是

- A、用镇静剂和安眠药
- B、服用硫氧嘧啶类药物
- C、应用普萘洛尔
- D、应用阿托品
- E、口服甲状腺素片
- F、口服氢化可的松

() 3、IV段

- A、尾状叶
- B、肝左外叶
- C、肝左前叶
- D、肝左后叶
- E、肝左内叶

() 4、患者男，56岁，被自行车撞伤后右膝外侧。检查发现踝关节不能主动背伸。X线检查：腓骨小头骨折。诊断首先考虑是腓骨小头骨折合并

- A、胫前肌撕裂伤
- B、腓骨长、短肌撕裂伤

C、坐骨神经损伤

D、胫神经损伤

E、腓总神经损伤

- () 5、男性，16岁，6小时前被自行车撞伤左上腹部，当时除左腹部疼痛外无其他症状。回家后逐渐出现全腹疼痛，来诊时血压75/45mmHg. (10/6kPa)，神志清楚，有全腹压痛和腹膜刺激现象，移动性浊音(+)，此病人的处理不妥当的是

A、给予杜冷丁止痛

B、留院观察

C、静脉输液

D、急诊行剖腹探查手术

E、B超检查

- () 6、患者，男性，50岁，因臀部脂肪瘤门诊治疗，在手术过程中，患者紧张，多次喊疼痛难忍。随着手术进行，患者出现兴奋，血压升高，心率增快，之后出现嗜睡寒战，惊恐不安，下肢抽搐。

如何处理

A、糖皮质激素静注

B、急查血生化

C、硫喷妥钠静注

D、停止手术，观察

E、肾上腺素静注

- () 7、患者男，34岁。盖房子时因土墙垮塌砸伤左小腿。伤后35分钟被送往当地卫生院行清创缝合术。第2天夜间，患者感伤肢沉重感，行走困难，疼痛逐渐加剧，自觉发热，全身无力。次日，病情加重，急来院就诊。查体：T 40℃，P 130次/分，R 20次/分，BP100/60mmHg，痛苦面容，贫血貌，表情淡漠，烦躁，呼吸急促。整个左小腿延至大腿肿胀明显，左小腿下1/3外侧有一4cm长而不规则缝合伤口，周围皮肤苍白、紧张发亮，伤口中有恶臭味的血性液体和气泡溢出。触诊肢体有捻发音。实验室检查：RBC $2.0 \times 10^{12}/L$ ，Hb40%，WBC $12 \times 10^9/L$ ，N90%。尿常规：血红蛋白尿。左小腿X线平片检查：肌群内有积气阴影。

首先应采取的紧急治疗措施是

A、拆除缝线，彻底清创引流，最大限度地切除坏死组织和切开筋膜减压

B、拆除缝线，敞开伤口，用大量过氧化氢反复冲洗

C、拆除缝线，敞开伤口，每日换药

D、拆除缝线，敞开伤口，高压氧治疗

E、拆除缝线，敞开伤口，并作多个小切口引流

F、拆除缝线，敞开伤口，用大量1:4000的高锰酸钾溶液反复冲洗

- () 8、选择性血管造影最常选择的是
- A、经桡动脉穿刺法
 - B、经股动脉穿刺法
 - C、经腘动脉穿刺法
 - D、经颈动脉穿刺法
 - E、经肱动脉穿刺法
- () 9、女性，23岁，因颈部刀割伤来院，查体：颈部横切口，可闻呼吸声，呼吸困难，皮下可触及捻发音。对此病人重要的急诊处理是
- A、局部填塞
 - B、清理呼吸道，保持呼吸道通畅
 - C、止血
 - D、缝合伤口，引流
 - E、吻合神经
- () 10、急性硬膜外血肿的临床表现不正确的是
- A、头疼、呕吐，躁动不安
 - B、两瞳孔缩小，光反射消失，眼球内斜
 - C、进行性颅内压增高及意识障碍
 - D、昏迷—清醒—再昏迷
 - E、偏瘫、失语和Cushing反应三主症
- () 11、男性，65岁，既往慢性肾小球肾炎5年，查血肌酐200umol/L，在治疗其他疾病过程中，下列哪些药物不适宜使用
- A、红霉素
 - B、四环素
 - C、环丙沙星
 - D、甲硝唑
 - E、乙胺丁醇
- () 12、创面有出血性坏死斑，呈绿色，有特殊的甜臭味，体温低，白细胞低，最有可能感染
- A、铜绿假单胞菌
 - B、金黄色葡萄球菌
 - C、粪链球菌
 - D、大肠杆菌
 - E、化脓性链球菌

- () 13、应用三腔二囊管治疗食管胃底静脉曲张出血，正确的定
- A、患者取侧卧位，三腔二囊管由口插入
 - B、置管后首先向食管气囊内充气150ml
 - C、如果仍有出血，向胃气囊内充气200ml
 - D、为避免再次出血，三腔管可以持续放置
 - E、放置三腔二囊管期间应注意避免因误吸引起的吸入性肺炎
- () 14、下列G-杆菌的临床特点，不正确的选项是
- A、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、变形杆菌最常见
 - B、大肠杆菌常与其他致病菌一起引起混合感染，脓液稠厚、恶臭或粪臭
 - C、铜绿假单胞菌对多数抗生素不敏感，易引起继发感染，脓液淡绿色、甜腥臭
 - D、此类细菌的毒素主要是外毒素毒性
 - E、变形杆菌对大多数抗生素不敏感，脓液有特殊的恶臭
- () 15、下列关于烧伤后并发多器官功能衰竭的说法错误的是
- A、2个或2个以上的器官以连锁或累加的形式相继或同时发生的功能障碍或衰竭是影响严重烧伤治愈率的重要原因
 - B、防治原则是重视监视、控制休克、防治感染、调理好内环境稳定，处理好创面
 - C、多器官衰竭衰竭的临床表现可以分为四期
 - D、多系统器官功能衰竭可并发代谢性酸中毒和高血糖，最后亦可并发肝性脑病和昏
 - E、患者在发生多器官衰竭之前，大多数器官功能是差的
- () 16、患者，男，30岁，右腹股沟梨形肿块5年，时隐时现，逐渐增大，站立时出现，平卧后消失，查外环超过一指，压迫内环后肿块不出现，诊断最可能是
- A、先天性睾丸鞘膜积液
 - B、精索肿物
 - C、精索鞘膜积液
 - D、腹股沟斜疝
 - E、腹股沟直疝
- () 17、急性肝衰竭的实验室检查，不会出现的情况是
- A、ALT和AST增高，血胆红素增高
 - B、弥漫性肝坏死时ALT和AST增高尤甚
 - C、血小板降低，白细胞增高
 - D、血清肌酐和尿素氮可增高
 - E、电解质紊乱，酸碱失衡
- () 18、考虑诊断为下列哪种急腹症时，不应进行诊断性腹腔穿刺

A、低位完全性机械性肠梗阻

B、腹腔内出血

C、腹部闭合性损伤

D、原发性腹膜炎

E、继发性腹膜炎

() 19、心脏停搏时间是指从循环停止到

A、意识恢复

B、自主呼吸恢复

C、心脏自动节律恢复

D、重建有效人工循环

E、呼吸心跳恢复正常

() 20、下述麻醉特点错误的一项是

A、工作任务是消除疼痛和不适

B、保障手术患者安全

C、工作范围还包括复苏

D、麻醉药的作用是不可逆的

E、包括全麻、局麻和椎管内麻醉三类

() 21、男性，50岁。突发剑突下绞痛，呈阵发性发作，向背部放射伴有恶心、呕吐，寒战，以前也有类似发作史。查体：体温达39.5℃，P 112次/分，血压尚可，神志清楚，皮肤和巩膜黄染，触及肿大的胆囊。

该患者此时最有效的治疗是

A、胆总管切开减压、T型管引流

B、联合应用大剂量抗生素

C、补液、恢复血容量

D、给予糖皮质激素

E、物理降温，支持治

() 22、有关双侧肾积水，一侧积水严重，一侧较轻的治疗，下列哪项正确

A、不需手术治疗，定期观察

B、口服中药治疗

C、可先治疗严重的一侧

D、先治疗较轻的一侧

E、双侧积水同时手术治疗

- () 23、男性，6岁，腹痛5小时伴发热入院。持续性腹痛，全腹痛，伴恶心、呕吐。查体：腹略胀，全腹肌紧张及压痛、叩击痛，以右下腹为甚。白细胞计数为 $17.74 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞0.783。

诊断确立后最佳的处理方法是

- A、手术治疗
- B、穿刺引流
- C、局部热敷
- D、抗生素治疗
- E、继续观察

- () 24、男，43岁，急性化脓性腹膜炎，血压75/45mmHg，经积极抗休克治疗，仍不见好转，此时最适宜的治疗是

- A、尽快手术探查
- B、测定中心静脉压
- C、大剂量抗生素治疗
- D、快速输血
- E、抗休克同时送手术室手术

- () 25、男，21岁，发现右阴囊内鸡蛋大小肿块半年，不痛，平卧不消失。扪之囊性感，透光试验(+)。

首选的治疗为

- A、理疗
- B、阴囊托起
- C、热敷
- D、穿弹力内裤
- E、手术治疗

- () 26、急性血源性骨髓炎的早期诊断依据不包括

- A、活动障碍
- B、X线片显示骨膜反应
- C、起病急，高热
- D、毒血症表现
- E、中性粒细胞增高

- () 27、发病率最高的小儿腹股沟疝为

- A、右侧腹股沟斜疝
- B、双侧腹股沟斜疝
- C、双侧腹股沟直疝
- D、单侧腹股沟直疝
- E、左侧腹股沟斜疝

() 28、某骨科医师在给病人做检查时发现，其主动和被动活动均受限，应优先考虑

- A、神经性麻痹
- B、肌腱断裂
- C、关节病损
- D、肌肉痉挛
- E、疼痛受限

() 29、下列选项中，不符合急性枕骨大孔疝临床表现的是

- A、生命体征和循环障碍出现早，瞳孔变化和意识障碍出现晚
- B、呼吸骤停发生较早
- C、生命体征改变出现晚而不明显
- D、颅内压增高
- E、颈强直，四肢肌张力减低，肌力减退

() 30、大面积烧伤早期发生的休克多为

- A、神经源性休克
- B、心源性休克
- C、低血容量性休克
- D、过敏性休克
- E、感染性休克

() 31、患者男，45岁。腰痛多年，时轻时重，伴双下肢痛。10天前搬重物后腰腿痛加剧，并出现麻木与排尿困难。查体：腰运动受限，椎旁压痛向下肢放射，马鞍区痛觉减退。直腿抬高试验阳性，加强试验阳性。

患者出现排尿困难，鞍区麻木的原因是

- A、L5神经根受压
- B、S1神经根受压
- C、骶椎神经受刺激
- D、脊神经后支卡压
- E、马尾神经受压

- () 32、污染伤口一般认为伤后多长时间以内的伤口
- A、6小时
 - B、8小时
 - C、10小时
 - D、12小时
 - E、24小时
- () 33、输血最严重的并发症是
- A、溶血反应
 - B、过敏反应
 - C、非溶血性发热
 - D、细菌污染反应
 - E、病毒性肝炎
- () 34、恶性骨肿瘤的X线表现主要为
- A、边缘不清楚，骨质破坏，骨膜反应明显
 - B、边缘清楚，骨质破坏，骨膜反应明显
 - C、边缘不清楚，骨质破坏，无骨膜反应
 - D、边缘不清楚，骨质增生，无骨膜反应
 - E、边缘清楚，骨质增生，无骨膜反应
- () 35、以下不是平足症致病因素的是
- A、足副舟骨。足舟骨结节过大，胫后肌附着处软弱
 - B、第2骨较短，其他跖骨承受重力过多，促使足弓扁平
 - C、双足长期负重站立
 - D、长期有病卧床，缺乏锻炼，肌萎缩，张力减弱，负重时足弓下陷
 - E、长期饮用碳酸饮料
- () 36、巴德-吉利亚阻塞综合征引起
- A、门静脉高压症的主要阻塞部位在窦前
 - B、门静脉高压症的主要阻塞部位在窦后
 - C、门静脉高压症的主要阻塞部位在窦后和肝窦
 - D、门静脉高压症的主要阻塞部位在肝前
 - E、门静脉高压症的主要阻塞部位在肝后
- () 37、游离皮片移植适用于
- A、严重感染创面

B、有骨、肌腱、神经暴露的创面

C、放射治疗后的创面

D、陈旧性肉芽创面

E、手背瘢痕切除后创面

() 38、正中神经损伤后可出现

A、纽扣样畸形

B、鹅颈样畸形

C、垂腕垂指畸形

D、爪形手畸形

E、猿手畸形

() 39、心脏停搏液中钾离子的最佳浓度为

A、30~940mmol/L

B、40~50mmol/L

C、5~9mmol/L

D、10~14mmol/L

E、15~30mmol/L

() 40、患者，男性，42岁。肝区疼痛伴寒战、弛张热2周。查体：巩膜黄染，肝左叶肿大，中上腹压痛明显，白细胞 $17 \times 10^9/L$ ，AFP阴性。超声检查：左肝区4cm液性暗区，腹腔内少量积液。胆囊结石，大小约1.0cm×2.0cm，胆囊大，壁厚。

该患者的诊断最可能的是

A、细菌性肝脓肿

B、阿米巴性肝脓肿

C、肝癌液化坏死

D、硬化性胆管炎

E、肝囊肿并感染

() 41、有关皮肤囊肿的叙述哪项不对

A、皮样囊肿为囊性畸胎瘤

B、皮脂囊肿为非真性肿瘤

C、腱鞘囊肿术后不易复发

D、表皮样囊肿就是表皮进入皮下而形成

E、腱鞘囊肿和滑液囊肿也不是真性肿瘤

() 42、女性，62岁，因胃溃疡行Billroth II式胃大部切除手术，术后第3天突然发生右上腹疼痛，

查体T 38.8℃，右上腹部压痛反跳痛明显，WBC $16.1 \times 10^9/L$ ，腹腔穿刺抽出胆汁样液体。

出现此并发症最可能的原因是

- A、感染
- B、结扎不牢固
- C、吻合口张力过大
- D、空肠输入襻梗阻
- E、腹腔粘连较重

() 43、在对肝癌病人行肝叶切除术时至少要保留

- A、正常肝组织的40%或肝硬化肝组织的60%
- B、正常肝组织的30%或肝硬化肝组织的50%
- C、正常肝组织的50%或肝硬化肝组织的40%
- D、正常肝组织的20%或肝硬化肝组织的40%
- E、正常肝组织的40%或肝硬化肝组织的50%

() 44、患者男性，40岁，食用不洁饮食后，大量呕吐，入院治疗，查体：脉搏细数，肢端湿冷，血压80/60mmHg，心率90次/分。呼吸20次/分。下列关于体液代谢失调的临床处理基本原则，错误的是

- A、全面掌握患者的病史和临床表现
- B、实验室检查
- C、确定体液代谢失调的类型及程度
- D、积极治疗原发病，制订体液代谢失调的治疗方案
- E、严格按照体液代谢失调相关计算公式计算出的需要量来进行治疗

() 45、妊娠中晚期阑尾炎的特点是

- A、大网膜不易包裹阑尾，穿孔率高
- B、症状、体征与病理改变往往不一致
- C、腹部麦氏点压痛位置偏高
- D、腹痛为阵发性绞痛，局部无明显体征
- E、中下腹广泛压痛

() 46、男，48岁，KUB 及IVP 证实左输尿管上段结石，直径1cm，左肾中度积水，试行体外冲击波治疗3次。无结石排出，复查KUB，结石无变化，下一步考虑进行

- A、反复进行上述治疗
- B、保守治疗
- C、左输尿管切开取石术

D、输尿管镜取石术

E、左肾和输尿管切除术

- () 47、男孩，12岁。突发阵发性右上腹绞痛，伴有恶心、呕吐，一段时间后症状骤然缓解，又可反复发作，持续时间不一。查体：体温正常，巩膜无黄染，无肌紧张。

该患者最可能的诊断是

A、肝破裂

B、急性胰腺炎

C、肝脓肿

D、胆道蛔虫病

E、胆道出血

- () 48、患者男，51岁。汽车撞伤后骨盆区伤部不能自行排尿，膀胱胀满，尿道口有少量血性液溢出，血压80/60mmHg。直肠指诊：指套上有血迹。

首先要考虑是诊断是

A、骨盆骨折合并休克，尿道与直肠损伤

B、骨盆骨折合并尿潴留

C、骨盆骨折

D、骨盆骨折合并休克

E、骨盆骨折合并休克与尿道损伤

- () 49、关于中、重度烧伤的处理原则，下列哪项是错误的

A、立即建立输液通道

B、留置导尿管，观察每小时尿量

C、了解病史，严重呼吸道烧伤须及早行气管切开

D、头面部烧伤在清创后应将创面包扎

E、III度环形焦痂应切开焦痂减压

- () 50、患者，男性，头部外伤后2小时入院，伤后曾昏迷约30分钟。入院查体：神志清楚，GCS评分：10分，头顶有一头皮血肿约3cm×3cm，头皮无明显裂伤。左侧外耳道可见稀薄血性液体流出。ET：左颞可见一线形骨折，左额颞可见一薄层硬膜下血肿，左颞点、片状高密度，颅内可见少量气体。应诊断为

A、轻型内开放性颅脑损伤

B、中型内开放性颅脑损伤

C、轻型闭合性颅脑损伤

D、中型闭合性颅脑损伤

E、重型闭合性颅脑损伤

参考答案

一、客观选择题

1、C

【解析】脑神经麻痹：一般在腰麻后一周发病，常先有剧烈头痛、畏光、眩晕、继而出现斜视和复视。其机制是由于脑脊液外漏，脑组织失去了脑脊液的衬垫作用。当病人站立时，脑组织因重力作用下沉而压迫脑神经。

2、B

【解析】甲亢手术前准备包括：①心理准备：消除患者的顾虑和恐惧，适当应用镇静剂和安眠药。②术前检查：颈部透视或摄片，了解气管是否受压或移位；检查心脏有无并发症；喉镜检查了解声带功能；测定基础代谢率了解甲亢程度。③药物准备：碘剂准备：2~3周，甲亢症状得到控制（脉率90次/分以下，基础代谢率+20%以下），可行手术；硫氧嘧啶类加碘剂：先用硫氧嘧啶类药物，待甲亢症状得到基本控制后，停药，改服碘剂1~2周，再行手术；硫氧嘧啶类药物可使甲状腺肿大和动脉性充血，手术时易发生出血，服用硫氧嘧啶类药物后必须加用碘剂；方法：复方碘化钾溶液，每日3次，第1日每次3~5滴，以后逐日每次增加1滴，至每次16滴，维持此剂量至手术；普萘洛尔准备：每次20~60mg，6小时1次，4~7日后脉率可降至正常水平，可施行手术；最后1次服药在术前1~2小时，术后继续服药4~7天，术前不能用阿托品。

血管结扎线脱落出血致呼吸困难，是由于切口出血，需剪开缝线敞开切口、清除血肿，进手术室止血。必要时行气管切开，故此时适当的处理为拆去缝线，立即送手术室止血。

3、E

4、E

【解析】腓总神经解剖位置在腓骨小头附近，腓骨小头骨折最常见的神经损伤是腓总神经损伤。

5、A

【解析】考虑脾破裂，止痛会掩盖症状，延误病情。

6、C

【解析】麻醉药出现毒性反应时，应立即停止用药，吸氧，轻度毒性反应可用地西洋或咪达唑仑静注，有预防和控制抽搐的作用，如果出现抽搐，用硫喷妥钠静注。

7、A

8、B

【解析】选择性血管造影最常选择的是Seldinger经股动脉穿刺法。

9、B

【解析】对于呼吸困难的病人，优先处理原则即保证呼吸道畅通。

10、C

【解析】多有典型的昏迷清醒或好转~昏迷的意识演变过程。早期少有神经系统受累体征，至血肿形成后，出现脑受压和颅内压高体征如偏瘫、失语和Cushing三主征。可有伤侧颞部的头皮肿胀，再后

出现脑疝的体征。进行性颅内压增高四急性硬脑膜下血肿的表现。

11、B

【解析】患者肾功不全，四环素可以导致肾功损害，因此不能使用

12、A

【解析】铜绿假单胞菌能产生水溶性色素；其中包括荧光素，呈绿色。该菌为革兰染色阴性菌，由其引起的毒血症常表现低体温，血中白细胞也偏低。

13、E

【解析】经鼻孔缓慢地将管插入胃内，先向胃囊充气至该三腔管说明书中标出的充气量，将管向外拉提至不能再被拉出，用0.5kg力量持续牵拉。如仍有活动出血，可再向食管囊内充气。

14、D

【解析】外毒素主要是G⁺菌产生，是一种毒性蛋白质，细菌的代谢产物。内毒素是G⁻菌的菌体成分，主要是脂多糖中的类脂A，只有当细菌死亡后才释放出来，表现其毒性。内毒素不是蛋白质，因此耐热。

15、E

【解析】患者在发生多器官衰竭之前，大多数器官功能是良好的。

16、D

【解析】腹股沟斜疝在很多方面都是与直疝是有区别的，主要表现在以下几个方面

1. 发病年龄：斜疝多见于儿童及青壮年；直疝多见于老年人。
2. 疝突出途径：斜疝是经腹股沟管突出，可进入阴囊；直疝是由直疝三角突出，不进入阴囊。
3. 疝块外形：斜疝的疝块为椭圆或梨形，上部呈蒂柄状；直疝的疝块为半球形，基底较宽。
4. 回纳疝块后压住疝环：斜疝可不再突出；直疝的疝块仍可突出。
5. 精索与疝囊的关系：斜疝发生时，精索在疝囊后方；直疝者精索是在疝囊的前外方。
6. 疝囊颈与腹壁下动脉的关系：斜疝的疝囊颈在腹壁下动脉外侧；直疝的疝囊颈在腹壁下动脉的内。
7. 嵌顿机会：斜疝发生疝嵌的机会较多；直疝发生嵌顿的机会极少。

17、B

【解析】急性肝衰竭的实验室检查：①转氨酶可增高，但发生弥漫的肝坏死时可不增高；②血胆红素增高；③血小板常减少；白细胞常增多；④血肌酐或尿素氮可增高；⑤血电解质紊乱，如低钠、高钾或低钾、低镁等；⑥酸碱失衡，多为代谢性酸中毒，早期可能有呼吸性或代谢性（低氯、低钾等）碱中毒；⑦出现DIC时，凝血时间、凝血酶原时间或部分凝血活酶时间延长，纤维蛋白原可减少，而其降解物（FDP）增多优球蛋白试验等可呈阳性。

18、A

【解析】低位完全性机械性肠梗阻时穿刺易误伤肠管。

19、D

【解析】心脏停搏时间是指从循环停止到重建有效人工循环。

20、D

【解析】麻醉药品的作用是可控的，同时也是可逆的。

21、A

【解析】急性梗阻性化脓性胆管炎治疗原则为急诊手术解除胆道梗阻。

22、C

【解析】双肾积水时，手术要慎重，尽量保留肾脏，如一侧较重，一侧较轻时一般先治疗较重的一侧，这样手术时没有发生肾功能不全的顾虑。

23、A

【解析】对于诊断明确的阑尾炎，3天以内应尽早手术治疗。

24、E

【解析】该病人血压低，经积极抗休克治疗仍不见好转，此时最适宜的治疗为抗休克同时手术室手术探查。

25、E

【解析】鞘膜积液治疗原则是对体积较小，张力不高，且无症状的囊肿无须急于手术。尤其是1岁以内的婴幼儿，尚有自行消退的可能。但对本题中出现了临床症状者，体积较大，张力很高，因可影响睾丸血液循环，导致睾丸萎缩，故应及时手术治疗。

26、B

【解析】急性血源性骨髓炎的早期诊断依据包括：急骤的高热和毒血症表现，长骨干骺端疼痛剧烈而不愿活动肢体，该区有一个明显的压痛区，白细胞和中性粒细胞增高。

27、A

【解析】小儿腹股沟疝多为斜疝且多为男孩，右侧睾丸下降比左侧慢，右侧鞘状突闭塞时间比左侧晚，所以右侧斜疝发病率高。

28、C

【解析】检查中若发现病人主动和被动活动均受限，则表明为关节内或关节内外同时病损，如骨性强直。

29、C

【解析】急性枕骨大孔疝以延髓损害症状为主，脑神经与颈神经损害症状次之。生命体征改变出现早而明显，表现为呼吸、脉搏减慢，血压升高。

30、C

【解析】大面积烧伤后体液渗出的原因较为复杂，但其基本原因是微循环障碍、毛细血管通透性增加，造成低血容量性休克，治疗以补液为主。

31、E

【解析】压迫突出平面以下的马尾神经，出现会阴部麻木，排便、排尿无力，常表现为急性尿潴留和排便不能控制。

32、B

【解析】污染伤口一般认为伤后8以内的伤口，超过这一时间按感染伤口定义。

33、A

【解析】溶血反应是输血最严重的并发症，虽然很少发生，但后果严重，死亡率高。

34、A

【解析】恶性骨肿瘤的X线肯定是边缘不清楚，骨质破坏，有骨膜反应。

35、E

【解析】先天性平足症致病因素有：

- (1) 足副舟骨、足舟骨结节过大，胫后肌附着处软弱。
- (2) 第2骨较短，其他跖骨承受重力过多，促使足弓扁平。
- (3) 足跖骨间软骨性或纤维性联合，常见有跟距、跟骨及跖骨间等联合均可导致平足症。

后天性因素：

- (1) 双足长期负重站立，体重增加，长途跋涉过度疲劳，维持足弓肌肉、韧带、关节囊及腱膜等软组织逐渐衰弱，足弓逐渐低平。
- (2) 长期有病卧床，缺乏锻炼，肌萎缩，张力减弱，负重时足弓下陷。
- (3) 穿鞋不当，鞋跟过高，长期体重前移，跟骨向前下倾斜，足纵弓遭到破坏。
- (4) 足部骨病如类风湿性关节炎，骨关节结核等。
- (5) 脊髓灰质炎后遗平足症。

36、E

【解析】窦前阻塞的常见病因是血吸虫病性肝硬化。肝窦和窦后阻塞的常见病因是肝炎后肝硬化，主要病变是肝小叶内纤维组织增生和肝细胞再生。

Budd-Chiari综合症，它指的是由肝静脉或其开口以上的下腔静脉阻塞引起的以门静脉高压或门静脉

和下腔静脉高压为特征的一组疾病。

37、E

【解析】游离皮肤移植适用于皮肤全层缺损的覆盖，其基底需满足血运良好、无严重感染、无重要深层组织器官暴露等条件。

38、E

【解析】尺神经损伤者由于指屈肌及指伸肌无手内肌的对抗作用，出现环指和小指掌指关节过伸，指间关节屈曲而呈爪状。

桡神经支配前臂背侧所有伸肌，损伤后不能对抗屈肌而呈垂腕垂指畸形。

正中神经损伤后，由于大鱼肌萎缩形成猿手畸形。

39、E

【解析】一般认为停跳液中钾离子最佳浓度为15~30mmol/L。

40、A

【解析】有明显的寒战和发热，同时有血象增高，肝内液性暗区，肝内胆管无明显扩张，故为肝源性的肝内感染造成的肝脓肿。

41、C

【解析】腱鞘囊肿术后易复发。

42、D

【解析】急性空肠输入襻梗阻多发生在结肠前空肠吻合，空肠襻过长的情况下，严重时可能造成输入襻空肠和十二指肠残端的闭合性梗阻，肠腔内压力过高。

43、B

【解析】肝切除中一般至少要保留正常肝组织的30%或硬化肝组织的50%，否则功能不能代偿。

44、E

【解析】绝对依靠任何公式决定补充水、电解质和酸碱需要量的做法是不正确的，公式仅作为补充安全剂量的估计，一般只输入计算量的1/2，然后再根据临床表现和实验室复查结果酌情进行调整。如果将计算的水、电解质和酸碱需要量全部输入，则可能导致不良后果

45、C

【解析】妊娠阑尾炎临床症状不明显，穿孔后不易包裹局限，体征不明显，可造成母子危险，并发症多，感染易扩散

46、C

【解析】结石确诊已久，经试用各种非手术方法无效者宜及早考虑手术，尤其结石以上明显有积水者应优先考虑。可行输尿管切开取石术。输尿管切开取石术的优点是手术小，可将结石完整取出。

47、D

【解析】病例的特点是儿童阵发性右上腹痛，发作间歇期症状完全消失，无明显感染和腹膜炎体

征，是典型的胆道蛔虫症的临床表现。

48、A

49、D

【解析】头面部烧伤清创后通常采用暴露疗法。

50、B

【解析】患者GCS：10分，有少量硬膜下血肿及左颞脑挫裂伤，提示为中型颅脑损伤，患者左外耳道有稀薄血性液体流出，说明可能有脑脊液耳漏。同时CT提示颅内有少量气体，均提示有颅底骨折所致的内开放性损伤。

317普通外科学模拟考试(二)

(考试时间90分钟,总分100分)

准考证号:_____姓名:_____

一、客观选择题（共50题，每题2分，共计100分）

- () 1、成人每天需要的能量约
- A、1500~~1700kcal
 - B、1800~~2000kcal
 - C、2100~~2200kcal
 - D、2300~~2400kcal
 - E、240kcal以上
- () 2、男性，35岁，暴饮暴食后，心窝部突然疼痛，恶心呕吐。吐物为胃内容物，吐后疼痛不缓解，查体温38.3℃。脉搏96次/分，脐周压痛，反跳痛，肌紧张不明显，无移动性浊音，肠鸣音减弱，血WBC $12.0 \times 10^9 / L$ 中性88%。
- 4周后腹部扪及囊性肿块，该患者最可能发生以下哪种并发症
- A、胰腺假性囊肿
 - B、肠梗阻
 - C、肠出血
 - D、肠痿
 - E、腹腔脓肿
- () 3、以下不属于慢性压疮病因的是
- A、局部长期受压
 - B、慢性感染
 - C、局部失神经支配
 - D、高血压
 - E、糖尿病
- () 4、下列符合“III/乙”切口愈合的是
- A、甲状腺大部切除术切口红肿
 - B、胆囊切除术切口化脓
 - C、胃大部切除术切口血肿
 - D、阑尾切除术切口积液

E、肠切除术切口裂开

- () 5、患者，女，20岁，晚班途中被歹徒用枪击中小腿，当即吓晕，歹徒随即抢包逃走。后患者被送往医院治疗，在清创中，对骨折的处理，不正确的是
- A、游离的小骨片均可取出，尽量保留与软组织相连的骨片
- B、较大的游离骨片应清洗后放回原处
- C、即使存在很大的骨质缺损，亦不应该采用骨移植术
- D、污染不重，清创彻底，争取进行内固定
- E、可以采用外固定架进行固定
- () 6、男，6岁，左小腿近端1个月，进行性加重，各方面提示左胫骨上端骨肉瘤，外周血化验中发现哪一条最支持诊断
- A、本周蛋白(+)
- B、红细胞沉降率加快
- C、血中碱性磷酸酶升高
- D、血中白细胞计数升高
- E、血中酸性磷酸酶升高
- () 7、烧伤后应激性溃疡的发病机制中最重要的因素是
- A、黏膜灌流量减少和灶性缺血
- B、胃黏膜前列腺素改变
- C、胃酸分泌
- D、胃黏膜屏障功能损伤
- E、氧自由基产生和释放
- () 8、急性细菌性前列腺炎的治疗要点中，错误的是
- A、卧床休息，大量引用清水
- B、适当应用止痛、解痉、退热药物以缓解症状
- C、按摩前列腺
- D、输液、应用抗菌药物
- E、急性尿潴留，耻骨上穿刺造瘘
- () 9、女性，40岁，食管中段癌患者，进行性吞咽困难6个月，完全不能进食2月，明显消瘦，脱水，左锁骨上直径2cm坚硬淋巴结，不能活动，治疗应采取
- A、放射治疗。
- B、争取手术治疗
- C、化学治疗
- D、输血、输液非手术治疗。

E、胃造口术或食管，胃转流术

- () 10、男，14岁，无意间发现右膝关节上方有一硬性肿物，触之不痛，X线示：左股骨远端外侧有一边缘清楚杵形肿块，最大可能性是
- A、成骨细胞瘤
- B、骨巨细胞瘤
- C、骨瘤
- D、骨样肉瘤
- E、骨软骨瘤
- () 11、下列哪一项不是导致骨折愈合或不愈合的因素
- A、感染
- B、软组织嵌入
- C、反复多次复位
- D、糖尿病
- E、没有达到解剖复位
- () 12、下述姿势性扁平足的临床表现中，错误的是
- A、行走过多，站立过久时足痛
- B、站立时重力线落于足跟之外侧
- C、前足横弓塌陷，稍外翻
- D、足印的腰部增宽
- E、足底部软组织压痛
- () 13、男，30岁，喉结下肿痛1周，肿胀渐至颈中部，能讲话。查体：T38.7℃，BP100/60mmHg，右颈部明显肿胀，压痛，皮肤不红。无波动。WBC $15 \times 10^9/L$ ，血培养阴性。该患者最可能的诊断是
- A、急性颌下腺炎
- B、急性淋巴管炎
- C、颈部蜂窝织炎
- D、急性咽喉炎
- E、急性腮腺炎
- () 14、下列选项中，不符合急性肾衰竭无尿期治疗原则的是
- A、控制入水量和电解质，量出为入，宁少勿多
- B、高蛋白，高脂肪，高维生素饮食
- C、早期应用甘露醇，呋塞米利尿

D、预防和治疗高血钾

E、防治感染。纠正体液代谢紊乱

- () 15、初产妇，28岁，产后3周，突起寒战、高热，伴左侧乳房疼痛来院；查体：T 39℃，P115次/分，左侧乳房局部皮肤红肿，压痛(+)同侧腋窝淋巴结肿大；试验室检查：WBC $16 \times 10^9/L$ ，中性粒0.8。

若该产妇确诊为急性乳房炎，那么该病的重要病因是

A、全身和局部抵抗力下降

B、乳汁淤积加细菌入侵

C、乳腺组织发育不良

D、哺乳次数增多

E、乳腺分泌障碍

- () 16、食管癌分型不包括

A、髓质型

B、缩窄型

C、蕈伞型

D、溃疡型

E、梗阻型

- () 17、男性22岁。枕部棒击伤2小时。伤后当即昏迷，20分钟醒来有轻微的恶心、呕吐，但对受伤情况不能回忆。查体：神志清，神经系统无阳性体征。

行X线检查发现左颞骨折线通过脑膜中动脉沟。需高度警惕发生

A、头皮血肿

B、迟发型外伤性脑内血肿

C、硬膜外血肿

D、硬膜下血肿

E、急性脑内血肿

- () 18、男，35岁。黄疸已1个月，右上腹轻微胀痛，食欲不振，经内科治疗无效。查体：肝大，胆囊增大，血胆红素 $17 \mu\text{mol/L}$ ，凡登白直接反应阳性，转氨酶70单位，碱性磷酸酶45单位，AFP $>50\text{ng/ml}$ ，可能诊断是

A、黄疸型肝炎

B、胆总管结石梗阻

C、肝癌

D、肝硬化晚期

E、壶腹周围癌

() 19、对诊断困难的急性化脓性腹膜炎病例时，应做哪项检查以协助明确诊断

A、X线钡餐检查

B、诊断性腹腔穿刺

C、选择性血管造影

D、肝胆胰CT扫描

E、内镜检查

() 20、应激性溃疡出血

A、三腔双囊管压迫

B、胃大部切除

C、服甲氧咪呱

D、肝动脉结扎

E、高选择迷走神经切除

() 21、腹部闭合性外伤2小时，腹痛(向左肩放射)，血压8 / 5. 3kPa，心率140 / min。全腹轻压痛，肠鸣音减弱，应考虑

A、肝破裂

B、脾破裂

C、胰腺损伤

D、胆囊破裂

E、胃破裂

() 22、患者，男性，40岁。车祸致右髌臼粉碎性骨折。查体：血压80/50mmHg，脸色苍白，右足不能背伸。

最不能出现的体征是

A、局部触诊试验 (+)

B、局部右下肢轴向叩击试验 (+)

C、骨盆分离挤压试验 (+)

D、右Thomas试验 (+)

E、右“4”字试验 (+)

() 23、男，18岁，II、III度烧伤约60%，入院后第5天。病人，烦躁不安，BP 90/50mmHg，心率130次/分，四肢厥冷，浅表静脉收缩成索条状创面停止生长、干枯。提示为

A、烧伤创面脓毒症

B、全身感染

- C、休克
 - D、蜂窝织炎
 - E、二重感染
- () 24、心跳停跳早期诊断的主要标准是
- A、发绀
 - B、瞳孔散大
 - C、大动脉搏动和神志消失
 - D、心电图呈室颤
 - E、脑电波消失
- () 25、患者女，40岁。胫骨上段肿瘤切除后拟行膝关节置换，最好选择的假体是
- A、球臼式人工膝关节
 - B、后稳定型人工膝关节
 - C、踝限制型人工膝关节
 - D、铰链式人工膝关节
 - E、铰链旋转式人工膝关节
- () 26、输尿管结石
- A、肾区绞痛伴镜下血尿
 - B、排尿中断伴疼痛
 - C、尿频，尿急伴镜下血尿
 - D、尿频，尿急，尿痛伴终末血尿及脓尿
 - E、尿道口滴血
- () 27、女性，55岁，3小时内呕血800ml。查体：血压80 / 54mmHg，脉搏128 / min，呼吸32 / min，目前的处理原则是
- A、给予强心药
 - B、止血，抗休克治疗
 - C、胃镜检查
 - D、血管造影检查
 - E、应用升压药
- () 28、诊断张力性气胸最充分的依据是
- A、呼吸困难并伴有皮下气肿
 - B、伤侧胸部叩诊呈高调鼓音
 - C、伤侧呼吸音消失

D、X线见纵隔向健侧移位

E、胸膜腔穿刺有高压气体

() 29、在我国实施辅助生殖技术，符合卫生部制定的伦理原则的是

A、实施非医学需要的性别选择

B、一名供精者给5名以上的妇女受孕

C、对供精者实施商品化

D、由胚胎所有者做主对剩余的胚胎进行处理

E、以上都是

() 30、患者，男性，52岁。间歇性跛行2年，加重伴右侧小腿静息痛1年。查体：右足皮肤苍白、足背动脉搏动减弱。既往有高血压和高脂血症史多年。

对于术前检查中把握手术适应证以及选择手术方法，有重要的意义的一项是

A、动脉造影检查

B、静脉测压

C、X线摄片

D、CT检查

E、电阻抗体积描记法检查

() 31、下列关于高血压脑出血的手术指征不正确的是

A、发病时病情较轻，以后逐渐加重，血肿量 $\geq 30\text{ml}$ 者

B、发病缓慢或病情稳定，但颅内压增高者

C、发病时较重，以后好转，继而又加重者

D、病情重或发展迅速，已出现脑疝体征，但尚未进入脑疝晚期者

E、迅速发生脑干，视丘下部严重损害者

() 32、患儿，男，9个月，体重10kg，间歇性哭闹20小时，有规律性，伴呕吐，排果酱样便2次，查体腹部触及包块。最可能的诊断是

A、肠套叠

B、过敏性紫癜

C、细菌性痢疾

D、蛔虫性肠梗阻

E、肠道肿瘤

() 33、中年女性，35岁，单位体检行B超检查时发现左膈下正常脾脏消失，而在下腹部有呈现脾脏的反射，考虑为游走脾。

下述游走脾观点错误的时

- A、脾位改变且有大幅度移位者
- B、多为继发因素发生
- C、游走脾在早期常有较大的移动性
- D、上极容易向中线倾斜
- E、如有血管阻塞可导致萎缩

() 34、以下属于外科特异性感染的是

- A、金黄色葡萄球菌感染
- B、变形杆菌感染
- C、铜绿假单胞菌(绿脓杆菌)感染
- D、链球菌感染
- E、破伤风杆菌感染

() 35、肾结核早期重要的阳性发现是

- A、静脉肾盂造影有肾组织破坏性病灶
- B、肾区疼痛及肿块
- C、尿检有少量红细胞和脓细胞
- D、尿培养有大肠埃希菌
- E、全身消耗

() 36、按临床分类，中度吸入性损伤是指

- A、病变可达细支气管
- B、病变达肺泡
- C、病变仅限于咽部
- D、病变主要侵犯咽、喉和气管
- E、病变可达支气管

() 37、男性患者，47岁，1年前左下肢行走10余分钟后胀痛，肌肉抽搐而跛行，休息片刻缓解，再行走后疼痛又出现。无吸烟史，发病前半年左足部外伤已治愈，体格检查：左下肢皮色较苍白，左足背动脉未触及。

下列治疗措施不适合该患者的是

- A、高压氧舱治疗
- B、严格戒烟
- C、手术治疗
- D、热疗
- E、给予止痛剂及镇静剂

- () 38、女性，23岁，全腹疼痛18小时。查体：体温38℃，全腹压痛，轻度肌紧张和反跳痛，肠鸣音消失。1周前曾有上呼吸道感染病史。腹穿抽出5ml稀薄无臭味的脓液，首先应考虑
- A、消化性溃疡穿孔
 - B、胆囊穿孔
 - C、原发性腹膜炎
 - D、急性胰腺炎
 - E、阑尾炎穿孔
- () 39、男，38岁，阑尾切除术后5天，体温38.5℃，伤口红肿，有波动感。首先应如何处理
- A、大剂量抗生素治疗
 - B、拆除切口缝线，敞开伤口
 - C、B超检查
 - D、物理治疗
 - E、继续观察
- () 40、目前较普遍认为的低温脑复苏的适宜温度是
- A、28℃
 - B、30℃
 - C、32℃
 - D、34℃
 - E、36℃
- () 41、患者，男性，55岁。毕Ⅱ式胃大部分切除术后第1天，突发剑突下剧痛。查体：腹肌紧张，全腹压痛、反跳痛，剑突下最明显。
- 若该病人在术后第6天出现上述临床表现，以下治疗方法最恰当是
- A、重新缝合修补
 - B、大剂量联合使用抗生素
 - C、充分腹腔引流+抗感染治疗
 - D、急诊行胰十二指肠切除术
 - E、暂不手术治疗，继续观察
- () 42、患者，男，35岁，车祸后感颈部疼痛，无外伤，查体：神经系统检查无异常，X线检查未见颈椎骨折、脱位，未做任何治疗，于伤后15天渐有左上肢麻木无力，考虑为迟发性脊髓损伤，最主要的原因是
- A、局部不稳
 - B、韧带钙化

C、血管压迫

D、血管栓塞

E、组织增生

() 43、关于处理门静脉高压症并发上消化道大出血，哪一项是不恰当的

A、对有黄疸、腹腔积液病人宜选用脾切除加大网膜腹膜后固定术

B、对年轻且肝功能良好者，可选用急症分流术

C、对有黄疸病人，宜行三腔双囊管处理

D、切开胃前壁，缝扎曲张静脉法止血效果不确切

E、贲门周围血管离断术，可收到立即止血效果

() 44、外科感染按病程分类，超过多长时间可定性为慢性感染

A、1个月

B、2个月

C、3个月

D、4个月

E、5个月

() 45、某患者，应消化性溃疡反复出血入院，考虑行Billroth II手术治疗，关于术式有以下问题。

术中胃大部切除术的胃切断线的解剖标志是

A、胃左动脉第一降支至胃网膜左动脉的最下第一个垂直分支的连线

B、胃左动脉第一降支至胃网膜右动脉的最下第一个垂直分支的连线

C、胃左动脉第一降支至胃短动脉的最下第一个垂直分支的连线

D、胃右动脉第一降支至胃网膜左动脉的最下第一个垂直分支的连线

E、胃网膜右静脉第一降支至胃网膜右动脉的最下第一个垂直分支的连线

() 46、患者，男性，40岁，因进行阑尾炎住院手术治疗，拟进行腰麻

某大夫拟在L4~5椎间隙麻醉，这样容易出现什么情况

A、麻醉平面选择恰当

B、麻醉平面选择偏高

C、麻醉平面选择偏低

D、麻醉平面会降低1个椎间隙

E、麻醉平面会上升1个椎间隙

() 47、在有疼痛存在时，可引起谵妄和不安的药物是

- A、咪达唑仑
- B、氯丙嗪
- C、东莨菪碱
- D、地西洋
- E、氟哌利多

() 48、患者，男性，40岁。车祸致右髌臼粉碎性骨折。查体：血压80/50mmHg，脸色苍白，右足不能背伸。

此时首先处理的并发症是

- A、尿道损伤
- B、血管损伤
- C、失血性休克
- D、软组织损伤
- E、神经损伤

() 49、患儿男，8岁，面部多处暗红色、大小不等、形状不规则的扁平斑片，不高出皮肤表面，用手压之可褪色，放松后又恢复原色。根据患儿情况，治疗宜采取

- A、手术切除
- B、局部注射硬化剂
- C、口服激素
- D、激光治疗
- E、冷冻治疗

() 50、男性，40岁，因消化道溃疡穿孔急诊入院，行胃大部切除术，实行全身麻醉

麻醉后，患者出现呼吸不规则，呛咳，眼球上下运动，流泪，受刺激体动。这是什么状况

- A、出现麻醉意外
- B、麻醉进入浅麻醉期
- C、麻药过敏
- D、麻醉抵抗
- E、麻药剂量不够

参考答案

一、客观选择题

1、B

【解析】正常成人一般每日约需能量7535kJ（1800kcal），由食物供给。

2、A

【解析】胰腺脓肿多发生在急性胰腺炎4周后。胰腺假性囊肿多在急性胰腺炎起病2周后发生，4-6周达高峰。

问题问的是在发生急性胰腺炎之后最可能发生哪种并发症，并不是现在就已经发生了。在急性胰腺炎或胰腺外伤后出现持续上腹、恶心呕吐、体重下降和发热等，腹部扪及囊性肿块时，应首先考虑假性胰腺囊肿形成的可能。及时进行检查，作出诊断。

3、D

【解析】局部长期受压、慢性感染、局部失神经支配都是慢性压疮的病因，糖尿病史压疮长期不愈的危险因素之一。

4、D

【解析】外科手术患者的切口种类分为:①清洁切口，用“I”表示，如甲状腺大部切除术;②可能污染切口，用“II”表示，如胃大部切除术;③污染切口，用“III”表示，如阑尾穿孔手术切口。

手术切口的愈合分为三级:甲级愈合用“甲”表示，指愈合良好的切口;乙级愈合用“乙”表示，指愈合处有炎症反应如红肿、硬结、血肿、积液等，但未化脓;丙级愈合用“丙”表示，指切口化脓，需做切开引流的切口。

5、D

【解析】在越南战争中，美军对火器伤所致的开放性骨折采取了髓内针和钢板、螺丝钉固定骨折，结果导致了美国有史以来最严重、最令人不能接受的感染率，很多伤员因感染而导致截肢，随后明令禁止火器伤所致开放性骨折使用内固定。

6、C

【解析】骨肉瘤的外周血化验中血中碱性磷酸酶升高是重要的血液学诊断指标。

7、A

【解析】烧伤应激引起的胃肠道应激反应，使胃黏膜血灌流量减少，组织细胞缺血缺氧致肠黏膜损伤坏死。

8、C

【解析】直肠指检前列腺肿胀、压痛、局部发热，禁忌做前列腺按摩。

9、E

【解析】应采用姑息术，改善患者目前状况。

10、E

【解析】患者无任何症状，触之不痛，无疼痛应考虑为良性肿瘤，所以E是正确的。骨软骨瘤多发生于幼年和少年，男多于女。骨软骨瘤好发于长骨骨骺附近；其好发部位为股骨上下端、胫骨上端、肱骨上端、胫骨下端。骨盆、肩胛骨、脊椎、肋骨等亦可发生。除少数肿瘤因其位置、体积、形状关系，可以压迫血管，压迫或刺激神经，妨碍关节或肌腱活动，或引起局部摩擦性滑囊炎外，均不产生任何症状。基底偶尔可以发生骨折，但甚易愈合。患者成年后，肿瘤即自行停止生长。倘发现继续生长时，则应注意肿瘤可能有恶变，应及时予以彻底切除。与一般骨瘤(颅骨区内者)不同，骨软骨瘤的恶变倾向较大，从骨盆、肩胛骨、脊椎和肋骨等躯干骨发生的尤为显著，决定治疗时应考虑到这一点。

11、E

【解析】骨折后复位达到功能复位即愈合，ABCD均是导致骨折延迟愈合或不愈合的因素。

12、B

【解析】扁平足（平足）指的是正常足弓的缺失，或称为足弓塌陷。值得注意的是，平足不等于平足症，也不是所有的平足都需要治疗。如果平足者合并有疼痛等症状时，就被称为平足症，才可能需要治疗。其实，平足的人很常见，而平足症并不常见。很多平足者特别是儿童平足没有症状，也不需要治疗，只有少部分儿童平足可能会逐渐引起整个身体体态的变化，有一部分平足可能合并足部骨结构异常，如垂直距骨、跗骨联合等。在成人平足中，50岁以上的女性较多。成人平足初发时，足在非负重状态下足弓存在，负重后足弓即消失。此时由于关节的活动性尚存在，称为可复性平足或柔性平足。如果出现关节病变、活动受限，畸形不能复位，就称为僵硬性平足。

13、C

【解析】患者咽部炎性病变扩散，右颈部肿胀，皮肤无变化，压痛，白细胞升高，血培养阴性考虑为蜂窝织炎。

14、B

【解析】急性肾衰竭无尿期的治疗原则中营养采用低蛋白、高热最、高维生素饮食，每日至少供给热量5020~6280kj。

15、B

【解析】急性乳房炎的发生原因，除产后全身抵抗力下降外，尚有以下两大诱因。

乳汁淤积：此为发病的重要原因，淤积的乳汁为细菌的生长繁殖提供了有利条件。乳汁淤积的原因有：乳头发育不良（过小或内陷）妨碍哺乳；乳汁过多或婴儿吸乳少，致乳汁不能完全排空；乳管不通，影响排乳。

细菌侵入：乳头破裂，乳晕周围皮肤糜烂，致使细菌沿淋巴管侵入，这是感染的主要途径。婴儿口腔感染，吸乳或含乳头睡眠，致使细菌直接进入乳管也是感染的途径之一，致病菌以金黄色葡萄球菌为主。

16、E

【解析】按病理形态食管癌分为四型，髓质型，蕈伞型，溃疡型，缩窄型。

17、C

18、E

【解析】壶腹周围癌可引起胆总管和主胰管的梗阻。另外患者碱性磷酸酶高，胆囊增大，AFP>50ng/ml，提示肿瘤。

凡登白试验 一种临床化验检查项目、化验标本为静脉血的血清、参考值：直接反应为阴性，间接反应为弱阳性或阴性、直接及间接反应均为阳性、见于肝细胞性黄疸、直接反应阳性见于阻塞性黄疸、间接反应阳性见于溶血性黄疸。

壶腹周围癌系指生长在壶腹、十二指肠乳头、胆总管下端、十二指肠内侧壁癌的总称。其共同特点是：在癌肿较小时即可引起胆总管和主胰管的梗阻。病程进展缓慢，黄疸出现早，五年治愈率40%~60%。临床表现有：进行性加重的无痛性黄疸，偶因癌瘤坏死，胆管再通而呈现波动。长期胆汁淤积可致胆汁性肝硬化，胆囊肿大。合并胆道感染者可有高热，寒战，甚至中毒性休克。所以考虑E项的诊断最可能。

19、B

【解析】虽然内镜（目前主要选用腹腔镜）检查也是可选的，但要求一定的设备和技术，不是所有的医院都能具备的，若没有B、可考虑E的选择，而B则是操作简便，不需要特使设备，病人痛苦小、且能为腹内病灶提供准确资料。

20、C

【解析】应激性溃疡：应激性溃疡是指病人在遭受各类重伤（包括大手术）、重病和其他应激情况下，出现胃、十二指肠粘膜的急性病变，主要表现为胃、十二指肠粘膜的糜烂、浅溃疡、渗血等。

H₂受体拮抗剂：用于 因消化性溃疡、急性应激性溃疡、出血性胃炎引起的上消化道出血 。可静脉注射H₂受体拮抗剂（甲氰咪胍）抑制胃酸分泌及用抗酸药（镁乳或氢氧化铝）通过胃管间隔打入洗胃，中和胃酸。

甲氰咪胍属于 H₂受体拮抗剂。

所以此题选C。

21、B

【解析】脾破裂的临床表现以内出血及血液对腹膜的刺激为其特征，并常与出血量和出血速度密切相关。出血量大而速度快的很快就出现低血容量性休克，伤情十分危急；出血量少而慢者症状轻微，除左上腹轻度疼痛外无其他明显体征，不易诊断。随着时间的推移，出血量越来越多，才出现休克前期的表现，继而发生休克。由于血液对腹膜的刺激而有腹痛，初起在左上腹，慢慢涉及全腹，但仍以左上腹最为明显，同时有腹部压痛、反跳痛和腹肌紧张。有时因血液刺激左侧膈肌而有左肩牵涉痛，深呼吸时这种牵涉痛加重。实验室检查发现红细胞、血红蛋白和红细胞压积进行性降低，提示有内出血。

22、C

【解析】骨盆分离挤压试验阳性提示骨盆骨折。

23、C

【解析】通过患者四肢厥冷、血压低、心率快并有烦躁不安提示有休克症状。

24、C

25、E

【解析】胫骨上段肿瘤性胫骨上端骨切除术后，膝部稳定结构被破坏，故行铰链旋转式人工膝关节置换为好。

26、A

【解析】记忆性题，患侧的肾绞痛和镜下血尿是其典型表现。

27、B

28、E

【解析】张力性气胸患者的临床表现有呼吸困难，缺氧严重者，有发绀、烦躁不安、昏迷，甚至窒息。体格检查，可见伤侧胸部饱胀，肋间隙增宽，可有皮下气肿，叩诊呈高度鼓音，听诊呼吸音消失。胸部x线检查显示胸膜腔大量积气，纵隔向健侧移位。胸膜腔穿刺有高压气体，这是诊断张力性气胸的最充分依据。

29、D

30、A

【解析】动脉造影检查能准确显示病变部位、范围、侧支和闭塞远端动脉主干的情况，对确定诊断及选择手术方式有重要意义。

31、E

【解析】脑干出血、大脑深部出血、淀粉样血管病导致脑叶出血不宜手术治疗。多数脑深部出血病例可破入脑室而自发性减压，且手术会造成正常脑组织破坏是高血压脑出血的手术禁忌症。

32、A

【解析】肠套叠排便特点为果酱样，加之腹部包块，故考虑肠套叠。

33、B

【解析】一般认为是脾脏发育过程中先天异常造成的。

34、E

【解析】外科按病菌种类和病变性质分为非特异性感染和特异性感染。非特异性感染又称化脓性感染或一般感染，常见致病菌为葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、变形杆菌、克雷伯菌、拟杆菌。特异性感染，如结核病、破伤风、气性坏疽，它们的致病菌、病程演变和防治方法，都与非特异性感染不同。

35、A

【解析】早期肾结核病变局限在肾皮质，并不引起症状，但是尿中可以发现结核杆菌。病变发展到肾髓质时才成为临床肾结核。

36、D

【解析】吸入性损伤是指吸入有毒烟雾或化学物质对呼吸道所致的化学性损伤，严重者可直接损伤

肺实质。其多发生于大面积，尤其是伴有头面部烧伤患者。

吸入性损伤的临床分类：

关于吸入性损伤的分类标准尚不统一。有的按病情严重程度分为轻、中、重三类或轻、重两类；有的按损伤部位分为上、下气道及肺实质损伤。目前国内多数采用三度分类法。

1、轻度吸入性损伤

指声门以上，包括鼻、咽和声门的损伤。临床表现鼻咽部疼痛、咳嗽、唾液增多，有吞咽困难；局部粘膜充血、肿胀或形成水泡，或粘膜糜烂、坏死。病人无声音嘶哑及呼吸困难，肺部听诊无异常。

2、中度吸入性损伤

指气管隆突以上，包括咽喉和气管的损伤。临床表现为刺激性咳嗽、声音嘶哑、呼吸困难、痰中可含碳粒及脱落之气管粘膜，喉头水肿导致气道梗阻，出现吸气性喘鸣。肺部听诊呼吸音减弱或粗糙，偶可闻及哮鸣音及干啰音。患者常并发气管炎和吸入性肺炎。

3、重度吸入性损伤

指支气管以下部位，包括支气管及肺实质的损伤。临床表现为伤后立即或几小时内出现严重呼吸困难，切开气管不能缓解；进行性缺氧，口唇发绀，心率增快、躁动、谵妄或昏迷；咳嗽多痰，可早期出现肺水肿，咳血性泡沫样痰；坏死内膜脱落，可致肺不张或窒息。肺部听诊呼吸音低、粗糙，可闻及哮鸣音，之后出现干、湿啰音。严重的肺实质损伤病人，伤后几小时内可因肺泡广泛损害和严重支气管痉挛导致急性呼吸功能衰竭而死亡。

37、D

【解析】患者为血栓闭塞性脉管炎，其治疗不应使用热疗，以免组织需氧量增加而加重症状。应严格戒烟，防止受冷、受潮和外伤，疼痛严重者可应用止痛剂及镇痛剂。

38、C

【解析】原发性腹膜炎有上呼吸道感染史，腹腔穿刺液混浊，无臭味。

39、B

40、D

【解析】多数只需降到35～33℃即可达到目的，个别病例则需更低。

41、C

【解析】如果患者的感染较重或者超过48小时，残端破裂处缝合极难成功，应充分腹腔引流+抗感染治疗。

42、A

【解析】以上几种情况均可出现迟发性瘫痪，本题答案主要根据时间来确定。血肿压迫多于术后1周发生。外伤后的纤维增生多发生于伤后半年以上。脊髓血运障碍病情进展快，而韧带钙化则进展缓慢。根据外伤史及伤后未行颈椎制动，活动后出现渐进性瘫痪，以A为最佳答案。外伤后，X线无异常且无神经症状者常疏于警惕。由于颈椎外伤后周围软组织与韧带的损伤，颈椎的稳定性下降，若没有很好制动，会发展为脱位而出现神经症状。

43、A

【解析】门静脉高压症并发上消化道大出血的手术治疗

分流手术利与弊

将高压的门静脉系统血流导入下腔静脉，显著降低了门静脉系统的压力，使胃底、食管曲张静脉获得有效引流，其预防和治疗复发出血的效果是肯定的。肝脏失去了部分门静脉血灌注，肠道吸收的毒性代谢产物绕过肝脏使术后脑病的发生率上升。

断流术评价

各种断流术，除了脾切除术本身可能因为减少了脾静脉血的回流对降低门静脉压力有利之外，都是通过阻断门静脉系统与胃底、食管曲张静脉间反常的血流联系，降低曲张静脉的压力来治疗和预防出血的。这可导致门静脉系统的压力上升，与曲张静脉之间压力差更易扩大，重新形成侧支通路，因而手术后复发出血率较高。而且断流手术后，门静脉压力上升，易于引发门静脉血流淤滞、术后腹水及胃粘膜充血、水肿等胃粘膜病变甚至出血的发生率上升。对于单纯由于血吸虫性肝硬化引起的门静脉高压症出血，脾切除附加断流手术有肯定治疗价值，要优先采用。其根本原因在于这类病人肝脏储备功能多较好，与肝炎后肝硬化有本质差别。

A选项中患者的肝脏储备功能不好，不宜行脾切除加大网膜腹膜后固定术。

44、B

【解析】外科感染按病程分类，3周内为急性感染，超过2个月为慢性感染，介于两者之间是亚急性感染。

45、A

【解析】胃大部切除范围中，胃的切断线解剖标志是在小弯侧胃左动脉第一降支至大弯侧胃网膜左动脉的最下第一个垂直分支的连线。按此连线可切除60%的远端胃组织。

46、C

【解析】如在L4~5椎间隙给药，病人仰卧位后大部分药液则会向骶段流动，麻醉平面容易偏低。

47、C

【解析】东莨菪碱可致中枢抗胆碱综合征，表现为谵妄、思维混乱、烦躁不安等。东莨菪碱较阿托品更易发生，术前有疼痛的患者和老年人发生率高，吸入麻醉药可增强这种作用。

48、C

【解析】血压80/50mmHg，脸色苍白为休克表现。

49、D

【解析】该患者为毛细血管瘤，首选激光治疗。

50、B

【解析】全身麻醉的麻醉深度分为三期：浅麻醉期，手术麻醉期，深麻醉期，题干症状提示患者进入浅麻醉期。

317普通外科学模拟考试(三)

(考试时间90分钟,总分100分)

准考证号:_____姓名:_____

一、客观选择题（共50题，每题2分，共计100分）

- () 1、二尖瓣狭窄时心脏在B超下的变化是
- A、左心房. 右心室肿大
 - B、左心房. 左心室肿大
 - C、右心房. 右心室肿大
 - D、全心肿大
 - E、各房室大小正常
- () 2、男性, 45岁, 排便后痛, 昨日突然加剧, 肛口可及一肿块, 直径1.5cm, 紫色, 触痛
- 应诊断为
- A、直肠癌
 - B、直肠息肉脱出
 - C、内痔脱出
 - D、血栓外痔脱出
 - E、肛瘘
- () 3、患者女, 67岁。因膝关节骨性关节炎继发较严重膝内翻, 拟行膝关节置换术。根据患者情况, 最好选择的假体是
- A、球臼式人工膝关节
 - B、单踝型人工膝关节
 - C、踝型人工膝关节
 - D、铰链式人工膝关节
 - E、铰链旋转式人工膝关节
- () 4、治疗中度以上烧伤补液时, 应首选
- A、生理盐水
 - B、5%葡萄糖溶液
 - C、2%碳酸氢钠溶液
 - D、10%葡萄糖溶液
 - E、平衡盐溶液

- () 5、脊柱骨折造成脱位并骨髓伴横切损伤，其损伤平面以下的改变，是
- A、同侧肢体运动消失，双侧肢体深浅感觉消失
 - B、同侧肢体运动和痛温觉消失，对侧肢体深感觉消失
 - C、同侧肢体运动和深感觉消失，对侧肢体痛温觉消失
 - D、同侧肢体痛温觉消失，对侧肢体痛温觉消失
 - E、双侧肢体完全截瘫
- () 6、患儿，男，3岁，不慎沸水烫伤头颈部及左上肢。则烫伤面积为
- A、39%
 - B、15%
 - C、20%
 - D、19%
 - E、27%
- () 7、脊柱侧凸是指脊柱向侧方弯曲。应用Cobb法测量站立位X线片的脊柱侧方弯曲，大于多少定义为脊柱侧凸
- A、大于 10°
 - B、大于 8°
 - C、大于 6°
 - D、大于 4°
 - E、大于 2°
- () 8、男性，35岁，诉乏力，心悸，恍惚，步履不稳已2年，其间先后3次出现精神失常和癫痫样发作，1个月前，因早餐前从事体力劳动，引起四肢抽搐，神志不清，验血糖 2.0mmol/L ，静脉注射50%葡萄糖溶液60ml后，症状缓解，既往无头部外伤史，无其他阳性体征。
- 诊断应考虑为
- A、症状性癫痫
 - B、特发性癫痫
 - C、胰岛素瘤
 - D、饥饿性低血糖
 - E、促胃液素瘤
- () 9、患者，男性，43岁，胸背痛1.5年，双下肢无力1个月，以右侧显著。行脊髓碘油造影显示，胸10水平造影剂在肿瘤下端梗阻，梗阻面造影剂呈“杯口状”充盈缺损，肿瘤影偏右侧，脊髓影被肿瘤推向左侧。此处肿瘤最可能是
- A、脂肪瘤
 - B、血管瘤

C、神经鞘瘤

D、皮样囊肿

E、室管膜瘤

- () 10、男性，54岁，反复脓血便半年，每天3~4次，在当地曾按痢疾治疗无明显效果。近1个月出现腹胀，伴阵发性腹痛。查体：消瘦，腹稍胀、软，下腹轻压痛，右下腹可扪及一肿块，质较硬，尚可活动。

根据上述案例，你的印象诊断是

A、慢性菌痢

B、克罗恩病

C、肠结核

D、消化性溃疡

E、结肠癌

- () 11、男性，20岁，因阑尾炎穿孔行阑尾切除术后1周，体温仍在38~39℃，腹胀腹痛，尿频，大便次数多。首先考虑

A、膈下脓肿

B、肠间脓肿

C、盆腔脓肿

D、脾破裂

E、胃十二指肠穿孔

- () 12、男，52岁，烧伤病人，烧伤总面积35%，其中III° 烧伤面积12%。该患者属于烧伤的类型是

A、特重烧伤

B、小面积烧伤

C、轻度烧伤

D、中度烧伤

E、重度烧伤

- () 13、一67岁女性患者，因膝关节骨性关节炎继发较严重膝内翻拟行膝关节置换治疗，选择哪种假体为好

A、髁型人工膝关节

B、铰链式人工膝关节

C、铰链旋转式人工膝关节

D、球臼式人工膝关节

E、单髁式人工膝关节

- () 14、中年女性，腹股沟韧带内侧的下外方突然出现包块，疼痛不能回纳，可能是
- A、腹股沟斜疝
 - B、腹股沟直疝
 - C、股疝
 - D、睾丸鞘膜积液
 - E、隐睾
- () 15、女性，36岁，在家中切菜时不慎切伤左手环指，查体见：左手环指创面整齐，末节余2 / 3，指骨外露，以下处理方法中哪种不恰当
- A、清创后缩短指骨，缝合皮肤
 - B、清创后用皮瓣移植闭合创口
 - C、清创后用胸壁带蒂皮瓣移植覆盖创口。
 - D、清创后用凡士林纱布包扎
 - E、清创后邻指皮瓣移植
- () 16、回结型肠套叠的典型X线表现为
- A、阶梯状排列的气液平面，常集中于腹中部
 - B、扩张的肠袢分布于腹部周围，可见结肠袋
 - C、钡灌肠有“杯口状”阴影
 - D、腹平片有“鱼骨刺”状影
 - E、肠袢里倒“U”字形排列
- () 17、对于烧伤防治的措施，下列错误的是
- A、全神营养支持
 - B、纠正休克
 - C、纠正水、电解质平衡失调
 - D、正确处理创面
 - E、大剂量长期应用广谱抗生素
- () 18、患者，青年男性，28岁，因腹水、肝大入院治疗，经进一步检查确诊为巴德-吉亚利综合征。
- 若患者确定为单纯下腔静脉膜性阻塞同时不伴有肝静脉阻塞，采用的外科治疗为
- A、腔-房转流术
 - B、应用球囊导管扩张
 - C、门-体静脉分流术
 - D、根治性矫正术

E、腹膜-颈静脉分流术

() 19、房间隔缺损听诊特点是

A、心尖部隆隆样舒张期杂音

B、胸骨左缘第3、4肋间连续性杂音

C、胸骨左缘第2肋间连续性杂音

D、胸骨左缘第2肋间收缩期杂音及固定性P2分裂

E、主动脉瓣区双期杂音

() 20、患者女，58岁。急性阑尾炎切除术后突发心肌梗死，心脏骤停，立即CPR，胸外电除颤2次，5分钟恢复自主循环和呼吸。1小时后行冠状动脉造影，支架置入术，循环稳定。第5天患者出现烦躁不安，呼吸28次/分，心率100次/分，血压140/86mmHg，X线胸片：双肺纹理增多。热导管给氧（5L/min）30分钟后， PaO_2 60mmHg，临床诊断ARDS。随后患者又出现尿少，实验室检查：血尿素氮28.56mmol/L，血肌酐530.4mmol/L。患者发生肾功能不全的原因是

A、肾脏缺氧

B、反射性肾血管收缩

C、限制液体输入血容量不足

D、药物毒性作用

E、并发休克

() 21、手术区域的消毒范围至少应达到

A、切口周围3~5cm

B、切口周围5~7cm

C、切口周围7~10cm

D、切口周围10~13cm

E、切口周围15~20cm

() 22、下列关于吸入性损伤的说法错误的是

A、热能可直接损伤呼吸道黏膜和肺实质，分为干性和湿性两种

B、刺激性咳嗽是早期最常见的症状

C、吸入干热空气大都损伤喉部和（或）气管尚不黏膜

D、早期征象主要与上呼吸道梗阻、一氧化碳中毒和缺氧他有关

E、湿热空气比热容量大，温度下降缓慢，可以造成严重的吸入性损伤

() 23、桡神经损伤后可出现

A、纽扣样畸形

B、鹅颈样畸形

C、垂腕垂指畸形

D、爪形手畸形

E、猿手畸形

() 24、关于慢性缩窄性心包炎的治疗，下列叙述哪项正确

A、内科保守治疗，静点心肌保护药物

B、一旦确诊应尽早手术

C、强心利尿治疗

D、待肝肾功能正常时考虑手术治疗

E、彻底治疗原发病因

() 25、有关肠梗阻的叙述，下列哪项是正确的

A、切口疝常是引起肠梗阻的原因

B、肠壁颜色暗红，水肿，增厚，肠腔扩张说明肠壁已无生机

C、X线腹部平片未见液平面，就可排除肠梗阻的诊断

D、急性结肠完全梗阻为闭袢性肠梗阻，易引起肠绞窄

E、急性肠系膜动脉血栓形成所致的肠梗阻，多见于青年人

() 26、大面积深度烧伤合并急性肾功能不全患者出现大面积创面溶痂、感染并有脓毒症征象，此时宜采取的创面处理措施是

A、创面包扎，全身应用强有力敏感抗生素

B、创面外用强有力敏感抗生素热敷

C、去除坏死焦痂，有效创面覆盖

D、暴露疗法，尽可能保痂

E、浸润促进自然脱痂

() 27、关于急性肝衰竭的发病基础，不包括

A、病毒性肝炎

B、多发性肝囊肿

C、化学物中毒

D、妊娠反应，Wilson病，Budd-Chiari综合征

E、严重创伤，休克，严重感染

() 28、患者，女性，40岁，半年前因急性阑尾炎行外科手术治疗，术后恢复正常，近一周来间断出现腹痛症状，腹痛以右下腹为主，伴有腹胀、恶心、呕吐、停止排便等症，入院查体：腹平软，压痛+，右下腹可扪及肠形包块，能闻及高调肠鸣音；X线钡剂：肠管呈螺旋状变细。

初步诊断考虑

A、结肠癌

- B、肠套叠
- C、结肠息肉
- D、结肠憩室病
- E、结肠扭转

() 29、下列哪种疾病与胃癌发病无关

- A、萎缩性胃炎
- B、胃溃疡
- C、胃息肉
- D、胃平滑肌瘤
- E、胃大部切除术后残胃

() 30、目前介入治疗中的经皮血管腔内成形术，主要是

- A、球囊导管扩张
- B、金属支架扩张
- C、导管塑形扩张
- D、药物溶解成形
- E、溶脂支架扩张

() 31、代谢性酸中毒病人一般不表现为

- A、面部潮红
- B、心率加快
- C、呼吸深而快
- D、尿液呈中性
- E、呼气有酮味

() 32、骨组织疾患可引起

- A、粉碎性骨折
- B、病理性骨折
- C、疲劳性骨折
- D、压缩性骨折
- E、撕脱性骨折

() 33、当抗利尿素与醛固酮分泌均增加时

- A、尿量减少，尿钠增多
- B、尿量增加，尿钠减少
- C、尿量减少，尿钠减少

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/938045103076006060>