

2024 年辽宁省铁岭县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试真题【考点梳理】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 雌二醇的适应症

- A: 前列腺癌
- B: 子宫内膜癌
- C: 子宫颈癌
- D: 绝经期前乳腺癌

答案：A

2. 具有变形运动和吞噬功能，可吞噬抗原抗体复合物或细菌的细胞为

- A: 嗜碱性粒细胞
- B: 嗜酸性粒细胞
- C: 中性粒细胞
- D: 淋巴细胞

答案：B

3. 患者，女，实验室检查：血红蛋白 95g/L，临床诊断为缺铁性贫血，处方口服硫酸亚铁片，下列想患者交代的用药注意事项，错误的是：

- A: 宜同时补充维生素 C
- B: 不宜同时进食牛奶和蛋类
- C: 不宜与铝剂同时服用
- D: 宜空腹服用

答案：D

4. 易经乳汁分泌药物的特性是

- A: 弱酸性
- B: 分子量大
- C: 蛋白结合率高
- D: 脂溶性高

答案：D

5. 以下药物中，可引起粒细胞减少症的是（）。

- A: 环磷酰胺
- B: 巯嘌呤
- C: 吲哚美辛
- D: 甲氨蝶呤

答案：C

6. 处方调配差错的内容

- A: 确认差错发生的过程、细节
- B: 药品名称出现差错
- C: 加强药品货位管理
- D: 通过药剂师双人复核制

答案：B

7. 患者到药店购买鱼肝油，药师应给予（）

- A: 维生素 AD
- B: 维生素 A
- C: 鱼油
- D: 维生素

答案：A

8. 水杨酸、萘甲唑啉等局部用药可引起中毒，即

- A: 药物代谢
- B: 药物吸收
- C: 药物分布
- D: 药物中毒

答案：B

9. 控制癫痫持续状态应首选

- A: 口服硫酸镁
- B: 静脉注射地西洋
- C: 静脉注射丙戊酸钠
- D: 肌肉注射地西洋

答案：B

10. 酒的主要成分为乙醇，饮用后人体先是兴奋，随之对中枢神经出现抑制，并扩张血管，刺激或抑制肝药酶代谢系统；另外，有些药也可延迟酒的代谢和分解。总体上，药与酒的相互作用结果有两个：一是降低药效；二是增加发生不良反应的几率。

- A: 过敏反应
- B: 低血糖反应
- C: 血糖不降
- D: 血压升高

答案：B

11. （2019 年真题）患者，女，57 岁，BMI31.2，诊断为 2 型糖尿病，经生活方式干预未能有效控制血糖，肝肾功能未见异常，初始治疗首选的药物是

- A: 阿卡波糖

B: 格列齐特

C: 二甲双胍

D: 吡格列酮

答案：C

12. 服用磺胺甲噁唑时

A: 禁吸烟

B: 宜多饮水

C: 忌用热水送服

D: 宜少饮水

答案：B

13. 孕妇用药应该格外谨慎，在不同孕期药物对胚胎和胎儿的影响不同，一般情况下，用药后不会出现畸形胎儿的时间是在受精后

A: 3 个月之后

B: 18 天之内

C: 21 天之内

D: 28 天之内

答案：B

14. 双氯芬酸片的适宜服用时间是

A: 早晨

B: 餐中

C: 餐后

D: 餐前

答案：C

15. 治疗皮肤疾病，最适宜选用的给药途径是

- A: 口服给药
- B: 直肠给药
- C: 局部给药
- D: 吸入给药

答案：C

16. 因可抑制前列腺内双氢睾酮水平而用于前列腺增生症治疗的药物是

- A: 特拉唑嗪
- B: 非那雄胺
- C: 前列康
- D: 黄酮哌酯

答案：B

17. 葡萄柚汁+非洛地平

- A: 抑制乙醛脱氢酶
- B: 产生有利的药物相互作用
- C: 造成听神经和肾功能不可逆性损害
- D: 抑制氧化代谢反应

答案：D

18. 用于治疗铅中毒的特殊解毒剂是

- A: 青霉胺
- B: 纳洛酮
- C: 氟马西尼
- D: 乙酰胺

答案：A

19. 患者于 1 周前无诱因出现咳嗽，咳嗽为阵发性，痰少，呈白色黏液性，不易咳出，同时出现发热，体温多在夜间升高，38℃左右，无畏冷、寒战、胸痛、咳血等，于卫生院治疗后，未见好转，并有气喘、气促，活动后呼吸困难等症状。入院治疗诊断为：肺炎。

A: 老人、有基础疾病或者需要住院的 CAP 患者常用第二、三代头孢菌素、 β -内酰胺类等

B: 喹诺酮类抗菌药物有胃肠道反应，一般不用

C: 青壮年和无基础疾病的 CAP 患者，常用青霉素和第一代头孢菌素

D: CAP 常见病原体为肺炎链球菌、支原体、衣原体、流感嗜血杆菌和呼吸道病毒

答案：B

20. 起效相对较慢，需 2~4 周，持续治疗可增加抗焦虑疗效的药物是

A: 加兰他敏

B: 苯海索

C: 丁螺环酮

D: 地西泮

答案：C

21. 如“齐二药事件”

A: 药品上市后风险评估

B: 药品上市前风险评估

C: 发现药品质量问题

D: 发现与规避假、劣药流入市场

答案：D

22. (2018 年真题) 瑞舒伐他汀钙的日剂量范围是 ()

A: 10~80mg

B: 40~200mg

C: 10~20mg

D: 5~20mg

答案：C

23. 便秘患者长期使用可引起结肠黑变病的药物是()

A: 聚乙二醇 4000

B: 番泻叶

C: 乳果糖

D: 硫酸镁

答案：B

24. 患者，男，45 岁，患有高血压，因感冒致发热、咽痛、流涕到药店买药，药师不应推荐其使用的药物是

A: 复方酚咖伪麻胶囊

B: 维 C 银翘片

C: 速感宁胶囊

D: 速克感冒片

答案：A

25. 可引起体位性低血压，服用后，患者由卧而坐起或由坐而站起等从低位向高位的转换动作时均应缓慢，动作不能突然的药物是

A: 左氧氟沙星

B: 头孢哌酮

C: 特拉唑嗪

D: 卡马西平

答案：C

26. 可待因属于兴奋剂中的

- A: 精神刺激剂
- B: 利尿剂
- C: β 受体阻断剂
- D: 麻醉药品

答案: D

27. 下列药物中不按兴奋剂管理的是

- A: 精神刺激剂
- B: 蛋白同化激素
- C: 钙通道阻滞剂
- D: 利尿剂

答案: C

28. 可用于治疗夜盲症的药物是

- A: 维生素 C
- B: 维生素
- C: 维生素 A
- D: 复合维生素 B

答案: C

29. 氟乙酰胺中毒的特效解毒剂是 ()

- A: 维生素 K1
- B: 青霉胺
- C: 乙酰胺
- D: 纳洛酮

答案: C

30. 服药期间饮酒，最容易出现肝损伤的药物是()

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 伪麻黄碱
- C: 氯苯那敏
- D: 布洛芬

答案：A

31. (毒物及药物中毒解救)，烯丙吗啡用于解救

- A: 吗啡中毒
- B: 氰化物中毒
- C: 有机磷中毒
- D: 水银中毒

答案：A

32. (2019 年真题) 患者，女，62 岁，2 型糖尿病伴下肢浮肿、活动后呼吸困难，不宜选用的药物是

- A: 格列齐特
- B: 二甲双胍
- C: 阿卡波糖
- D: 吡格列酮

答案：D

33. 应用华法林抗凝过程中，出现严重出血时，可应用急救的药物是

- A: 维生素 B1
- B: 维生素 K3
- C: 维生素 K4
- D: 维生素 K1

答案：D

34. 下列药物信息源中，归属于一级文献资料的是

- A: 中国药学杂志
- B: 新编药物学
- C: 中国药学文摘
- D: 中国药学年鉴

答案：A

35. (2015 年真题) 过量服用维生素 D 所发生中毒的典型临床表现是 ()。

- A: 骨骼发育不良或骨软化
- B: 骨质疏松症或骨折
- C: 间质性肾炎或肾结石
- D: 横纹肌溶解或肌痛

答案：C

36. 维持心脏、神经及消化系统正常功能所必需，缺乏可出现脚气病的是

- A: 维生素 D
- B: 维生素 A
- C: 维生素 C
- D: 维生素 B1

答案：D

37. 引起药源性肾病的药物,含马兜铃酸的中药可导致

- A: 前列腺素合成障碍
- B: 肾间质纤维化
- C: 肾小管阻塞

D: 直接肾毒性

答案：B

38. 我国 CAP 的常见病原体不包括

A: 流感嗜血杆菌

B: 肺炎衣原体

C: 金黄色葡萄球菌

D: 铜绿假单胞菌

答案：D

39. 泡腾片的使用正确的是

A: 幼儿可自行服用

B: 100~150ml 凉开/温水中浸泡

C: 150~200ml 冷水中浸泡

D: 50~100ml 热水中浸泡

答案：B

40. 患者，男，60 岁，身高 170cm，体重 85kg。既往有伴血浆同型半胱氨酸升高的高血压、糖尿病、高脂血症及心肌梗死病史。近日因夜间咳嗽并伴有粉红色泡沫样痰就诊。查体：心率 100 次/分、血压 160/100mmHg，血总胆固醇及三酰甘油均高于正常。诊断：伴血浆同型半胱氨酸升高的高血压、心力衰竭。

A: ACEI 或者 ARB 和 β 受体阻断剂

B: 强心苷类和维拉帕米联合应用

C: 利尿剂

D: ACEI 与 ARB 联合应用

答案：A

41. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L、甘油三酯 1.52mmol / L(正常参考区间 0.56~1.70mmol / L)、总胆固醇 6.26mmol / L(正常参考区间 <5.2mmol / L)、低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol / L(正常参考区间 2.1~3.1mmol / L)、高密度脂蛋白胆固醇 1.2mmol / L(正常参考区间 1.2~1.65mmol / L)、血肌酐 50μmol / L(正常参考区间 45~84 μmol / L)、尿蛋白(++)。临床诊断：高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 复方利血平
- B: 依那普利
- C: 特拉唑嗪
- D: 氢氯噻嗪

答案：B

42. 患者，女，59 岁，绝经后 3 年，近日出现腰背疼痛，负重时疼痛加剧骨密度 T 值为 -3.5，诊断为骨质疏松每天补充维生素 D800IU 元素钙 500mg 同时给予唑来膦酸治疗。唑来膦酸正确的给药方案是()

- A: 10mg 口服每日一次
- B: 5mg 静脉滴注，每年一次
- C: 4mg 静脉滴注，每日一次
- D: 5mg 静脉滴注，每周一次

答案：B

43. 患者，女，30 岁，既往体健，无癫痫病史怀孕 8 个月，突然出现抽搐，从小腹开始，发展至全身，口唇发绀，意识丧失，诊断为子痫，应选用的治疗方法是()

- A: 50%葡萄糖注射液湿敷
- B: 25%硫酸镁注射液稀释后静脉注射

C: 5%氯化钙注射液静脉滴注

D: 50%硫酸镁溶液口服

答案：B

44. 可引起红细胞增多的是

A: 泌尿系统感染

B: 缺铁性贫血

C: 机体缺氧和高原生活

D: 妊娠 3 个月以上

答案：C

45. 受精后 3 周至 3 个月（12 周末之前）

A: 几乎见不到药物的致畸作用

B: 可产生形态或功能的异常而造成畸形

C: 中枢神经系统发育迟缓

D: 女性生殖系统发育迟缓

答案：B

46. 高血压合并冠心病，偶发窦性心动过速宜选用的药物是

A: 美托洛尔

B: 非洛地平

C: 缬沙坦

D: 氢氯噻嗪

答案：A

47. 属于治疗沙眼的处方药的是

A: 红霉素眼膏

B: 硫酸锌滴眼剂

C: 磺胺醋酰钠滴眼剂

D: 硫酸铜棒

答案: D

48. 赵某，男性，60 岁，既往高血压病史 8 年。与邻居吵架后突然起病，言语不清、左侧肢体无力、意识不清。查体：BP210 / 120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激阳性，左侧肢体无法活动，左侧巴宾斯基征阳性。

A: 甘油果糖

B: 硝普钠

C: 尼莫地平

D: 呋塞米

答案: A

49. 与舒筋活络酒不宜联用的药物是

A: 苯巴比妥

B: 可待因

C: 氢氧化铝

D: 阿托品

答案: A

50. 恶性肿瘤

A: 白细胞增多

B: 淋巴细胞增多

C: 红细胞沉降率减慢

D: 血小板增多

答案: A

51. 队列研究试验结果属于循证医学证据级别

- A: 4 级证据
- B: 1 级证据
- C: 3 级证据
- D: 2 级证据

答案: D

52. 为使铁剂更好的被人体吸收，宜同时应用

- A: 叶酸+维生素 B12
- B: 维生素 C
- C: 亚叶酸钙
- D: 硫酸亚铁

答案: B

53. (2015 年真题) 处方中“餐后给药”的外文缩写是 ()。

- A: po
- B: pc
- C: Ac
- D: qn

答案: B

54. 消化性溃疡抗 Hp 的四联疗法使用疗程为

- A: 4~6 周
- B: 6~8 周
- C: 8~12 周
- D: 1~2 周

答案: D

55. 患者，女，39 岁，有哮喘病史。1 天前因发热服用阿司匹林 250mg，用药后 30 分钟哮喘严重发作，大汗、发绀、强迫坐位。

- A: 这是由于发热引发了哮喘
- B: 可用肾上腺素治疗
- C: 这是由于阿司匹林诱发了哮喘
- D: 这是阿司匹林中毒的表现

答案：C

56. 痛经伴有精神紧张者可口服

- A: 阿司匹林
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 布洛芬
- D: 谷维素

答案：D

57. 患者，女，26 岁，临床诊断为“甲状腺功能亢进症”，给予丙硫氧嘧啶 450mg / d 治疗，应嘱咐患者定期复查以下哪项指标

- A: 血红蛋白
- B: 嗜酸粒细胞
- C: 红细胞
- D: 白细胞

答案：D

58. 服用降压避风片、脉君安片、珍菊降压片等降压中成药的患者，必须慎用的化学药品是

- A: 螺内酯
- B: 氢氯噻嗪
- C: 硝苯地平

D: 缬沙坦

答案：B

59. 吸附力强、可阻止毒物吸收，但是对氰化物无效的洗胃液是

A: 药用炭混悬液

B: 鸡蛋白

C: 1%硫酸镁溶液

D: 牛奶-水混合液

答案：A

60. 蒽环类药物的主要毒副作用是（）

A: 溶血性尿毒症

B: 出血性膀胱炎

C: 肺纤维化

D: 心脏毒性

答案：D

61. 氨苄西林可能引起

A: 尿酮体

B: 尿沉渣结晶

C: 尿血红蛋白

D: 尿肌酐

答案：B

62. 下列药物中，属于弱阿片类药物的为

A: 美沙酮

B: 哌替啶

C: 吗啡

D: 曲马多

答案: D

63. 以最低的药物成本，实现最好的治疗效果体现

A: 有效性

B: 经济性

C: 安全性

D: 规范性

答案: B

64. 反复吸入亚硝酸异戊酯，可解救

A: 氯丙嗪中毒

B: 氰化氢中毒

C: 丙米嗪中毒

D: 苯丙胺中毒

答案: B

65. 运动员禁用药物中， β 受体阻断剂产生的危害是

A: 诱发高血压、冠心病、心肌梗死、脑动脉硬化和脑血管破裂，以及引起肝癌、肾癌等疾患

B: 能使伤口进一步恶化、导致呼吸困难和药物依赖

C: 易造成人体严重脱水、肾衰竭

D: 长期使用后突然停药，则会引发心跳过速、心肌梗死，乃至突然死亡

答案: D

66. 联合用药可使异烟肼失去抗菌作用的中成药

A: 香连片（黄连）

B: 蛇胆川贝液（苦杏仁苷）

C: 丹参片（丹参酮）

D: 昆布片（碘）

答案：D

67. 患者，女，58 岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。目前体检：身高 160cm，体重 70kg。实验室检查：白细胞 $8.0 \times 10^9 / L$ ，红细胞 $4.0 \times 10^{12} / L$ ，总胆红素 $11 \mu mol / L$ ，总胆固醇 $6.0 mmol / L$ ，空腹血糖 $7.6 mmol / L$ 。

A: 格列齐特

B: 二甲双胍

C: 辛伐他汀

D: 非诺贝特

答案：B

68. 属于 COMT 抑制剂的是

A: 恩托卡朋

B: 普拉克索

C: 司来吉兰

D: 苯海索

答案：A

69. （2017 年真题）患者，女，54 岁。诊断为类风湿关节炎 2 年，目前服用甲氨蝶呤（15mgqw）和塞来昔布（200mgqd）。患者因担心药品不良反应用药规律时断时续近日出现腕关节肿胀和疼痛加重晨僵明显加用泼尼松 10mgqd。

A: 早期治疗、遵医嘱规律用药

B: 一旦症状改善，应即刻停药

C: 定期就诊评估病情,调整治疗方案

D: 多晒太阳适量补充钙剂、维生素 D 预防骨质疏松

答案: B

70. 《中国药典》2015 年版分为几部

A: 一部

B: 二部

C: 四部

D: 三部

答案: C

71. I 期临床试验阶段, 试验样本数为多少例

A: <10 例

B: 200~300 例

C: 20~30 例

D: 1000~3000 例

答案: C

72. 属于公众用药咨询的是

A: 减肥、补钙、补充营养素

B: 抗菌药物的合理应用

C: 注射剂溶媒的正确选择

D: 栓剂、气雾剂的正确使用方法

答案: A

73. 艾滋病抗病毒治疗强调须多种药物联合治疗, 俗称”鸡尾酒疗法”, 目前国内免费治疗的一线方案是 ()

A: 替诺福韦+依非韦伦+雷特格韦

- B: 拉米夫定+司他夫定+奈韦拉平
- C: 齐多夫定+依非韦伦+利托那韦
- D: 拉米夫定+替诺福韦+齐多夫定

答案：B

74. 下列药物中，可用于房颤时转复并维持窦性心律的药物为

- A: 硝苯地平
- B: 利伐沙班
- C: 胺碘酮
- D: 去乙酰毛花苷

答案：C

75. 适宜睡前服用，用于抑制“酸突破现象”的抑酸剂是

- A: 硫糖铝
- B: 乳酸菌素
- C: 法莫替丁
- D: 铝碳酸镁

答案：C

76. 在治疗口腔溃疡的药品中，可能致使儿童和青年偶发口腔无痛性浅表脱屑损害的是

- A: 氯己定含漱剂
- B: 西地碘含片
- C: 甲硝唑粘贴片
- D: 左旋咪唑

答案：A

77. (2016 年真题) 服药期间饮酒，最容易出现肝损伤的药物是 ()。

- A: 伪麻黄碱
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 氯苯那敏
- D: 布洛芬

答案：B

78. 大剂量或连续使用顺铂导致

- A: 前列腺素合成障碍
- B: 阻塞肾小管、肾小球
- C: 肾小管坏死
- D: 肾间质纤维化

答案：C

79. 下述药物中，具有肝药酶诱导作用的是

- A: 西咪替丁
- B: 环丙沙星
- C: 卡马西平
- D: 胺碘酮

答案：C

80. 可与吸入性糖皮质激素合用的长效 β_2 受体激动剂是

- A: 沙美特罗
- B: 噻托溴铵
- C: 异丙托溴铵
- D: 孟鲁司特

答案：A

81. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素和药物因素。

- A: 肾病患者服用呋喃妥因可引起周围神经炎
- B: 口服避孕药致阿米替林清除率下降
- C: 氯霉素在新生儿体内蓄积可导致灰婴综合征
- D: 服用阿司匹林出现哮喘、慢性荨麻疹等

答案：B

82. （2017 年真题）患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流清涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 葡萄糖酸锌口服液
- B: 头孢克洛干混悬剂
- C: 感冒清热冲剂
- D: 维生素 C 片

答案：B

83. 服药后 1h 内限制饮水的药物是

- A: 磺胺类药物
- B: 镇静催眠药
- C: 胃黏膜保护剂
- D: 微生态制剂

答案：C

84. 抗蠕虫药不宜长时间应用，如果长时间应用将

- A: 影响蛋白代谢

- B: 影响糖吸收
- C: 影响糖代谢
- D: 影响脂肪代谢

答案：C

85. 适用于年轻、震颤突出的患者

- A: 恩托卡朋
- B: 苯海索
- C: 司来吉兰
- D: 左旋多巴

答案：B

86. 长期服用苯妥英钠，可能导致

- A: 丙氨酸氨基转移酶升高
- B: 血清碱性磷酸酶升高
- C: γ -谷氨酰转移酶升高
- D: A/G 值低于 1

答案：C

87. 除全身症状外，尚有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状

- A: 胃肠型
- B: 病毒型
- C: 肺炎型
- D: 神经型

答案：A

88. 下列关于抗抑郁药的合理应用与药学监护的说法，错误的是

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 抗抑郁药起效较快，使用 1 周后可判定疗效

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/938057142115007022>