八年级生物下册期末考试卷含答案


[范围:第七、八单元　时间:60分钟　分值:100分]

一、选择题(每小题2分,共50分)


1.如图QM-1为桃的果实结构图,关于果实和种子的形成,叙述正确的是(　　)

A.果实由果皮和种子构成　　B.①表示果皮,由胚珠发育而来

C.②表示种子,由受精卵发育而来　　D.果实由子房壁发育而来



图QM-1



图QM-2

2.对于图QM-2所示过程的描述,正确的是(　　)

A.该图表示扦插过程

B.图中所示为有性生殖过程

C.②为①提供生长发育所需的水分和无机盐

D.①以后所结果实性状由②决定

3.下列关于动植物生殖、发育的说法,正确的是　(　　)


A.生殖期的青蛙雌雄抱对,体内受精,水中变态发育

B.毛毛虫长大后变成美丽的蝴蝶要经过卵、幼虫、成虫期

C.鸟的受精卵从母体产出后,在亲鸟的孵化下才开始发育

D.用嫁接的方法可实现同一棵桃树上结出不同口味的桃子

4.如图QM-3为染色体组成示意图。有关叙述不正确的是　(　　)



图QM-3

A.①是遗传物质DNA　　B.每个①上只有一个基因

C.③主要由蛋白质和DNA构成　　D.人的体细胞中③是成对存在的

5.(2020绵阳)小绵是一名初二女生,去年她的父母响应国家的二孩政策,

又生了一个弟弟小阳。不同来源的X染色体因含有的基因存在差异而有所不同,因此,父亲的性染色体组成可记作X_1Y,母亲的性染色体组成可记作X_2X_3。那么,关于小绵和小阳体细胞内的X染色体,下列说法正确的是 (　　)

A.小绵没有与父亲相同的X染色体

B.小绵没有与母亲相同的X染色体

C.小阳没有与父亲相同的X染色体

D.小阳没有与母亲相同的X染色体

6.2020年2月,爱丁堡大学研究人员成功将发育初期的人类卵细胞培育为成熟的卵细胞,成熟的卵细胞可以完成受精作用,这为生育治疗提供了新途径。下列叙述正确的是　(　　)


A.应从子宫中提取发育成熟的卵细胞

B.成熟的卵细胞是新个体发育的起点

C.成熟的卵细胞中包含个体发育的全部遗传信息

D.成熟卵细胞中性染色体组成为X

7.如图QM-4是豌豆杂交实验的遗传图解。下列叙述错误的是　(　　)



图QM-4

A.紫花是显性性状,白花是隐性性状

B.亲代紫花和子一代紫花的基因组成相同

C.子二代紫花的基因组成有两种

D.豌豆的紫花和白花是一对相对性状

8.下列有关生物遗传与变异的叙述,错误的是 (　　)

A.不同的基因含有控制不同性状的遗传信息

B.染色体数目的稳定对生物的遗传具有重要意义

C.变异的存在使生物适应不断变化的环境成为可能

D.生物的遗传和变异导致了生物的进化

9.人的褐眼(A)与蓝眼(a)是一对相对性状,如图QM-5表示某家庭眼睛颜色的遗传情况(■表示蓝眼男性),下列相关分析错误的是　(　　)




图 QM-5

A.1、2 号夫妇褐眼的基因组成均为 Aa,生殖细胞中染色体数均为 23 条

B.4 号个体蓝眼的基因组成是 aa,心肌细胞中染色体组成是 22 对+XY

C.3 号个体褐眼的基因组成一定是 Aa,生殖细胞中染色体组成是 22 条+X

D.该夫妇再生一个蓝眼男孩的概率是$\frac{1}{8}$

10. 关于生命的起源,下列叙述正确的是（　　）

①生命起源于非生命的物质　②生命起源于陆地

③原始大气的成分主要是水蒸气、氨、甲烷等　④现在地球上不可能再形成原始生命

A.①②③　　B.①②④　　C.①③④　　D.②③④

11.化石证明有许多物种只存活了相当短暂的时代就逐渐灭绝了,最能解释这一现象的是（　　）

A.缺乏能适应环境变化的可遗传变异

B.缺乏产生变异的能力

C.人类利用遗传学知识改造了这些生物

D.繁殖能力太低而逐渐灭绝了

12.能在沙漠生活的植物,一般根系特别发达,或叶片变为刺,那些吸水、保水功能差的植物在沙漠中不能生存,达尔文对这一现象的解释是（　　）

A.生物个体间存在着差异

B.生物具有遗传特性

C.生物的变异对生存是不利的

D.适应环境的变异个体易生存

13.滇叶蝉是一种珍稀的竹节虫品种。成虫有头有脚,肢节分明,有清晰的“脉络”,酷似被吃过的不规则叶片,若静止不动,很难被发现,称得上是自然界高级别伪装大师。对其形成原因的正确解释是(　　)

A.长期自然选择的结果　　B.长期人工选择的结果

C.过度繁殖的结果　　D.只发生有利变异的结果

14.(2020遵义)桦树皮颜色呈浅灰色,生活在桦树林内的桦尺蛾,其体色大多与桦树皮颜色相似,造成这种现象的原因是 (　　)

A.只繁殖与桦树皮颜色相似的桦尺蛾

B.与桦树皮颜色相似的桦尺蛾不易被天敌发现

C.与桦树皮颜色相似的桦尺蛾味道不好,食蛾鸟不喜欢吃

D.与桦树皮颜色相似的桦尺蛾运动能力强,不易被捕捉

15.下列关于传染病和遗传病的叙述,正确的是　　(　　)

A.传染病具有传染性和流行性,遗传病具有遗传性

B.小明的父亲患乙肝,他也患乙肝,所以乙肝是遗传病

C.小张和妻子是近亲,小张患白化病,妻子正常,他们的孩子一定患白化病

D.传染病与遗传病一样,只要注意健康的生活方式,都是可预防和治疗的

16.(2021邵阳)目前,我国大力推行全民接种新冠疫苗,从免疫学角度分析,新冠病毒、新冠疫苗、新冠肺炎患者分别属于　(　　)

A.病原体、抗原、传染源　　B.抗体、抗原、传染源

C.传染源、抗体、抗原　　D.病原体、抗体、抗原

17.艾滋病是人体感染了人类免疫缺陷病毒(HIV)所导致的传染病,现已成为全球范围内的“重要杀手”。下列有关艾滋病和HIV的叙述,错误的是(　　)

A.艾滋病病人是传染源

B.艾滋病可通过血液、精液、唾液、乳汁等体液传播

C.HIV由蛋白质外壳和内部遗传物质组成

D.HIV由一个细胞构成,没有成形的细胞核

18.人能在有大量病原体存在的环境中健康生活,是因为人类在漫长的进化过程中,形成了防御病原体的三道防线。白细胞参与其中的　　(　　)

A.第二道防线　　B.第一道和第二道防线

C.第三道防线　　D.第二道和第三道防线

19.“良药苦口利于病”,正确用药对于治疗疾病非常重要,下列做法不正确的是　(　　)

A.处方药可到医药超市随便购买

B.非处方药可自己到医药超市购买

C.用药前要仔细阅读药品说明书

D.“是药三分毒”,药物要合理使用

20.下列有关健康生活的说法,正确的是 （ ）


A.近视眼可以通过戴凸透镜矫正

B.药品分处方药和非处方药,非处方药的标识是OTC

C.吸烟可以使人打起精神,所以说吸烟对人体无害

D.艾滋病是传染病,可通过母婴传播和同桌进餐传染

21.A、B两妇女在1到5月血浆中人乳头瘤状病毒抗体的相对含量如图QM-6所示。下列对曲线图的解释不合理的是 （ ）



图QM-6

A.妇女A在1月份接种了疫苗,妇女B没有

B.两人均在4月份感染了人乳头瘤状病毒

C.人乳头瘤状病毒疫苗刺激机体产生了相应的抗体

D.妇女A的非特异性免疫较妇女B强

22.生命是顽强的,也是脆弱的,需要去关爱和呵护。下列生命健康的相关知识错误的是（ ）

A.传染病是由病原体(如细菌、病毒、寄生虫等)引起的、能在人与人之间或人与动物之间传播的疾病,如流感、甲肝等

B.HIV主要通过血液、不安全的性行为、母婴传播,与艾滋病患者的一般接触(如握手、共餐、拥抱等)不会使人感染艾滋病

C.生活方式是指人们在日常生活中所遵循的各种行为习惯,生活方式取决于个人喜好,不影响人体的健康

D.健康的机体具有一定的抵抗病原体的能力

23.下列对人体健康的描述,不恰当的是 （ ）

A.传染病患者康复后体内一定存在相应抗体

B.大面积烧伤的病人更容易被病原体感染

C.接种卡介苗是预防肺结核的最有效方法

D.保持健康的心态有助于神经系统发育

24.下列对生物进化过程的叙述,正确的是　　(　　)

A.自然选择学说认为生物个体都有遗传和变异的特性

B.体型大、体格健壮的动物在生存斗争中不易被淘汰

C.古代长颈鹿为吃到高处的树叶,颈经常使用,逐渐进化成了现在的长颈鹿

D.米勒实验表明,原始地球上能形成多种氨基酸和核酸

25.下列关于生物技术的叙述中,正确的是　　(　　)

A.克隆动物有生育自己的“母亲”,所以它应该是一种有性生殖方式

B.克隆动物的遗传信息主要来自提供细胞核的亲本

C.通过转基因技术使生物产生的变异是一种不遗传的变异

D.异体器官移植会排斥的原因是人体的非特异性免疫

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
答案													
题号	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
答案													

二、非选择题(共 50 分)

26.(5 分)生物通过生殖和发育,使得生命在生物圈中世代相续,生生不息。如图 QM-7 是几种生物的生殖和发育过程,据图回答问题。




图 QM-7


(1)图中属于无性生殖的是_____(填序号)。

(2)②图的关键步骤是要确保 a、b 两部分的_____紧密结合,接穗才能成活。

(3)①图表示青蛙的变态发育:其幼体生活在水中,用鳃呼吸,用尾运动;成体水陆两栖,用_____和皮肤呼吸,靠四肢运动。

(4)蚊是生活中常见的一种昆虫,它的发育方式为_____(填“完全变态发育”或“不完全变态发育”)。由于它是登革热、疟疾、寨卡病毒病等病原体的传播媒介,所以我们应想办法控制其数量,确保人类健康。请提出控制蚊数量的具体措施:_____(写出一点即可)。

27.(8分)人的棕色眼睛和蓝色眼睛由一对基因控制(显性基因用D表示,隐性基因用d表示)。如图QM-8甲是一个家族眼睛颜色的遗传情况,图乙所示为人的生殖过程中,一个受精卵分裂后偶然发育为两个胚胎,两个胚胎发育成两个孩子的部分阶段,请分析回答:



图QM-8

(1)由图甲家族眼睛颜色遗传情况可推断,4和5的基因组成分别是_____,6的基因组成是_____。

(2)7和8的子女中,有两个是双胞胎,其生殖过程如图乙所示,据此可知_____(填序号)是双胞胎,A和B所含的性染色体分别是_____。在上述生殖过程中,产生A的器官是_____,A和B结合为受精卵的场所是_____。

(3)若3和4再生一个孩子,则这个孩子的眼睛颜色是蓝色的概率是_____。9的眼睛颜色为蓝色,与父母眼睛颜色不同,这种变异属于_____的变异。

28.(18分)阅读下列材料,分析并回答问题。

材料一 自3·15央视重点曝光“辣条”的生产过程以来,最近全国各市采取诸多举措保障“舌尖上的安全”,包括对各学校食堂实行“明厨亮灶”改造工程,同时加强对学校餐具是否严格消毒、食用油是否过氧化值酸价超标、蔬菜是否存在农药残留、肉类食品是否含有瘦肉精等指标进行检测。

材料二 炎炎夏日,游泳是孩子们喜欢的健身活动。市教育局通过发放文字宣传资料、安全教育平台视频学习等多种手段来普及游泳时应注意的事项,确保全市中小学生安全顺利度过暑期。

(1) 材料一中“加强对学校餐具是否严格消毒、食用油是否过氧化值酸价超标、蔬菜是否存在农药残留、肉类食品是否含有瘦肉精等指标进行检测”,属于预防传染病的_____措施。

(2)俗话说“笑一笑,十年少。”保持良好的心态,积极健康的生活方式,可以增强体质,更有效地阻挡外界病原体入侵,从免疫的角度来看,这属于_____。(填免疫类型)

(3)甲型肝炎是通过饮食传播的一种疾病。为了预防甲型肝炎,医生采取了许多预防传染病的措施,如对急性甲型肝炎患者进行隔离治疗属于_____。

(4)“舌尖上的安全”关乎我们的生命安全和身体健康。在购买袋装食品时,你会从哪些方面注意食品的安全?_____。(至少答出两点)

(5)材料二中,游泳需要消耗大量能量,能量来自肌细胞内_____的氧化分解。当你游泳时发现有人溺水,救起时他已无呼吸和心跳,立即拨打急救电话_____。在急救车到达之前,先进行_____,及时清理其口鼻内的杂物,保持_____的畅通,然后进行_____。

29.(7 分)模拟实验“精子与卵细胞随机结合”的基本做法为:用 30 颗白围棋子,10 颗黑围棋子按一定原理装入两纸盒中,每次从两纸盒中各摸取一颗围棋子。记录白白、黑白的组合数量如下表。请分析作答:

	1组	2组	3组	4组	5组	6组	7组	8组	9组	10组	合计	比例
白白	2	6	3	5	4	9	6	5	7	5		
黑白	8	4	7	5	6	1	4	5	3	5		




图 QM-9

(1)如图 QM-9 是人体体细胞内一对性染色体组成,表示的性别为_____,a 染色体在模拟实验中应该用_____色围棋子表示,a 染色体上的遗传物质是_____,

其中有遗传效应的片段叫_____。

(2)在做数据统计分析时,上表中第6组的数据应该_____(填“保留”或“舍弃”)。

(3)模拟实验的操作过程中,下列做法错误的是_____。

A.选用透明塑料盒

B.记录完后放回原纸盒并摇匀

C.取棋子时不看——盲摸

D.在一纸盒中放入数目相等的黑白棋子

(4)模拟“精子与卵细胞随机结合”的实验结果说明了什么问题?_____。

30.(12分)金鱼原产于中国,在我国已有近千年的饲养历史。金鱼品种繁多、姿态各异,是世界上著名的观赏鱼类。

(1)金鱼身体的透明与有杂斑是一对相对性状,受一对基因控制(用A、a表示)。为研究其遗传规律,研究人员用杂斑鱼和透明鱼进行了如图QM-10所示杂交实验。

杂交一		杂交二		
亲代	透明鱼×透明鱼	亲代	透明鱼×杂斑鱼	
↓		↓		
子代	透明鱼	子代	透明鱼	杂斑鱼
子代数量	1027条	子代数量	494条	458条

图QM-10

①由上述杂交实验_____(填“能”或“不能”)判断这对相对性状的显隐性。

②研究人员选择杂交二实验中的子代杂斑鱼雌雄个体进行交配,后代出现了透明鱼。推测这些杂斑鱼的基因组成是_____。

(2)摄食反射是一种简单反射。在人为条件下,当动物将光与摄食之间建立联系以后,就形成了一种复杂反射,这种复杂摄食反射的结构基础是_____。

(3)为研究不同波长的光对金鱼建立复杂摄食反射的时间长短是否有影响,科研人员进行了如下实验:

①平均体长为8 cm的同种杂斑金鱼200条,随机分为两组。置于不同的鱼缸中。两鱼缸中水的溶氧量、水温等条件相同且适宜。

②将两鱼缸在实验开始前置于_____环境中,实验开始时,分别用红光和绿光照射,然后喂以饲料,光照时间持续15分钟。

③上述过程持续6天,在此过程中,记录金鱼在_____时有摄食行为反应的条数,并计算出所占比例,结果如图QM-11所示。




图 QM-11

实验结果表明,一段时间后,两种不同波长的光都能使金鱼建立起复杂摄食反射,其中_____使金鱼建立复杂摄食反射的时间更短。

答案

期末综合测试

1.A　果实包括果皮和种子;①表示果皮,由子房壁发育而来;②表示种子,由胚珠发育而来;果实由子房发育而来。

2.C　图示为嫁接;嫁接没有经过两性生殖细胞的结合,由母体直接产生新个体,属于无性生殖;①是接穗,②是砧木,①以后所结果实的性状由①接穗决定。

3.D　青蛙是两栖动物,两栖动物的幼体生活在水中,用鳃呼吸,成体营水陆两栖生活,用肺呼吸,皮肤辅助呼吸;体外受精,幼体和成体在形态结构和生活习性上差异很大,属于变态发育;毛毛虫要经过卵→幼虫→蛹→成虫四个时期,属于完全变态发育;鸟的受精卵在雌鸟的体内就已经开始发育了;嫁接是指把一个植物体的芽或枝,接在另一个植物体上,使结合在一起的两部分长成一个完整的植物体。接上去的芽或枝叫接穗,被接的植物体叫砧木。用嫁接的方法可实现同一棵桃树上结出不同口味的桃子。

4.B　图中①是 DNA,②是蛋白质,③是染色体。因此,③染色体由蛋白质和 DNA 组成;①DNA 为双螺旋结构,是主要的遗传物质;DNA 上有很多个具有特定遗传效应的片段叫基因,一个 DNA 分子上包含有多个基因。人的体细胞中③染色体是成对存在的。


5.C

6.D　由题干可知,该研究提取的是发育初期的人类卵细胞,所以应从卵巢中提取;新个体发育的起点是受精卵,而不是卵细胞;卵细胞中只含有体细胞一半的遗传物质,并不包含个体发育的全部遗传信息;Y 染色体只存在于男性体内,女性体细胞中性染色体是 XX,卵细胞中的性染色体是体细胞的一半,所以成熟卵细胞中性染色体组成为 X。

7.B　紫花和白花豌豆作为亲本进行杂交,子代豌豆只出现了紫花,因此紫花是显性性状,白花是隐性性状;花的紫色对于白色是显性性状,若控制显性、隐性性状的基因分别用 A、a 表示,亲代白花的基因组成一定是 aa,紫花的基因组成是 AA,而子一代紫花的基因组成是 Aa,所以亲代紫花和子一代紫花的基因组成不相同;让子一代(F_1)紫花进行自交,子二代(F_2)紫花的基因组成有 AA 或 Aa 两种;豌豆的紫花和白花是一对相对性状。

8.D　生物的遗传和变异是生物进化的基础,而环境的改变才导致了生物的进化。

9.C　显性基因控制显性性状,隐性基因控制隐性性状,当控制某一性状的基因一个是显性,一个是隐性时,只表现出显性基因控制的性状。人的褐眼(A)与蓝眼(a)是一对相对性状,由题图知,人的褐眼是由显性基因 A 控制的,蓝眼是由隐性基因 a 控制的。4 号个体为隐性性状蓝眼,其基因组成是 aa,分别来自亲代 1、2,所以亲代 1、2 的基因组成一定是 Aa,遗传图解如图所示:



1、2 号夫妇的基因组成均为 Aa,生殖细胞中染色体数均为 23 条;4 号是蓝眼,其控制蓝眼的基因组成是 aa,4 号是男性,人的体细胞内有 23 对染色体,因此其心肌细胞中染色体组成是 22 对+XY;根据遗传图解可知:3 号个体的基因组成是 AA 或 Aa,3 号是女性,生殖细胞中染色体组成是 22 条+X;根据遗传图解可知:该夫妇再生一个孩子是蓝眼的概率为$\frac{1}{4}$,是男孩还是女孩的概率各占$\frac{1}{2}$,因此该夫妇再生一个蓝眼男孩的概率为$\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$。

10.C

11.A　在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去。反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存。

12.D　13.A　14.B

15.A　传染病具有传染性和流行性,遗传病具有遗传性;小明的父亲患乙肝,他也患乙肝,乙肝是传染病,而不是遗传病;小张和妻子是近亲,小张患白化病,妻子正常,他们的孩子患白化病的可能性大,而不是一定患白化病;传染病只要注意健康的生活方式,是可预防和治疗的,

而遗传病目前只能预防,还不能有效治疗。

16.A　17.D

18.D　人体的第二道防线指的是体液中的杀菌物质和吞噬细胞,体液中含有的一些杀菌物质能破坏多种病菌的细胞壁,使病菌溶解而死亡。吞噬细胞能吞噬和消灭侵入人体的各种病原体。吞噬细胞属于白细胞。人体的第三道防线由免疫器官和免疫细胞(主要是淋巴细胞)组成,淋巴细胞也是白细胞的一种。故白细胞可以参与人体的第二道和第三道防线。

19.A　处方药是指必须凭执业医师或执业助理医师的处方才可以购买,并按医嘱服用的药物,不可以到医药超市随便购买;非处方药适于消费者容易自我诊断、自我治疗的小伤小病,简称OTC,可自己到医药超市购买;在使用药物之前,应该仔细阅读药品说明书,了解药物的主要成分、适应症、用法与用量、药品规格、注意事项、生产日期和有效期等,以确保用药安全;“是药三分毒”,药物一般都有一定的毒副作用,乱吃、多吃会危害人体健康,用药要针对不同的病情,适当选用。

20.B　近视眼可以通过戴凹透镜矫正。药品分处方药和非处方药,非处方药简称OTC。吸烟不仅能诱发多种呼吸系统疾病,还有可能诱发肺癌,更为严重的是,吸烟者还严重危害他人健康。艾滋病的传播途径有三个:性传播、血液传播、母婴传播;与艾滋病病毒感染者或艾滋病病人进行一般的生活和工作接触不会感染艾滋病。

21.D　图中A妇女体内的抗体在2月份增加,B妇女体内的抗体在2月份没增加,所以妇女A在1月份接种了疫苗,妇女B没有;A、B两妇女均在5月份产生了抗体,可能是在4月份都感染了人乳头瘤状病毒;一种抗体只能抵抗一种抗原,人乳头瘤状病毒疫苗刺激机体产生了相应的抗体;一种抗体只能抵抗一种抗原,为特异性免疫。

22.C

23.A　抗体是指病原体侵入人体后刺激淋巴细胞产生的一种抵抗该病原体的特殊蛋白质,可与相应抗原发生特异性结合,每种抗体在体内存留的时间不同,因此,患者康复后体内不一定存在相应抗体;皮肤大面积烧伤的病人,容易被病原体感染,是因为失去了皮肤对病菌的阻挡作用,使人体的非特异性免疫能力降低;接种疫苗可以使人体产生相应的抗体,从而提高对特定传染病的抵抗力,接种卡介苗可以有效预防肺结核;保持健康的心态,使大脑的兴奋和抑制保持平衡,有助于神经系统的发育。

24.A

25.B　克隆是一种无性生殖;克隆动物的遗传信息主要来自提供细胞核的亲本;通过转基因技术使生物产生的变异是可遗传的变异;异体器官移植会排斥的原因是人体的特异性免疫。

26.(1)②⑤

(2)形成层

(3)肺

(4)完全变态发育　清理生活环境,不给蚊子生存空间(或种植驱蚊植物:薄荷、迷迭香、夜来香、薰衣草、猪笼草等)

27.(1)Dd、Dd　DD或Dd

(2)15、16　X、Y　卵巢　输卵管

(3)25%　可遗传

28.(1)切断传播途径

(2)非特异性免疫

(3)控制传染源

(4)营养成分,是否含有添加剂,生产日期,保质期,生产厂家和厂家地址等内容

(5)有机物　120　胸外心脏按压　呼吸道　人工呼吸

(1)传染病若能流行起来必须同时具备传染源、传播途径、易感人群三个环节,预防传染病的措施有控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。资料一中属于预防传染病措施中的切断传播途径。(2)“笑一笑,十年少。”良好的心态,积极健康的生活方式,可以增强体质,更有效地阻挡外界病原体入侵,这是人生来就有的免疫,属于非特异性免疫。(3)急性甲型肝炎患者属于传染源,因此对急性甲型肝炎患者进行隔离治疗属于控制传染源。(4)食品安全问题,关乎公民的生命安全和身体健康。同学们在购买袋装食品时,应当关注食品包装袋上的以下内容:营养成分,是否含有添加剂,生产日期,保质期,生产厂家和厂家地址等内容。(5)游泳时骨骼肌的收缩产生动力,产生动力要消耗能量,能量来自肌细胞内有机物的氧化分解。当游泳时,遇到有人溺水,救起时,发现他已经无呼吸和心跳,应立即拨打急救电话120,在急救车到达之前,先进行胸外心脏按压,如果口腔内有泥土、血块等,必须先清除干净,使病人保持呼吸道的畅通,然后再进行人工呼吸。

29.(1)男性　白　DNA　基因

(2)保留

(3)A

(4)生男生女机会均等


30.(1)①不能　②Aa

(2)反射弧

(3)②黑暗　③照光　绿光

(1)①金鱼身体的透明与有杂斑是一对相对性状,受一对基因控制(用 A、a 表示)。根据图无法判断透明与有杂斑的显隐关系。

②杂斑鱼雌雄个体进行交配,后代出现了透明鱼,说明杂斑鱼是显性性状,透明鱼(aa)是隐性性状。亲代杂斑鱼的基因是 Aa。遗传图解如图:



(2)反射的结构基础是反射弧。

(3)据柱状图可见:两种不同波长的光都能使金鱼建立起复杂摄食反射,其中绿光使金鱼建立复杂摄食反射的时间更短。

八年级生物下册期末考试卷含答案

一、单选题(共 20 题；共 20 分)

1.（1 分）下列几种变异中，能够遗传下去的是（　　）

A．单眼皮经手术变成的双眼皮

B．水渠旁生长的车前草叶片肥大

C．近亲结婚导致的血友病

D．高档写字楼中工作的白领肌肤白嫩

2.（1 分）与空气相比较，原始大气没有的气体成分是（　　）

A．氢气　　B．甲烷　　C．氧气　　D．二氧化碳

3.（1 分）同学们，你们青春年少，要珍惜美好时光，对下列行为应说不正确的是（　　）

①品香烟　②尝毒品　③上网吧　④学艺术　⑤常健身　⑥听音乐.

A．①②③　　B．③⑤⑥　　C．③④⑤　　D．②③④

4.（1 分）在生产实践中，人们经常用植物的无性生殖来栽培农作物和园林植物，例如草莓、甘薯、菊花、月季等，这些植物常用的栽培方法是（　　）

A．扦插　　B．嫁接　　C．压条　　D．组织培养

5．（1 分）如图所示，同一株水毛茛，漂浮在水面的叶呈扁平状，淹没在水中的叶呈丝状，下述对该现象解释正确的是（　　）



A．该生物的性状不是基因作用的结果

B．该生物的性状仅是环境作用的结果

C．该生物性状仅是基因作用的结果

D．该生物性状是基因和环境共同作用的结果

6．（1 分）下列做法中，符合安全用药的是（　　）

A．生病前后，到药店随便买些药服用

B．服用后，病情不好转就加倍服药

C．一不舒服，就立刻使用抗生素

D．服药前，仔细阅读药品使用说明书

7．（1 分）下列有关生物进传和变异的叙述中，正确的是（　　）

A．雌雄蚕蛾交尾后形成的受精卵是基因在亲子间传递的“桥梁

B．玉米体细胞中染色体是 10 对，其生殖细胞中染色体数是 5 对

C．正常男性产生的某个正常生殖细胞中可能含有 Y 染色体

D．堂兄妹或表兄妹婚配产生的后代一定会患遗传病，所以禁止近亲结婚

8．（1 分）在 XY 型的性别决定中，决定后代性别的时期是（　　）

A．胎儿发育时　　B．胎儿出生时

C．受精作用发生时　　D．受精卵分裂过程中

9．（1 分）生物的亲代性状传递给子代是通过　（）

A．细胞核实现的　　B．生殖细胞的结合实现的

C．细胞膜的活动实现的　　D．细胞质的传递实现的

10．（1 分）下列有关急救的措施中，不正确的是（　　）

A．遇到煤气中毒者，先把患者移到通风良好、空气新鲜的地方，再进行人工呼吸

B．对溺水者进行人工呼吸时，要先清除呼吸道内的异物

C．心肺复苏时，先做 30 次心脏按压，并保持气道畅通，再做 4 次人工呼吸，如此交替反复进行

D．胸外心脏按压应按压患者的胸骨下端约 1/3 处，使其下陷至少 5 厘米

11．（1 分）下列属于特异性免疫的是（　　）

A．皮肤能阻挡大多数病原体侵入人体

B．泪液、唾液有杀菌作用

C．接种天花疫苗后不再患天花

D．呼吸道黏膜上的纤毛有清扫异物作用

12．（1 分）下列现代生物科技成果属于无性繁殖的是（　　）

①通过组织培养繁殖花卉

②克隆羊“多莉”的产生

③西瓜的培育

④通过嫁接繁殖优质苹果

⑤培育“试管婴儿”

A．①②⑤　　B．①②③　　C．①②④⑤　　D．①②④

13．（1 分）关于生命的起源与进化，下列说法不确切的是：（　　）

A．地球上的生命起源于非生命物质已经完全得到了实验证实

B．米勒实验说明原始地球条件下无机物形成有机物是可能的

C．具有同源器官的生物祖先可能相同，环境的变化导致了差异

D．生物化石为生物的进化学说提供了最直接、最有力的证据

14．（1 分）下列关于生物进化的叙述，正确的是（）

A．分类单位越大，生物间的共同特征越多，亲缘关系越近

B．雷鸟随季节不断改变体色，是其为主动适应环境而进化的结果

C．黑猩猩与人的基因相似度达 96％以上，说明人类由黑猩猩进化而来

D．对化石的纵向比较和现存生物的横向比较，能推断生物进化的大致历程

15．（1 分）下列生殖方式中，属于有性生殖的是（　　）

A．水稻杂交　　B．水螅的出芽生殖

C．克隆羊多莉的培育　　D．马铃薯用块茎生殖

16.（1 分）硝酸甘油是治疗心绞痛的急救药物，一般舌下含服用药。下列说法正确的是（　　）



A．药物主要被舌下的动脉血管吸收

B．药物通过血液循环最先到达心脏的右心房

C．该药没有“OTC”标识，属于非处方药

D．用药量可根据病情自行随意增减

17.（1 分）调查显示，吸毒人群中艾滋病的发病率明显高于普通人群，造成这种现象的主要原因是（　　）


A．吸毒人群经常共用餐具

B．吸毒人群经常共用注射针头

C．吸毒人群经常有身体上的接触

D．吸毒人群经常在同一房间内吸食毒品

18.（1 分）如图为鸟卵的结构图，其中将来可以发育成雏鸟的是（　　）



A．①　　B．②　　C．③　　D．⑤

19.（1 分）“穿花蛱蝶深深见，青草池塘处处蛙”，诗里描述的蛱蝶和青蛙在生殖和发育方面的相似之处是（　　）

A．有性生殖，完全变态发育　　B．无性生殖，变态发育

C．无性生殖，完全变态发育　　D．有性生殖，变态发育

20.（1 分）如图是昆虫两种发育过程中各时期的示意图，图中①

为卵期，下列说法不正确的是（　　）



A．“破茧成蝶”中的“茧”是指图中的③

B．属于①→②→④发育过程的为蝗虫、菜粉蝶

C．消灭蝗虫的最佳时期为②


D．两种发育过程的昆虫都是体内受精、变态发育

二、读图理解题(共 5 题；共 31 分)

21．（3 分）已知豌豆花的位置有腋生和顶生（如图所示），不同豌豆杂交结果如表。

杂交组合	亲代	子代花的位置及数量	
		腋生	顶生
一	甲（腋生）×丁（顶生）	36	38
二	乙（腋生）×丁（顶生）	73	0
三	丙（腋生）×乙（腋生）	68	0

据表回答：



（1）（1 分）豌豆花位置的腋生和顶生在遗传学上称为一对_____，它们由 DNA 上的_____控制。


（2）（0.5 分）杂交组合_____可以推测豌豆花位置性状的显隐性。

（3）（1.5 分）为测定丙的基因组成（假设控制豌豆花位置的显性基因用 A 表示、隐性基因用 a 表示），可选取丙与丁杂交：

①若子代性状全部为腋生，则说明丙的基因组成为_____；

②若子代性状出现_____，则说明丙的基因组成为_____。

22．（10 分）如图表示某些生物的生殖和发育过程。据图回答下列问题：




（1）（1 分）若图中生物体代表人，产生生殖细胞 A 的器官是_____。女性进入青春期后，会出现子宫出血的现象，称为_____。

（2）（2 分）若图中生物体代表人，生殖细胞 B 含有的性染色体是_____，受精卵中的染色体数目为_____条；若生殖细胞 A 中含有的性染色体是 Y，那么这个受精卵将来会发育成_____（填“男孩”或“女孩”）。

（3）（5 分）若图中生物体代表蝴蝶，过程①表示_____作用；过程②需要经历_____、幼虫、_____和_____四个阶段，这种发育属于_____。

（4）（2 分）若图中生物体代表大豆，受精卵形成后，会发育成种子中的_____。图示生物的生殖方式为_____（填“有性生殖”或“无性生殖”）。

23.（6 分）下图是植物两种不同的生殖方式。请据图分析并回答下列相关问题：



（1）（3 分）图①所示植物嫁接的方法是_____（选填：芽接、枝接），操作时要将 a、b 两部分的_____紧贴在一起。如果 a 部分的基因组成是 DD，b 部分的基因组成是 dd，则成活后所结果实果皮的基因组成是_____。

（2）（3 分）图②所示为番茄有性生殖的过程，c 所处的结构是由花粉萌发而来的_____。已知番茄果皮的红色（ R ）对黄色（ r ）为显性，如果将红色番茄（ Rr ）的花粉授到黄色番茄的柱头上，则黄色番茄上所结果实的果皮颜色是_____，种子中胚的基因组成是_____。

24.（6 分）看图填空：

（1）（3 分）下图是青蛙发育过程中某些阶段的示意图，据图回答下列问题：




A　　B　　C　　D　　E

Ⅰ.青蛙发育过程的顺序是：D→_____。青蛙的生殖和发育在水中进行，青蛙进行_____（填“体内”或“体外”）受精。

Ⅱ.蝌蚪的形态和结构与成蛙的区别很大，青蛙的发育方式为_____发育。

（2）（3 分）下图为家蚕发育过程示意图，请据图回答下列问题：



家蚕的生殖和发育过程

①有性生殖和无性生殖的根本区别是：有无两性生殖细胞的结合。家蚕的生殖属于_____生殖。

②从图中看出，家蚕的发育是_____发育。因为家蚕的发育过程经历了受精卵、_____、蛹和成虫四个时期。

25.（6 分）图是南瓜的发育过程示意图，请据图回答：



（1）（1 分）图中从[1]到[2]表示的生理过程是_____。

（2）（1 分）图中的[4]是由[2]中的_____发育来的。

（3）（1 分）在图中[5]所示的生理过程中，消耗的营养物质主要来自_____。

（4）（1 分）南瓜果实圆盘形由显性基因（D）控制，球形由隐性基因（d）控制。若图中[3]为圆盘形的南瓜，则它的基因组成可能是_____。

（5）（1 分）请你当一次农业技术员，菜农利用某种技术，在南瓜植株上收获黄瓜，这种技术叫做_____。

（6）（1 分）菜农常常对大棚内的土栽蔬菜使用有机肥，不但培育了“绿色蔬菜”，而且大棚内的 CO_2 浓度也大大增加。CO_2 浓度提高的主要原因是_____。

答案解析部分

1.【答案】C

【解析】【解答】 ABD、“单眼皮经手术变成的双眼皮”、“水渠旁生长的车前草叶片肥大”、“高档写字楼中工作的白领肌肤白嫩”，都是由环境因素引起的，遗传物质没有发生变化的变异，因此都是不能够遗传的，ABD 不符合题意；

C、“近亲结婚导致的血友病”，是由遗传物质改变引起的变异，因此该变异是能够遗传的，C 符合题意。

故答案为：C

【分析】生物性状的变异是普遍存在的.变异首先决定于遗传物质基础的不同，其次与环境也有关系.由遗传物质的改变而引起的变异是可遗传的，叫可遗传变异；单纯由环境引起的变异，如没有影响到遗传物质基础，是不遗传的，叫不遗传变异.

2.【答案】C

【解析】【解答】从火山中喷出的气体，如水蒸气、氢气、氨、甲烷等构成了原始的大气层，可见原始大气中没有氧气。

故答案为：C

【分析】化学起源学说认为：原始地球的温度很高，地面环境与现在完全不同：天空中赤日炎炎、电闪雷鸣，地面上火山喷发、熔岩横流；从火山中喷出的气体，如水蒸气、氨、甲烷、氢气等构成了原始的大气层，还有一部分硫化氢和氰化氢，与现在的大气成分明显不同的是原始大气中没有氧气；原始大气在高温、紫外线以及雷电等自然条件的长期作用下，形成了许多简单的有机物，随着地球温度的逐渐降低，原始大气中的水蒸气凝结成雨降落到地面上，这些有机物随着雨水进入湖泊和河流，最终汇集到原始的海洋中．原始的海洋就像一盆稀薄的热汤，其中所含的有机物，不断的相互作用，形成复杂的有机物，经过及其漫长的岁月，逐渐形成了原始生命．可见生命起源于原始海洋.

3.【答案】A

【解析】【解答】解：春期是一个生长和发育发生重要变化的时期，其中身高突增是青春期的一个显著特点，另外，体重增加，神经系统和心、肺等内脏器官器官的功能也显著增强，青春期是一个生长和发育发生重要变化的时期，因此在日常生活中注意青春期保健，如积极参加有意义的活动：④学艺术　⑤常健身　⑥

听音乐．同时在青春期要养成良好的生活习惯，避免一些不良嗜好，如杜绝①品香烟②尝毒品　③上网吧 造成很大的危害．

故选：A．

【分析】青春期的男孩和女孩由于生理上的变化，心理上也发生着明显的变化，生活中常常会有较多的心理矛盾，遇到一些问题要经常与家长、老师交流思想，接受 指导，不能觉着自己长大了，就不想和家长交流．同时要正确处理和异性的关系，男、女同学互相帮助，集中精力学习，积极的参加各种文体活动和社会活动，健康 的度过这人生的金色年华．

4．【答案】A

【解析】【解答】A.扦插一般是指把植物的茎进行切断，经过处理之后，插在土壤中，然后每一段枝条都可以生根发芽，长出一个新的植株。甘薯、葡萄、菊、月季等植物适合用茎进行扦插繁殖，A 符合题意。

B.嫁接是指把一个植物体的芽或枝，接在另一个植物体上，使结合在一起的两部分长成一个完整的植物体，B 不符合题意。

C.压条是将植物的枝、蔓压埋于湿润的基质中，待其生根后与母株割离，形成新植株的方法，又称压枝，C 不符合题意。

D.组织培养指的是在无菌的情况下，将植物体内的某一部分器官或组织，如茎尖、芽尖、形成层、根尖、胚芽和茎的髓组织等从植物体上分离下来，放在适宜培养基上培养，经过一段时间的生长、分化最后长成一个完整的植株，D 不符合题意。

故答案为：A。

【分析】生物的生殖方式可分为有性生殖和无性生殖两种，由亲本产生有性生殖细胞，经过两性生殖细胞（例如精子和卵细胞）的结合，成为受精卵，再由受精卵发育成为新的个体的生殖方式，叫做有性生殖；如向日葵、玉米和桃树等靠种子来繁殖后代的，为有性生殖。无性生殖指的是不经过两性生殖细胞结合，由母体直接产生新个体的生殖方式。绿色开花植物利用营养器官根、茎、叶繁殖新个体的生殖方式叫做营养生殖；营养生殖有利于保持母本的优良性状，加快繁殖的速度，营养繁殖没有出现两性生殖细胞，是无性生殖。无性生殖包括嫁接、扦插、组织培养、压条、克隆、分裂生殖、出芽生殖等等。

5．【答案】D

【解析】

【解答】解：有的生物的变异的原因不是单纯一个，可能是遗传物质和环境因素共同作用的结果．比如一个遗传肤色就比较黑的人，如果再常年在户外工作，肤色会更黑，他的特别黑的肤色就是遗传物质和环境因素共同作用的结果．所以同一株水毛茛（如图），裸露在空气中的叶和浸泡在水中的叶，表现出了两种截然不同的形态，前者呈扁平状而后者深裂呈丝状，这一现象说明生物性状的表现是基因和环境共同作用的结果．

故选：D．

【分析】生物的变异分为可遗传的变异和不遗传的变异．可遗传的变异是由于遗传物质（如染色体、基因等）发生改变引起的，不遗传的变异是环境因素造成的．但是有的生物的变异的原因不是单纯一个，可能是遗传物质和环境因素共同作用的结果．

6.【答案】D

【解析】【解答】A、生病后，要到医院就医，不能到药店随便买些药服用，A 错误。B、是药三分毒，不能随便加倍服用，用量大，毒副作用会加重，B 错误。C、抗生素只能治疗细菌性疾病，且抗生素容易产生抗药性，也有毒副作用，不能乱用，C 错误。D、服药前，要仔细阅读药品使用说明书，注意说明书上的各项内容，以安全用药，D 正确。

故答案为：D。

【分析】安全用药是指根据病情需要，正确选择药物的品种、剂量和服用时间等，以充分发挥最佳效果，尽量避免药物对人体产生的不良作用或危害。

7.【答案】C

【解析】【解答】A、在生物的体细胞中，染色体是成对存在的，基因也是成对存在的，在形成生殖细胞的过程中，成对的染色体分开，每对染色体中的一条进入精子或卵细胞中，基因也随着染色体的分离而进入不同的生殖细胞中，可见，亲代通过生殖细胞把基因传递给了子代，故在有性生殖过程中，精子与卵细胞是基因在亲子代间传递的桥梁，可见 A 说法错误，A 不符合题意。 B、在生物的体细胞中，染色体是成对存在的，基因也是成对存在的，在形成生殖细胞的过程中，成对的染色体分开，每对染色体中的一条进入精子或卵细胞中，所以，在生殖细胞中，染色体都是单条存在的，所以，玉米体细胞内，染色体是 10 对，生殖细胞中染色体应该是 5 条，B 说法错误，B 不符合题意。C、人的体细胞内的 23 对染色体，其中有 22 对染色体，一对性染色体，男性的性染色体是 XY，女性的性染色体是 XX，在生殖过程中，男性产生两种类型的精子，含有 X 染色体的和含 Y 染色体的，女性只产生一种类型的卵细胞，是含有 X 染色体的，可见，男性产生的生殖细胞含有 X 染色体或 Y 染色体，C 是法正确，C 符合题意。

D、三代以内的直系及旁系血亲等近亲结婚的话会增大隐性致病基因相遇的几率，因此会增大隐性遗传病的发病率，堂兄妹或者表兄妹婚配时所生的后代不一定会患遗传病，但是会增大遗传病的发病率，所以 D 说法错误，D 不符合题意。 故答案为：C 【分析】此题考查生物的遗传和变异等基础知识，遗传和变异是初中阶段的重点也是难点，解答此题需要熟记基础知识及各知识点间的内在联系，在亲子代间传递的是基因，而不是性状，基因控制性状，基因是传递的桥梁；在形成生殖细胞时，成对的染色体会分开，成对的基因也分开，每一对基因中的一条分别进入到不同的生殖细胞中，所以生殖细胞中染色体、基因都是呈单条存在。

8.【答案】C

【解析】【解答】解：人的性别决定于受精卵形成时，在形成生殖细胞时，男性产生的精子有两种：含有 X 染色体的和含有 Y 染色体的，女性产生的卵细胞只有一种，是含有 X 染色体的，在形成受精卵时，如果含 X 染色体的卵细胞与含 X 染色体的精子相融合，那么受精卵的性染色体就是 XX，由它发育成的孩子就是女孩，如果含 X 染色体的卵细胞与含 Y 染色体的精子相融合，那么受精卵的性染色体就是 XY，由它发育成的孩子就是男孩。

故答案为：C

【分析】 人类体细胞内染色体分为常染色体和性染色体。常染色体就是对性别决定不起直接作用，除了性染色体外的所有染色体。人类正常染色体为 46 条（23 对），其中 22 对称为常染色体，男女都一样；第 23 对称为性染色体，人的性别主要是由性染色体决定的，男性体细胞中的一对性染色体组成是 XY，女性体细胞中的一对性染色体组成是 XX。

9.【答案】B

【解析】【解答】基因控制生物的性状，性状的遗传实质上是亲代通过生殖过程把基因传递给子代。在有性生殖过程中，亲代精子和卵细胞中各自携带其一半的基因，二者结合并发育成新个体，就实现了基因在亲子代间的传递。

故答案为：B。

【分析】一般情况下，在生物的体细胞中，染色体是成对存在的，上面的基因也是成对存在的，且分别位于成对的两条染色体上。生物体在形成精子或卵细胞的细胞分裂过程中，每对染色体中各有一条进入精子或卵细胞，染色体上的基因也随之进入精子或卵细胞中。这样精子和卵细胞结合并发育成新个体是，亲代各自一半的基因也就进入子代。基因控制生物的性状。所以子代在某些方面会表现出像亲代。

10．【答案】C

【解析】【解答】A.发现有人煤气中毒时，首先关闭气阀，禁止明火。然后，立即打开门窗，将煤气中毒人员移到通风处，再拨打 120 急救电话，A 不符合题意。

B.当遇到某人因溺水导致呼吸和心跳停止时，一定要尽快②拨打 120 急救电话，在急救车到达前，根据病情和伤情，采取一些必要的救治措施，做人工呼吸时，使病人仰卧平躺，头向后仰，有利于气体进入；将病人的衣领解开，腰带放松有利于呼吸道畅通和胸部的扩张；如果口腔内有泥土、血块等异物和污物，必须先清除干净，使病人保持呼吸道的畅通。然后再进行口对口的吹气，B 不符合题意。

C.进行心肺复苏，首先胸外按压部位在两乳头连线中点，胸骨中下 1/3 交界处，用手掌根部紧贴病人胸部，两手重叠，五指相扣，手指翘起，肘关节伸直，用上身重量垂直下压 30 次。然后开放气道，清理口鼻分泌物，进行人工通气。按压与人工通气比例为 30：2，持续进行 5 个周期，约 2 分钟，C 符合题意。

D.胸外心脏按压术：按压部位在胸骨中、下 1/3 交界处，以一手掌根部放在按压部位，将另一手的掌根重叠放于其手背上，两手手指交叉抬起，使手指脱离胸壁。抢救者双臂绷直，双肩在患者胸骨上方正中，利用上身重量垂直下压使胸骨下陷 4-5 厘米，然后立即放松按压，使胸骨自行复位，但手掌根部不要抬离胸壁以免移位。按压应平稳、有规律地进行，不能间断，不能冲击式的猛压，D 不符合题意。

故答案为：C。

【分析】当人出现意外事故时，我们首先应拨打“120”急救电话，同时正确的实施一定的急救措施。急救方法有：拨打“120”急救电话、人工呼吸等急救常识。

11．【答案】C

【解析】【解答】人体三道防线，第一道防线是皮肤、黏膜及分泌物（唾液、胃液），阻挡杀死病原体，清除异物，属于非特异性免疫，第二道防线是体液中的杀菌物质和吞噬细胞，溶解、吞噬和消灭病菌，属于非特异性免疫，第三道防线是免疫器官和免疫细胞，产生抗体，消灭病原体，属于特异性免疫。接种天花疫苗后不再患天花，属于特异性免疫，是出生后才有的，只能对特定的病原体有防御作用。

故答案为：C。

【分析】人体的三道防线：

防线	构成	功能	类别

第一道	皮肤和黏膜	阻止或杀死病菌，消除异物	非特异性免疫
第二道	杀菌物质和吞噬细胞	吞噬、溶解病菌	
第三道	免疫器官和免疫细胞	产生抗体、消灭病原体	特异性免疫

12.【答案】D

【解析】【解答】①组织培养，组织培养指的是在无菌的情况下，将植物体内的某一部分器官或组织，如茎尖、芽尖、形成层、根尖、胚芽和茎的髓组织等从植物体上分离下来，放在适宜培养基上培养，经过一段时间的生长、分化最后长成一个完整的植株。通过组织培养繁殖花卉，没有经过两性生殖细胞的结合，因此属于无性繁殖。

②克隆技术即无性繁殖技术，因为它不需要雌雄交配，不需要精子和卵子的结合，只需从动物身上提取一个单细胞，用人工的方法将其培养成胚胎，再将胚胎植入雌性动物体内，就可孕育出新的个体，克隆羊“多莉”的产生属于无性生殖；

④嫁接是指把一个植物体的芽或枝，接在另一个植物体上，使结合在一起的两部分长成一个完整的植物体，通过嫁接繁殖优质苹果，没有经过两性生殖细胞的结合属于无性生殖，

③西瓜的培育和⑤培育“试管婴儿”经过了两性生殖细胞的结合，属于有性生殖。

【分析】1、无性生殖： 是一类不经过两性生殖细胞的结合，由母体直接产生新个体的生殖方式。可以分为分裂生殖（细菌及原生生物）、出芽生殖（酵母菌、水螅等）、孢子生殖（蕨类等）、营养生殖（草莓匍匐茎等），具有缩短植物生长周期，保留母本优良性状的作用。组织培养及克隆技术都属于无性生殖。

2、有性生殖是指由亲本产生的有性生殖细胞（配子），经过两性生殖细胞（例如精子和卵细胞）的结合，成为受精卵，再由受精卵发育成为新的个体的生殖方式，叫做有性生殖。

13.【答案】A

【解析】【解答】A、米勒的实验试图向人们证实，生命起源的第一步，即从无机小分子物质形成有机小分子物质，在原始地球的条件下是完全可能实现的。但地球上的生命起源于非生命物质还没有得到准确的实验证实，A 符合题意；

B、米勒通过实验验证了化学起源学说的第一阶段：在原始地球大气中，无机物可以形成有机物，B 不符合题意。

C、同源器官在外形上有时并不相似，功能上也有差别。是因为这些动物在不同的环境中生活，向着不同的方向进化发展，适应于不同的环境和功能，因而产生了表面形态上的分歧，C 不符合题意。

D、在研究生物的进化的过程中，化石是重要的证据，越古老的地层中，形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多。越晚近的地层中，形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多，因此地层中不同地质年代的化石揭示了生物进化的顺序，D 不符合题意。

故答案为：A

【分析】原始地球的温度很高，地面环境与现在完全不同：天空中赤日炎炎、电闪雷鸣，地面上火山喷发、熔岩横流；从火山中喷出的气体，如水蒸气、氨、甲烷、氢气等构成了原始的大气层，还有一部分硫化氢和氰化氢，与现在的大气成分明显不同的是原始大气中没有氧气；原始大气在高温、紫外线以及雷电等自然条件的长期作用下，形成了许多简单的有机物，随着地球温度的逐渐降低，原始大气中的水蒸气凝结成雨降落到地面上，这些有机物随着雨水进入湖泊和河流，最终汇集到原始的海洋中．原始的海洋就像一盆稀薄的热汤，其中所含的有机物，不断的相互作用，形成复杂的有机物，经过及其漫长的岁月，逐渐形成了原始生命．可见生命起源于原始海洋．米勒通过实验验证了化学起源学说的第一阶段．即从无机小分子物质形成有机小分子物质，在原始地球的条件下是完全可能实现的．

生物进化的证据包括：化石证据；解剖学证据和生物分子学证据．

14．【答案】D

【解析】【解答】解：A.分类单位越小，生物间的共同特征越多，亲缘关系越近，故 A 不符合题意；

B.雷鸟随季节不断改变体色，是对环境的一种适应，也是防止被敌害发现，同时便于捕食猎物，是对自身的一种保护，故 B 不符合题意；

C.黑猩猩与人的基因相似度达 96%以上，说明人类和黑猩猩的亲缘关系较近，故 C 不符合题意；

D.对化石的纵向比较和现存生物的横向比较，能推断生物进化的大致历程，故 D 符合题意。

故答案为：D

【分析】1、生物学家根据生物之间的相似程度，把它们划分为界、门、纲、目、科、属、种不同的等级。界是最大的分类单位，种是最基本的分类单位。生物分类等级由小到大所包含的生物种类和数量逐渐增多，亲缘关系越来越远，共同特征越来越少。

2、化石是保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹。化石是研究生物进化最重要的、最直接的证据。科学家比较各个地层的化石后发现，在越古老的地层里，成为化石的生物结构越简单、越低等；在越新的地层里，成为化石的生物结构越复杂、高等。

15．【答案】A

【解析】【解答】BCD、水螅的出芽生殖、克隆羊多莉的培育、马铃薯用块茎生殖都没有经过两性生殖细胞的结合，因此都属于无性生殖，不符合题意；

A、水稻杂交是由受精卵发育形成的，经过两性生殖细胞结合，属于有性生殖，符合题意。

故答案为：A。

【分析】生物的生殖方式可分为有性生殖和无性生殖两种，由亲本产生有性生殖细胞，经过两性生殖细胞（例如精子和卵细胞）的结合，成为受精卵，再由受精卵发育成为新的个体的生殖方式，叫做有性生殖；如向日葵、玉米和桃树等靠种子来繁殖后代的，为有性生殖．无性生殖指的是不经过两性生殖细胞结合，由母体直接产生新个体的生殖方式．绿色开花植物利用营养器官根、茎、叶繁殖新个体的生殖方式叫做营养生殖；营养生殖有利于保持母本的优良性状，加快繁殖的速度，营养繁殖没有出现两性生殖细胞，是无性生殖．无性生殖包括嫁接、扦插、组织培养、压条、克隆、分裂生殖、出芽生殖等等。

16．【答案】B

【解析】【解答】A.由于毛细血管具有数量多，分布广，管腔最细、管径最小，管壁最薄，血流速度最慢的特点，故药物主要被舌下的毛细血管吸收，A 不符合题意。

B.因为体循环的循环途径为：左心室→主动脉→各级动脉→组织处毛细血管(舌下毛细血管网)→各级静脉→上、下腔静脉→右心房，故药物通过血液循环最先到达心脏的右心房，B 符合题意。

C.该药没有“OTC”标识，属于处方药，凭医师的处方购买，按医嘱服用，C 不符合题意。

D.处方药，需凭医师的处方购买，按医嘱服用，不可自行随意增减，D 不符合题意。

故答案为：B

【分析】安全用药是指根据病情需要，正确选择药物的品种、剂量和服用时间等，以充

分发挥最佳效果，尽量避免药物对人体产生的不良作用或危害。

17.【答案】B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/938104024041006113