

10-社区常见健康问题的诊断与处理试题

《社区常见健康问题的诊断与处理》试题

常见症状与体征(16 题)

A1 型题

1、某患者发热 7 天，每天体温高达 $39.7^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ，最低体温为 37.7°C ，该患者热型为（C）

- A、波状热
- B、不规则热
- C、弛张热
- D、稽留热
- E、间隙热

2、一发热病人，近 5 天来体温维持在 $39^{\circ}\text{C}\sim 41^{\circ}\text{C}$ ，24 小时内体温波动相差不超过 1°C 。查体：腹部玫瑰疹，肝脾肿大。

该病人最可能的诊断是（C）

- A、败血症
- B、肾综合征出血热
- C、伤寒
- D、疟疾
- E、风湿热

3、女性，51 岁，近 2 天来出现右上腹持续性疼痛，阵发性加剧，并向右腰背放射，高热，皮肤及巩膜黄染，大便发白，小便黄。可能的诊断是（D）

- A、消化性溃疡穿孔
- B、急性黄疸性肝炎
- C、急性胰腺炎
- D、急性胆囊炎，胆结石
- E、肝破裂

4、女，47 岁，因精神障碍服用氯丙嗪，近日出现全身黄染，尿色深黄，伴瘙痒，考虑为（D）

- A、肝细胞性黄疸
- B、中毒性肝炎
- C、肝外阻塞性黄疸

- D、肝内胆汁淤积
- E、自身免疫性溶血性黄疸

5、男，3 岁，在独自游戏时突然出现呼吸困难，吸气时胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙明显凹陷，其病因最可能是(D)

- A、大叶性肺炎
- B、自发性气胸
- C、左心衰竭
- D、气管异物
- E、右心衰竭

6、男，40 岁，高血压多年，近日活动后出现呼吸困难伴左胸痛，体检见患者端坐呼吸，咳嗽频繁，咯出粉红色泡沫痰，双肺布满水泡音，下述处理措施中，哪项不正确？(D)

- A、积极治疗原发病
- B、吸氧
- C、保持呼吸道通畅
- D、用强效镇咳药
- E、纠正水、电解质、酸碱失衡

7、男，64 岁，上腹痛 2 月伴消瘦，呕吐后减轻，诊断考虑为(C)

- A、十二指肠球部溃疡
- B、胃癌
- C、幽门梗阻
- D、横结肠癌
- E、反流性食管炎

8、男性，25 岁，2 年反复发作上腹痛史伴反酸.突然右上腹痛，不伴吐泻。上腹有肌紧张及反跳痛，右下腹亦有压痛。未及包块，肠鸣音减弱。对该病人的处理不正确的是(B)

- A、解痉、止痛
- B、做上消化道造影帮助诊断
- C、紧急外科手术治疗或急症转院治疗
- D、详细询问病史、全面体检

E、针对原发病治疗

9、男，59岁，在早上匆匆上班的途中突感心前区疼痛，呼吸困难，伴窒息感，深吸气不加重疼痛。最可能的病因是(B)

A、肺炎

B、心绞痛

C、心包积液

D、胸膜炎

E、自发性气胸

10、24岁，男性，因便血、腹部包块1周来院，下列疾病哪项可能性较小?(E)

A、肠结核

B、肠癌

C、溃疡性结肠炎

D、克隆病

E、肠套叠

11、意识障碍伴瞳孔缩小见于(E)

A、氰化物中毒

B、低血糖

C、酒精性肝硬化

D、癫痫发作

E、有机磷中毒

12、意识障碍伴瞳孔散大见于(B)

A、吗啡中毒

B、巴比妥类药物中毒

C、有机磷农药中毒

D、酒精中毒

E、青光眼

13、50岁男性，患乙型肝炎已10年，晨起突然呕血1000ml，遂来院就诊。采集病史时，应特别注意询问(A)

A、呕血的颜色，有无周围循环衰竭的确切表现及伴随症状

- B、饮酒史
- C、抽烟史
- D、服药史
- E、近期胃镜或胃肠钡餐透视情况

14、确诊上述病人最有价值的检查是 (B)

- A、X 线食管钡透
- B、B 超
- C、胃镜
- D、血常规
- E、肝功能检查

15、男，32，上腹部周期性节律性疼痛 2 周，今晨突然呕吐咖啡色液 2 次，解黑便 1 次，自觉头昏，乏力，出汗，心慌，脉率 96 次/分，该患者出血量估计为 (C)

- A、< 200ml
- B、< 400ml
- C、< 1000ml
- D、< 1500ml
- E、< 2000ml

16、胸膜炎的症状为 (E)

- A、咳嗽、咳粉红色泡沫痰
- B、咳嗽、咳脓痰
- C、无痰、干咳
- D、晨咳为重
- E、咳嗽胸痛加剧

内科(48 题)

A1 型题

1.治疗中、重度支气管哮喘发作的首选药物是 (A)

- A.糖皮质激素
- B.抗过敏类
- C.茶碱类

D.β 受体激动剂

E.钙拮抗剂

2.慢性肺心病急性加重期的治疗措施中最重要的的是 (D)

A.应用强心剂

B.控制心律失常

C.应用利尿剂

D.控制肺部感染

E.应用血管扩张剂

3.慢性肺心病心力衰竭时，使用强心剂的情况是 (A)

A.感染已控制，利尿剂无效

B.心率大于 120 次/分

C.明显气急紫绀

D.两肺底湿性啰音

E.肺动脉高压

4.肺炎球菌肺炎的治疗，以下不正确的是 (E)

A.卧床休息、适当支持疗法

B.首选青霉素

C.霉素过敏者选用红霉素

D.抗菌药物疗程一般为 5～7 天

E.X 线胸片示阴影消散后停用抗生素

5.金黄色葡萄球菌肺炎的治疗应首选 (B)

A.青霉素

B.耐青霉素酶的 β-内酰胺类抗生素

C.半合成青霉素

D.氨基糖苷类青霉素

E.大环内酯类抗生素

6.下列哪项不属于左心功能不全的症状(体征) (C)

A.呼吸困难

B.咳嗽、咳痰

C.周围性紫绀

D.第一心音减弱

E.两肺底部湿啰音

7.不宜使用洋地黄的心力衰竭是 (D)

A.风湿性心脏病伴心力衰竭

B.高血压性心脏病伴心力衰竭

C.扩张型心肌病伴心力衰竭

D.急性心肌梗死 24 小时内伴心力衰竭

E.陈旧性心肌梗死伴心力衰竭

8.急性心衰时不能减少回心血量的是 (E)

A.坐位、双腿下垂

B.注射吗啡

C.应用血管扩张剂

D.结扎四肢

E.注射强心剂

9.成人高血压的诊断标准是 (A)

A.Bp $\geq$ 140/90mmHg

B.Bp $\geq$ 150/90mmHg

C.Bp $\geq$ 160/90mmHg

D.Bp $\geq$ 160/95mmHg

E.Bp $\geq$ 165/95mmHg

10.高血压联合用药的原则应是 (A)

A.当第一种药物效果不满意时，可加用第二种药

B.第 1 ~ 3 天用第一种药，第 4 天应加用第二种药

C.同类药物的两种药物合用可以增效

D.为了有效，不论何种高血压，首先考虑两种药合用

E.首先用两种不同类药物，如无效需加用第三种药物

11.典型心绞痛发作错误的是 (B)

A.体力活动是常见诱因

B.部位在胸骨中上段，界限清楚

C.疼痛可放射至左肩

D.为压榨性疼痛

E.通常持续 3 ~ 5 分钟

12.急性心梗时不能转院的情况是 (B)

A.疼痛缓解

B.发病在 4 小时以内

C.心律失常已控制

D.血压正常

E.心功能尚好

13.心肌梗死时的止痛药首选 (A)

A.吗啡

B.哌替啶

C.阿托品

D.强痛定

E.地西洋

14.下列哪项不符合急性胃炎的治疗原则 (E)

A.停止服用非甾体类消炎药

B.止血并补充血容量

C.阿托品缓解腹痛

D.应用制酸剂和硫糖铝

E.对病程持续数年反复发作者行全胃切除

15.男性，55 岁，反复不规则胃胀痛 3 年，曾诊断为萎缩性胃炎，临床疑有胃炎引起的上消化道出血，为确诊，合适的诊断方法是

A、急诊胃镜检查

B、剖腹探查

C、急诊透视

D、便隐血试验

E、吞线试验

16.消化性溃疡确诊的最主要依据是 (B)

A.典型的疼痛发作

B.X 线钡餐发现胃十二指肠腔外龛影

- C.幽门螺杆菌检测阳性
- D.胃液分析示基础酸与最大酸增
- E.上腹部可有固定而局限的压痛点

17.消化性溃疡的治疗目的不包括 (E)

- A.缓解临床症状
- B.促进溃疡愈合
- C.避免并发症
- D.防止复发
- E.必要时手术根治

18.关于慢性肾炎常见的共同表现描述，以下不正确的是 (C)

- A.水肿为多数患者首先症状
- B.高血压多呈持续性升高
- C.白尿不是必有表现
- D.血尿常为镜下血尿，管型常为颗粒管型
- E.肾功能损害呈逐渐加重

19.慢性肾炎治疗的主要目的是 (B)

- A.控制高血压
- B.防止和延缓肾功能进行性减退
- C.消除血尿
- D.纠正贫血
- E.改善全身症状

20.尿细菌培养阳性者菌落计数超过 (C)

- A.≥10³ 个/ml
- B.≥10⁴ 个/ml
- C.≥10⁵ 个/ml
- D.≥10⁶ 个/ml
- E.≥10⁷ 个/ml

21.较严重的急性肾盂肾炎，抗菌药物用至退热 72 小时后，可改用口服有效抗生素继续用 (B)

- A.1 周

B.2 周

C.3 周

D.4 周

E.5 周

22.处理复发性肾盂肾炎最主要的是 (B)

A.联合应用抗菌药

B.寻找并去除梗阻等诱因

C.提高机体抗病能力

D.中西医结合治疗

E.尿培养细菌药敏试验

23.口服降糖药应用正确的是 (E)

A.均适用于中年 2 型糖尿病较重者

B.有胰岛抵抗者可用双胍类

C.也可用于 1 型糖尿病

D.适用于酮症酸中毒的辅助治疗

E.双胍类尤适用于饮食控制失败的肥胖者

24.1 型和 2 型糖尿病鉴别时下列临床特征以哪项为主 (C)

A.年轻与年老

B.消瘦与肥胖

C.有无自发性酮症倾向

D.有无明显“三多一少”症状

E.并发症的多少与严重程度

25.重症脑出血，首选的治疗原则是 (B)

A.立即使血压降至正常

B.应用脱水剂控制颅内压

C.抗生素预防感染

D.维持水、电解质平衡

E.防止并发症

26.动脉硬化引起脑血栓治疗不正确的是 (D)

A.静滴低分子右旋糖酐

- B.早期尿激酶溶栓
- C.应用活血化瘀中药
- D.迅速将血压降至正常
- E.颅压增高时可应用甘露醇

27.脑栓塞的防治最重要的是 (D)

- A.降低颅内压
- B.溶栓治疗
- C.抗菌治疗
- D.病因治疗
- E.扩张脑血管

28.有关功能性消化不良下列哪项描述不正确？(E)

- A、多见于年轻女性
- B、有消化不良的症状
- C、X线或胃镜检查未见溃疡和胃炎、胃黏膜完全正常
- D、检查未发现肝胆疾病
- E、主要依据临床表现与消化性溃疡相鉴别

29.妊娠 6 个月合并甲状腺功能亢进，下列何项治疗比较合适？

(D)

- A、抗甲状腺药物加甲状腺片
- B、放射性核素治疗
- C、大剂量硫脲类药物
- D、手术治疗
- E、抗甲状腺药物剂量宜偏小

A2 型题

30.男性，20岁，既往有支气管哮喘史。突然发生呼吸困难，烦躁不安，大汗，持续 5 小时，静滴氨茶碱不能缓解来诊。查体：BP：120/80mmHg，心率 130 次/分。双肺布满哮鸣音。紧急处理应选择：

(D)

- A、大剂量青霉素静脉滴注
- B、吗啡皮下注射

- C、静推呋塞米
- D、静滴甲基泼尼松
- E、静推毛花甙丙

31、女性，62岁，哮喘反复发作30年，此次因受凉再发，服氨茶碱及非那更无效，哮喘已持续20小时，现在最宜加用的药物是(B)

- A、氨茶碱静脉注射
- B.地塞米松静脉滴注
- C.肾上腺素
- D.舒喘灵
- E.心痛定

32、男性，60岁，慢性肺阻病15年，近一周咳喘加重，紫绀明显，烦躁，

血气分析：pH7.40、PaO

25.3kPa(40mmHg)、PaCO

2

9.3kPa (70mmHg)，进行

氧疗应采用(B)

- A、间断低流量吸氧
- B.持续低流量吸氧
- C、间断高浓度高流量吸氧
- D.立即纯氧吸入
- E、持续高浓度高流量吸氧

33、男性，30岁，2天前受凉后突然寒战、高热(40℃)、胸痛、咳铁锈色痰，胸片示右下肺大片密度均匀的实变影，本患者最可能的诊断是(D)

- A、支原体肺炎
- B.克雷白杆菌肺炎
- C.金黄色葡萄球菌肺炎
- D.肺炎球菌肺炎
- E.绿脓杆菌肺炎

34、女性，60岁，慢性肺心病顽固性心力衰竭，经综合治疗及强心利尿效果不佳，应进一步采取的措施是(A)

- A 应用血管扩张剂
- B.人工呼吸机
- C.加大强心、利尿药剂量
- D.高压氧治疗
- E.给予激素

35、男性，患“高血压病”3年。血压160/100mmHg，X线示左室扩大，心电图左室肥厚，眼底动脉硬化并少量出血。此时应诊为

(B)

A 高血压病 1 级 B. 高血压病 2 级 C. 高血压病 3 级

D.高血压脑病

E.高血压危象

36、男，68 岁，高血压病 30 年，肾功能不全 3 年，现少尿，浮肿，血钾为 5.6mmol/L，哪类降压药物不能应用（E）

A 利尿剂 B.α₁-受体阻滞剂 C.β-受体阻滞剂

D.钙离子拮抗剂

E.ACEI

37、男性，50 岁，上山途中突然出现胸痛，呈压榨性，较剧烈，伴大汗，面色苍白，休息后可缓解，但反复发作。此时最有效的治疗方法是 (D) A 停止活动 B.休息 C.平卧位 D.含化硝酸甘油

E.含化阿斯匹林

38、男性，40 岁，上腹部不适、隐痛 2 年余，以进食后症状明显，并有腹胀、呃逆。查体上腹部轻压痛，胃镜检查示胃粘膜呈灰白色为主，粘膜下血管可见，诊断应该是 (B)

A.慢性浅表性胃炎

B.慢性萎缩性胃

C.胃溃疡

D.胃癌

E.胃神经官能症

39、男性，25 岁，常感上腹疼痛，伴反酸，以空腹痛、夜间痛为主，作纤维胃镜检查，发现十二指肠球部约 0.5cm×0.3cm 溃疡，边缘水肿充血，底覆白色苔。活检尿素酶试验示幽门螺杆菌阳性。治疗方案最合适的是（E）

A.立即手术治疗

B.胃舒平、胃蛋白酶合剂

C.甲氰咪呱、庆大霉素口服

D.硫糖铝、痢特灵、黄连素口服

E.洛赛克、阿莫西林、甲硝唑口服

40、男性，25 岁，3 天前体检偶然发现血压 150/90mmHg，尿蛋白（++），红细胞 0~1 个/Hp，查眼底正常。拟诊应考虑 (A)

- A.慢性肾炎
- B.高血压病肾损害
- C.隐匿性肾小球疾病
- D.慢性肾盂肾炎
- E.急进性肾炎

41、男，18 岁，被诊断为 1 型糖尿病 6 年，明显消瘦，为其制定饮食治疗原则，何为错误的 (E)

- A、是该病人治疗的基础
- B、可以使胰岛得到“休养生息”的机会
- C、应使其体重上升或接近理想体重
- D、以摄不饱和脂肪酸为宜
- E、脂肪应占总热量 15%以下

42、男性，21 岁，患糖尿病 7 年。长期注射胰岛素。2 天前出现腹痛、腹泻、心悸、乏力、明显消瘦。血糖 18 到病除 mmol/L，尿糖++++，尿酮体++++，血钾 3.4mmol/L，二氧化碳结合力 10mmol/L，下列治疗错误的是 (C) A、立即给予胰岛素 4~6U/h B.大量补液 2000ml/2~4h

- C、立即补充 5%碳酸氢钠
- D、立即补钾
- E、应用消炎药

43、男，60 岁，高血压病史 10 余年，近来常感觉右上肢麻木，2 天前晨起后感觉右手无力，不能持物，并有左口角流涎，症状持续进展，但意识清楚，无恶心、呕吐。此患者最可能的诊断是 (B)

- A、脑栓塞
- B、脑血栓形成
- C、脑出血
- D、蛛网膜下腔出血
- E、面神经炎

44、男性 40 岁，反复发作上腹部疼痛，时有烧心、反酸，伴有吞咽困难，食管的 pH 检测阳性，问最有可能的诊断是（ E ）

- A、心绞痛
- B、食管癌
- C、食管贲门弛缓症
- D、消化性溃疡
- E、反流性食管炎

45、女性，31 岁，孕 3 个月以来自觉消瘦、易饥、心悸、多汗。轻突眼，甲状腺Ⅱ度肿大，质软，无震颤，未闻及血管杂音，心肺腹未见明显异常。如患者要求手术治疗，应选择以下方案（ C ）

- A、先用他巴唑控制病情至症状控制，心率 < 100 次/分，FT3、FT4 正常，于妊娠 6-9 个月手术
- B、先用 PTU 控制病情至症状控制，心率 < 100 次/分，FT3、FT4 正常，于妊娠 6-9 个月手术
- C、先用 PTU 控制病情至症状控制，心率 < 100 次/分，FT3、FT4 正常，于妊娠 4-6 个月手术
- D、先用他巴唑控制病情至症状控制，心率 < 80 次/分，FT3、FT4 正常，于妊娠 4-6 个月手术
- E、先用 PTU 控制病情至症状控制，心率 < 80 次/分，FT3、FT4 正常，于妊娠 4-6 个月手术

46、贫血患者，外周血片示红细胞大小不等，中央淡染区扩大。血清铁饱和度 16%。最可能的诊断是（ B ）

- A、铁粒幼细胞性贫血
- B、缺铁性贫血
- C、再生障碍性贫血
- D、巨幼红细胞贫血
- E、以上均不是

A3 型题

第 47-48 题共同题干：

一名 55 岁男性病人，近 1 个月来上腹部疼痛，低热，体重减轻。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/938106124025006034>