A 型（单项选择）：300/3

循环系统疾病

1. 下列哪项不是诊断左心衰的依据　　（ C ）

A. 劳力性呼吸困难B. 端坐呼吸C. 发作性呼气性呼吸困难D. 粉红色泡沫痰2. 洋地黄毒性反应的处理措施，下列哪项不正确（ C ）

A. 停用洋地黄类制剂

B. 频发室早静注苯妥英钠

C. 缓慢心律失常选用氯化钾

D. 洋地黄特异性抗体治疗

3. 下列哪项最适合选用西地兰（ A ）

A. 充血性心力衰竭伴快速房颤

B. 预激综合征伴心房颤动

C. 急性心肌梗塞合并心衰

D. 肥厚型心肌病伴明显心衰

4. 洋地黄中毒出现频发室性早搏，治疗应首选（ B ）

A. 钾盐　　B. 苯妥英钠

C. 阿托品　　D. 奎尼丁

5. 一心脏病患者轻度活动时即引起乏力、心悸、呼吸困难等症状。其心功能应属（ C ）

A. 心功能 1 级　　B. 心功能 2 级

C. 心功能 3 级　　D. 心功能 4 级

6. 以下哪项符合心脏后负荷(压力负荷)过度（ B ）

A. 主动脉瓣关闭不全　　B. 肺动脉瓣口狭窄

C. 二尖瓣关闭不全　D. 左至右分流的先天性心脏病

7. 在一定范围内心率的增加心排血量，下列哪种情况会使心室充盈不足反致心排血量降低（ C ）

A. 心率＞100 次/min

B. 心率＞120 次/min

C. 心率＞160～180 次/min

D. 心率＞180～200 次/min

8. 在心衰的慢性调节过程中，下列哪项与之有关（ D ）

A. 心室肌群增加可代偿性增强收缩力

B. 肥厚心肌收缩时张力增长速率减慢，使心肌氧耗量增加

C. 肌管系统和线粒体相对不足，影响能量供应，收缩力相应减退

D. 以上均有关

9. 左心衰竭时最早出现的症状是（ A ）

A. 呼吸困难　　B. 咳嗽、咯痰、咯血

C. 肝颈静脉回流征阳性　　D. 急性肺水肿

10. 慢性左心衰的体征方面(除原有心血管疾病外)常不包括哪项（ D ）

A. 心脏浊音界增大　　B. 肺动脉瓣区第二心音增强

C. 心尖部收缩期吹风样杂音

D. 心尖部舒张期滚筒样杂音

11. 急性肺水肿典型 X 线表现是（ C ）

A. 肺门舞蹈　　B. 两肺纹理增粗

C. 肺门蝴蝶形阴影　　D. 肺透亮度增加

12. 下列各项中对诊断急性肺水肿最特异的是(C)

A. 气促发绀，烦躁不安

B. 肺动脉瓣区第二音亢进

C. 咯粉红色泡沫痰

D. 心尖区可闻及奔马律

13. 鉴别右心衰竭肝肿大与肝硬变的要点是(B)

A. 下肢水肿　　B. 静脉压升高

C. 腹水形成　　D. 肝脏肿大

14. 一患者，50 岁，突然呼吸困难，满肺哮鸣音心率快，听不清有无心脏杂音，过去史不详，下列药物中应选用哪种(D)

A. 麻黄素　　B. 异丙肾上腺素

C. 肾上腺素　　D. 氨茶碱

15 . 下列哪项不属于过早搏动的体征(A)

A. 大炮音　　B. 第一心音增强

C. 第二心音减弱　　D. 脉搏有间歇

16. 某男，29 岁，心电图显示QRS 波形态正常，频率 200 次/分，R—R 绝对整齐。反复发作 10 年，诊断为　　(B)

A. 窦性心动过速

B. 阵发性室上性心动过速

C. 心房扑动

D. 室性心动过速

17. 关于心房颤动的诊断，不列哪项不正确(C)

A. 心律绝对不规则

B. 第一心音强弱不一

C. 出现第三心音

D. 脉搏短拙

18. 心律失常的诊断主要依靠(D)

A. 体格检查　　B. X 线检查

C. 超声心动图　　D. 心电图

19. 关于室早的心电图表现，下列哪项不正确　　(D)

A. 提前出现宽大、畸形 QRS 波群

B. 无 P 波

C. T 波宽大与QRS 波群主波方向相反

D. 代偿间歇多不完全

20. 阵发性室上性心动过速发作期的处理，首选药物是　　(B)

A. 苯福林　　B. 维拉帕米

C. 利多卡因　　D. 普鲁卡因胺

21. 关于房扑的心电图表现，下列哪项不正确(　B　)

A. P 波消失

B. 大小不等，形态不同，间歇不均匀的f 波

C. 心室律均齐或不均齐

D. 可有QRS 增宽变形

22. 文氏现象不可能出现下列哪种房室传导比例　　(　D　)

A. 5：4　　B. 4：3

C.3：2　　D.2：1

23.人体各组织系统，对缺氧最敏感的是　　（　　D　）

A.心脏　　B.肝脏

C.肾脏　　D.脑组织

24.心脏猝死的病因，最常见的是(　A　)

A.冠心病　　B.肥厚梗阻型心肌病

C.病态窦房结综合征

D.QT 间期延长综合征

25 .脑循环完全终止引起脑组织不可逆性损害所需最短时间是(　B　)

A.1 分钟　　B.5 分钟

C.10 分钟　　D.15 分钟

26.心脏骤停的复苏，下列哪项不属于建立人工有效循环的措施　　（　　D　　）

A.畅通气道　　B.人工呼吸

C.胸外心脏按压　　D.电击除颤

27.心肺复苏时，人工呼吸的频率应控制在哪个范围　　（　B　）

A.每分钟 11—15 次　　B.每分钟 16—20 次

C.每分钟 21—25 次　　D.每分钟 26—30 次

28.关于胸外心脏按压的频率，最合适的范围是(　　C　　)

A.每分钟 40—60 次　　B.每分钟 60—80 次

C.每分钟 80—100 次　　D.每分钟 100—120 次

29.心肺复苏时，下列哪种给药途径不能奏效(　A　)

A.肌内注射　　B.静脉注射

C.气管内滴注　　D.心内注射

30.心室颤动的首选治疗措施是　　（　　D　）

A.利多卡因　　B.普鲁卡因胺

C.同步直流电击除颤　　B.非同步直流电击除颤

31.关于风湿热的叙述，下列哪项不正确　　（　B　）

A.与 A 族乙型溶血性链球菌有关

B.感染性疾病　　C.全身结缔组织病变

D.初次发作多在 15 岁

32.关于风湿热与 A 族乙型溶血性链球菌的关系，下列哪项不正确　　（　　C　）

A.风湿热发病不在链球菌感染的当时

B.风湿热病灶中从未找到溶血性链球菌

C.风湿热患者在链球菌感染后激发免疫机制从而使风湿热的复发率降低。

D.风湿热并非A 族乙型溶血性链球菌直接作用的结果

33.关于风湿热的病理变化，下列哪项不正确　　（　　C　　）

A.全身结缔组织病变

B.关节以渗出为主，故不留畸形

C.阿绍夫小体是瘢痕期的典型表现

D.心脏可表现出渗出和增生性炎症

34.Carey-Coombs 杂音是指　　（　　B　　）

A.心尖部收缩期杂音　　B.心尖部舒张期杂音

C.主动脉瓣收缩期杂音　　D.主动脉瓣舒张期杂音

35.心包炎最重要的体征是　　（　　D　　）

A.心尖搏动减弱　　B.心浊音界扩大

C.心音遥远　　D.心包摩擦音

36.关于舞蹈病的叙述，下列哪项不正确　　（ A　　）

A.多见于成人　　B.睡眠后消失

C.主要累及面部和四肢

D.无目的、不自主、不协调的快速运动

37.下列哪项不属于风湿热的临床表现　　（　　C　　）

A.多发性关节炎　　B.舞蹈病

C.蝶形红斑　　D.皮下结节

38.下列哪项表现符合风湿热诊断标准　　（　　B　）

A.发烧、心脏炎、ASO 滴度＜500U，补体结合抗体滴度增高

B.发烧、心脏炎、ASO 滴度为 625U，血沉增快

C.发烧、左膝关节红肿痛，血沉增快，ASO 滴度＜500U

D.发烧咽痛、关节痛、ASO 为625U

39.亚急性感染性心内膜炎最常发生于　　（　　A　）

A.风湿性二尖瓣关闭不全

B.显著的二尖瓣狭窄伴房颤

C.心力衰竭　　d.缺血性心脏病

40.在心尖区听到隆隆样舒张期杂音，其杂音随体位而改变者应考虑(　　C　)

A.风湿性心脏病二尖瓣狭窄

B.三尖瓣狭窄　　C.左房粘液瘤

D.肺动脉瓣关闭不全

41.风心病二尖瓣狭窄患者如听到第一心音亢进并有二尖瓣开瓣音提示(　　D　)

A.二尖瓣弥漫性钙化

B.漏斗型二尖瓣狭窄伴有关闭不全

C.二尖瓣瓣叶增厚

D.二尖瓣瓣叶增厚不明显仍有弹性和活动力

42.风湿性心脏病二尖瓣狭窄最常见的心律失常是　　（　　B　）

A.室上性心动过速　　B.心房颤动

C.室性早搏　　D.房室传导阻滞

43.风湿热以渗出为主的病理损害常见于　　（　C　　）

A.心内膜　　B.心肌

C.心包　　D.心瓣膜

44.风湿性心肌炎下列哪项是不符合的　　（　A　）

A.第一心音增强　　B.窦性心动过速

C.收缩期杂音　　D.心脏扩大

45 .风湿性心肌炎时最常见的心电图改变是　　（　A　）

A.P—R 延长　　B.Q—T 延长

C.ST 下移　　D.T 波倒置

46.风湿热患者发热的最常见热型　　（　D ）

A.弛张热　　B.持续低热

C.稽留热　　D.不规则热

47.风湿性心肌炎患者下列哪项不符合　　（　　B　）

A.窦性心动过速其心率与体温增高不成比例

B.睡眠时心率仍快，热退后即不再增快

C.可闻舒张期奔马律

D.心尖部可闻二级全收缩期杂音

48.风湿热心包炎的临床表现中下列哪项不符合　　（　　D　　）

A.多与心肌炎心内膜炎并存

B.心前区疼痛

C.心包摩擦音

D.有心包渗液，且量较多易引起心包填塞

49.下列哪项不符合风湿热舞蹈病特征　　（　　C　　）

A.表现为四肢不自主、不协调、无目的地快速运动

B.上述表现于精神紧张时加剧

C.发作后常留有神经系统后遗症

D.多见于女性、儿童

50.反复风湿活动会导致以下列哪种情况　　（　　B　　）

A.关节功能障碍畸形　　B.慢性心脏瓣膜病

C.神经系统后遗症　　D.以上均可发生

51.下列哪项表现符合亚急性感染性心内膜炎　　（　D　）

A.进行性贫血　　B.脾脏肿大、杵状指

C.原有瓣膜病　　D.以上都符合

52.风湿活动因胶原纤维破坏，下列哪项检查可为阳性　　（　　C　　）

A.血沉　　B.“C”反应蛋白

C.粘蛋白　　D.抗链球菌激酶

53.风心病最常累及的心脏瓣膜是　　（　　A　　）

A.左房室瓣　　B.主动脉瓣

C.右房室瓣　　D.肺动脉瓣

54.左房室瓣最常见的症状是　　（　　B　　）

A.咳嗽　　B.呼吸困难

C.咯血　　D.压迫症状

55.粉红色泡沫痰与下列哪项有关　　（　　C ）

A.肺泡壁毛细血管破裂

B.支气管静脉曲张破裂

C.急性肺水肿　　D.肺梗死

56.左房室瓣狭窄的临床表现中，下列哪项不属于压迫症状　　（　　C　　）

A.声音嘶哑　　B.吞咽困难

C.端坐呼吸　　D.干咳

57.关于左房室瓣狭窄的体征，下列哪项不正确　　（　B　　）

A.心脏浊音界呈梨形　　B.心尖区收缩期杂音

C.拍击性第一心音　　D.肺动脉瓣区舒张期杂音

58.关于左房室瓣关闭不全，下列哪项不正确　　（　　C　　）

A.后期可出现右心衰　　B.心浊音界向左下扩大

C.心尖区全舒张期杂音

D.超声心动图测出左房、左室肥大

5 9.下列那项不属于周围血管征　　（　　B　　）

A.脉压增大　　B.奇脉

C.枪击声　　D.颈动脉搏动明显

60.主动脉瓣关闭不全的X线检查，心影表现为　　（　　D　）

A.梨形心　　B.烧瓶心

C.球形心　　D.靴形心

61.周围血管征与下列哪项有关　　（　　D ）

A.左房室瓣狭窄　　B.左房室瓣关闭不全

C.主动脉瓣狭窄　　D.主动脉瓣关闭不全

62.主动脉瓣狭窄的临床表现与下列哪项无关　　（　　D　）

A.心绞痛发作　　B.第二心音反常分裂

C.左室呈向心性肥厚　　D.非对称性室间隔肥厚

63.关于主动脉瓣狭窄的心脏听诊，下列哪项正确　　（　C　）

A.胸骨左缘第二肋间收缩期杂音

B.胸骨左缘第二肋间舒张期杂音

C.胸骨右缘第二肋间收缩期杂音

D.胸骨右缘第二肋间舒张期杂音

64.左房室瓣狭窄的体征，下列哪项不正确　（　C　）

A.心尖部舒张期震颤　　B.左房室瓣面容

C.心尖部第一心音减弱

D.肺动脉瓣区第二心音亢进

65.左房室瓣狭窄的X 线表现下列哪项不正确　　（　　B　　）

A.左心房扩大　　B.左心室扩大

C.右心室扩大　　D.肺淤血

66.左房室瓣狭窄并发心房纤颤易发生下列哪项并发症　　（　B　　）

A.心力衰竭　　B. 栓 塞

C.亚急性感染性心内膜炎

D.肺部感染

67.关于风湿性心瓣膜病下列哪项不正确　　（　B　　）

A.是风湿性心脏炎发作被控制后遗留下来的心瓣膜病变

B.是活动性风湿性心脏病最主要表现形式

C.以二尖瓣病变或二尖瓣合并主动脉瓣病变为常见

D.风湿热的反复发作可以加重心瓣病变

68.在风心病中下列哪种病变最常见　　（　　A　）

A.单纯二尖瓣狭窄　　B.二尖瓣关闭不全

C.主动脉瓣关闭不全　　D.主动脉瓣狭窄

69.下列哪型二尖瓣狭窄病变程序最轻　　（　　B　　）

A.瓣膜增厚型　　B.边缘粘连型

C.隔膜漏斗型　　D.漏斗型

70.关于二尖瓣狭窄的症状下列哪项不正确　　（　　C　）

A.轻度二尖瓣狭窄可无明显症状

B.左心房代偿功能失调时多有呼吸困难、咳嗽、咯血

C.病情进一步发展常导致左心室肥厚

D.以上均不正确

71.关于二尖瓣狭窄发生大咯血下列哪项不正确　　（　　D　　）

A.为肺泡内毛细血管破裂所致

B.多发生在二尖瓣狭窄的早期反映肺动脉高压形成
C.并发肺梗塞时可出现大量咯血常呈鲜红色
D.以上均不正确
72.二尖瓣狭窄出现颈静脉怒张、肝肿大压痛是由于　　（　A　）
A.体循环静脉淤血　　B.肺循环淤血
C.左心房扩大所致的压迫症状
D.肺动脉高压，肺梗塞的结果
73.心尖区第一心音亢进及胸骨左缘第3、4 肋间听到二尖瓣开放拍击音提示狭窄为哪型
（　　A　）
A.边缘粘连型　　B.瓣膜增厚型
C.隔膜漏斗型　　D.漏斗型
74.二尖瓣狭窄最重要的体征是　　（　B　）
A.心尖区第一心音亢进
B.心尖区可闻局限、低调舒张中晚期隆隆样杂音
C.肺动脉瓣区第二音亢进
D.肺动脉瓣区可闻高调吹风样舒张早期杂音
75 .下列哪项符合左心房粘液瘤(A)
A.心尖区可闻舒张期隆隆样杂音呈间歇性出现
B.心尖区内上方可闻二尖瓣开放拍击音
C.超声心动图示舒张期二尖瓣前后叶呈同向运动
D.常不发生周围栓塞
76.风湿性二尖瓣关闭不全的主要病理改变是　　（　D ）
A.瓣叶、乳头肌和腱索缩短
B.瓣叶和乳头肌之间粘连
C.病变处常有钙质沉着
D.以上各项均是
77.风湿性二尖瓣关闭不全最主要的体征是(C)
A.心尖搏动向左下移位并抬举性搏动
B.心尖区可闻舒张期隆隆样杂音
C.心尖区可闻粗糙高调全收缩期吹风样杂音
D.肺动脉瓣区第二心音亢进
78.心电图示 P 波增宽顶端有切迹，右心室肥大劳损可见于(B)
A.二尖瓣关闭不全　　B.二尖瓣狭窄
C.主动脉瓣狭窄　　D.二尖瓣脱垂
79.关于风湿性主动脉瓣关闭不全下列哪项不正确　　（　　C　）
A.在主动脉瓣病变中关闭不全较早发生但常合并有狭窄
B.主要病理改变为瓣膜增厚变硬、缩短
C.左心室收缩期心搏血量较正常为少
D.主动脉瓣返流量大者舒张压显著降低
80.关于风湿性主动脉瓣关闭不全的症状下列哪项符合　　（　　A　　）
A.轻度患者常无明显症状
B.轻度患者即有头晕、心悸、颈部动脉强烈搏动感
C.晚期出现左心衰但无心绞痛
D.早期易发生肺淤血

81. 主动脉瓣关闭不全的超声心动图检查中哪项最重要　　（　C　）

A. 左室增大　　B. 主动脉内径增宽

C. 主动脉关闭时呈双线

D. 舒张期见二尖瓣前叶的纤细扑动

82. 以下哪项不符合高血压动脉粥样硬化性主动脉瓣关闭不全　　（　B　）

A. 年龄多见于 60 岁以上

B. 主动脉瓣区第二心音减弱或消失

C. X 线示主动脉延长增宽

D. X 线下可见钙化阴影

83. 下列哪项符合感染性心内膜炎所致的主动脉瓣关闭不全　　（　D　）

A. 瓣膜为细菌性炎症破坏

B. 感染使原有杂音增强

C. 血培养阳性　　D. 以上全都符合

84. 关于主动脉瓣狭窄下列哪项正确　　（　D　）

A. 狭窄程度轻时对血流动力学影响不大

B. 中度狭窄时可引起左心室代偿肥大

C. 严重狭窄时可造成心肌供血的绝对和相对不足

D. 以上各项都正确

85. 风湿性主动脉瓣狭窄的最重要体征是　　（　B　）

A. 胸骨左缘第 3、4 肋间可闻高调舒张早期吹风样杂音

B. 胸骨右缘第 2 肋间响亮粗糙，喷射性收缩期杂音

C. 心尖区可闻Austin-Flint 杂音

D. 主动脉瓣区第二心音增强

86. 常见的风湿性联合瓣膜病变是　　（　C　）

A. 二尖瓣狭窄合并二尖瓣关闭不全

B. 二尖瓣关闭不全合并主动脉瓣狭窄

C. 二尖瓣狭窄合并主动脉瓣关闭不全

D. 主动脉瓣关闭不全合并肺动脉瓣关闭不全

87. 栓塞最常见于哪项风湿性心瓣膜病　　（　C　）

A. 二尖瓣关闭不全　　B. 主动脉瓣关闭不全

C. 二尖瓣狭窄　　D. 主动脉瓣狭窄

88. 风湿性二尖瓣狭窄最常见的心律失常是　　（　D　）

A. 室性早搏　　B. 阵发性心动过速

C. 房室传导阻滞　　D. 心房颤动

89. 风湿性心瓣膜最常见的并发症是　　（　B　）

A. 呼吸道感染　　_B. 心力衰竭

C. 亚急性感染性心内膜炎

D. 心律失常

90. 下列哪项符合主动脉瓣狭窄的症状表现　　（　D　）

A. 轻度狭窄多无症状

B. 病变加重出现劳力性呼吸困难

C. 病人可有心绞痛、左心衰、易猝死

D. 以上各项都符合

91. 关于缓进型高血压，下列哪项不正确　　（　D　）

A.多于中年以后发病
B.病程早期，多数患者无症状
C.长期高血压可致左心衰竭
D.本型以并发尿毒症死亡者最多

92.下列哪项不属于高血压急症　　（　A　）
A.高血压性心脏病　　B.高血压危象
C.急进型高血压　　D.高血压脑病

93.高血压病发生的左室肥厚的最敏感、可靠的诊断手段是　　（　C　）
A.体格检查　　B.胸部 X 线检查
C.心电图检查　　D.超声心动图检查

94.关于高血压病第二期的并发症，下列哪项不正确　　（　B　）
A.左心室肥大　　B.脑出血
C.蛋白尿　　D.眼底动脉变窄

95.年轻高血压病患者，特别是心率快脉压大者首选降压药物是　　（　B　）
A.利尿剂　　B.β受体阻滞剂
C.钙拮抗剂　　D.转化酶抑制剂

96.高血压急症的首选降压药物是　　（　A　）
A.硝普钠　　B.硝酸甘油
C.呋塞米　　D.硝苯地平

97.在高血压病的发病过程中，下列哪项因素参与　　（　D　）
A.高级神经中枢功能障碍
B.体液、内分泌因素
C.肾脏　　D.以上各项均参与

98.下列哪项具有最强的收缩小动脉作用　　（　C　）
A.血管紧张素原　　B.血管紧张素Ⅰ
C.血管紧张素Ⅱ　　D.血管紧张素Ⅲ

99.下列哪项引起钠潴留、血容量增多使升高的血压得以持续下去　　（　B　）
A.肾上腺素　　B.醛固酮
C.血管紧张素Ⅰ　　D.肾素

100.高血压持续多年后，引起全身细小动脉硬化，下列那项病变最显著　　（　C　）
A.肺细小动脉硬化　　B.脾细小动脉硬化
C.肾细小动脉硬化　　D.脑细小动脉硬化

101.关于缓进型高血压病的症状，下列哪项不正确　　（A　）
A.症状轻重与血压增高程度相一致
B.可出现头痛、头晕、耳鸣、眼花、健忘、失眠等症状，但多数患者无症状
C.高血压引起的头晕可为暂时性，血压下降后可减轻
D.高血压引起的头痛以前额、枕部、耳部多见

102.高血压病后期易并发下列哪项疾病　　（　D　）
A.高血压性脑出血　　B.短暂脑缺血发作
C.脑血栓形成　　D.以上各项均易并发

103.下列哪项符合高血压性心脏病的诊断条件　　（　C　）
A.三年以上高血压病史，X 线示左室增大
B.年龄在 4,　岁以上有左室增大和左心衰竭
C.年龄在 40 岁以上，五年以上高血压病史，左心衰竭

D.以上均不符合

104.需与高血压病鉴别的症状高血压有　　（　D　）

A.慢性肾小球肾炎　　B.慢性肾盂肾炎

C.嗜铬细胞瘤　　D.以上均需与高血压病鉴别

105.肾素在高血压病发病机理中的作用是　　（　A ）

A.使血管紧张素原形成血管紧张素Ⅰ

B.使血管紧张素Ⅰ转化为血管紧张素Ⅱ

C.使全身细小动脉痉挛

D.直接引起水钠潴留

106.下列哪项可作为肾血管性高血压的主要诊断依据　　（ C　）

A.近期发生的高血压

B.上腹部或背部肋脊角处听到血管杂音

C.肾动脉造影有阳性发现　　D.氮质血症出现

107.对嗜铬细胞瘤有诊断价值的是　　（ C　　）

A.血钾测定　　B.血浆肾素测定

C.24 小时尿儿茶酚胺代谢产物

D.基础代射率检查

108.男性患者，50 岁，高血压史，5 年，血压为 24 / 16kPa(180/120mmH g)，心率 70 次/分，血浆肾素水平增高，最好的药物选择是　　（　　B　）

A.利血平　　B.卡托普利

C.双氢克尿塞　　D.倍他乐克

109.男性，60 岁，突起眩晕，左手无力，血压为30.6/16kPa(230/120mmHg)心率 120 次/分，下列哪项治疗较好　　（　　C　）

A.心得安+安定　　B.降压灵+杜冷丁

C.氯苯甲噻二嗪+双氢克尿塞

D.氨茶碱+西地兰

110.患者 40 岁，高血压史,5 年，血压为 26.6/17kPa(200/128mmHg)下肢浮肿，血NPN108mg/dl，近两年来有溃疡病，下列哪组药较适当　　（　　B　）

A.双氢克尿塞+利血平　　B.哌唑嗪+双氢克尿塞

C.胍乙啶+可乐宁+速尿　　D.肼苯哒嗪+速尿+美加明

111.在我国高血压病导致死亡最多的并发症是　　（ A　）

A.高血压性脑出血　　B.急性心肌梗塞

B.肾细小动脉硬化肾功能衰竭

D.糖尿病酮症酸中毒

112.关于初发劳累性心绞痛，下列哪项正确　　（　A　）

A.病情在 1 个月以内　　B.病情在 1 个月以上

C.病情在 3 个月以内　　D.病情在 3 个月以上

113.治疗变异型心绞痛，疗效最好的药物是　　（　　C　　）

A.硝酸盐类　　B.β受体阻滞剂

C.钙拮抗剂　　D.血小板聚集抑制药

114.心绞痛最常见的临床类型是　　（　B　　）

A.初发劳累性心绞痛　　B.稳定型劳累性心绞痛

C.恶化型劳累性心绞痛

D.自发性心绞痛

115 .变异型心绞痛的心电图表现是 （ C ）

A.发作时 ST 段下降 B.发作时 T 波倒置

C.发作时 ST 段抬高 D.发作时 T 波直立，平静时倒置

116. 心绞痛并有高血压及心率增快的患者首选药物是 （ B ）

A.硝酸异山梨酯 B.美托洛尔

C.硝苯地平 D.阿司匹林

117. 下列哪项符合稳定型劳累性心绞痛 （ B ）

A.运动诱发的典型心绞痛，病程在一个月以内。

B.运动诱发的典型心绞痛，病程在一个月以上

C.心绞痛在夜间发作，疼痛程度重，ST 段下移，T 段改变

D.心绞痛在凌晨定时发作，历时长程度重，S—T 段抬高

118.变异型心绞痛的特点之一是 （ C ）

A.心绞痛在情绪激动时诱发

B.心绞痛发作时ST 段压低

C.心绞痛发作时ST 段上抬

D.心绞痛发作时出现病理性Q 波

119. 隐性冠心病的诊断依据是 （ D ）

A.血脂升高 B.有吸烟史

C.有家族史 D.心电图有缺血型 ST—T 改变

120. 诊断急性心肌梗死合并休克，下列哪项无关 （ A ）

A.粉红色泡沫痰 B.收缩压＜10.6kPa

C.尿量＜20ml/h D.四肢湿冷

121. 急性心肌梗死最常见的心律失常形式是 （ C ）

A.房颤 B.交界性心动过速

C.室早 D.房室传导阻滞

122. 急性心肌梗死最早开始升高的血清酶是 （ B ）

A.天冬氨酸转氨酶 B.肌酸激酶

C.乳酸脱氢酶 D.LDH1

123. 急性心肌梗死溶栓疗法的最佳时机是 （ A ）

A.发病 6 小时以内 B.发病 12 小时以内

C.发病 18 小时以内 D.发病 24 小时以内

124. 关于急性右心室梗死的处理，下列哪项不正确 （ B ）

A.扩充血容量 B.静注速尿针

C.24 小时输液 3 至 6 升

D.伴房室传导阻滞者临时起搏治疗

125. 急性心肌梗塞，缓解疼痛宜用： （ C ）

A.休息和吸 O2 B.硝酸甘油

C.吗啡 D.消心痛

126. 急性心肌梗塞合并第三度房室传导阻滞时最好采用： （ C ）

A.异丙基肾上腺素 B.阿托品

C.置入人工心脏起搏器 D.洋地黄

127. 引起缺血性心脏病最多见的原因是： （ B ）

A.冠状动脉痉挛 B.冠状动脉粥样硬化

C.主动脉狭窄 D.结缔组织疾病

128.使用抗心绞痛的药物，下列哪项不正确?　　（　　B　）

A.口服硝酸异山梨醇 10mg 一日三次

B.口服硝酸甘油片 0.6mg 一日三次

C.对心率快无心衰、哮喘者可口服心得安

D.可用低分子右旋糖酐静滴

129.关于急性病毒性心肌炎时糖皮质激素的应用，下列哪项不正确　　（　A　）

A.一般认为，应尽早使用

B.对伴有严重全身毒血症状的治疗

C.对伴有严重心力衰竭的治疗

D.对伴有高度房室传导阻滞时

单项选择答案

1.C　　2. C　　5.A　　4.B　　5.C

6.B　7.C　8.D　9.A　10.D

11.C　12.C　13.B　14.D　15.A

16.B　17.C　18.D　19.D　20.B

21.B　22.D　23.D　24.A　25.B

26.D　27.B　28.C　29.A　30.D

31.B　32.C 33.C 34.B　35.D

36.A　37.C　38.B　39.A　40.C

41.D　42.B　43.C　44.A　45.A

46.D　47.B　48.D　49.C　50.B

51.D　52.C 53.A　54.B　55 .C

56.C　57.B　58.C　59.B　60.D

61.D　62.D　63.C　64.C　65 .B

66.B　67.B　68.A　69.B　70.C

71.D　72.A　73.A　74.B　75.A

76.D　77.C　78.B　79.C　80.A

81.C　82.B　83.D　84.D　85.B

86.C　87.C　88.D　89.B　90.D

91.D　92.A　93.C　94.B　95 .B

96.A　97.D　98.C　99.B　100.C

101.A　102.D　103.C　104.D　105 .A

106.C　107.C　108.B　109.C　110.B

111.A　112.A　113.C　114.B　115.C

116.B　117.B　118.C　119.D　120.A

121.C　122.B　123.A　124.B　125.C

126.C　127.B　128.B　129.A

内分泌系统疾病　代谢疾病

1.甲状腺功能亢进的临床表现，主要是　（　　D　）

A.兴奋急躁，心率增快，怕热，突眼

B.多食、消瘦，心悸，怕热，突眼

C.急躁，手颤，甲状腺肿大

D.代谢亢进，兴奋急躁，怕热，甲状腺肿大，突眼

2.甲状腺功能亢进症时良性突眼的原因主要是　　（　C　）

A.精神紧张，情绪兴奋

B.眼球后组织增生，水肿

C.交感神经兴奋，上睑肌挛缩

D.眼球肿大

3. 甲状腺功能亢进症时恶性(浸润性)突眼的原因，主要是

上眼睑肌挛缩 精神紧张，情绪兴奋 眼球肿胀增大 眼球后组织增生、浸润水肿

4.甲状腺功能亢进并发症最严重的是 （ D ）

A.甲亢性心脏病并发心衰

B.恶性突眼

C.甲亢并发肝肿大，肝功能损害

D.甲状腺危象

5 .甲状腺危象临床上的主要表现是 （ A ）

A.心率＞160 次/分，高热，呕吐腹泻，谵妄，昏迷

B.呕吐腹泻，心慌气急，脱水

C.心率快，血压先高后低，休克

D.心慌气急，呼吸困难，肺水肿

6.诊断甲状腺功能亢进症最灵敏的指标是 （ C ）

A.基础代谢率(BMR)

B.血清甲状腺素(T4)测定

C.血清三碘甲状腺原氨酸(T3)测定

D.甲状腺吸 131 碘率

7.甲状腺危象时应用碘剂的治疗作用是 （ B ）

A.阻止甲状腺激素的合成

B.抑制甲状腺激素的释放

C.降低组织对甲状腺素的反应

D.加强他巴唑的作用

8.下列哪项不是抗甲状腺药物治疗的适应证 （ B ）

A.病程短、病情轻，轻、中度甲状腺肿大者

B.甲状腺肿大特别明显，症状严重者

C.年龄 20 岁以下；妊娠期

D.年老体弱，有严重心、肝肾损害不适于手术者

9.糖尿病最常见的致死性并发症是 （ C ）

A.酮症酸中毒昏迷 B.并发感染

C.心血管病变 D.糖尿病高渗性昏迷

10.对疑诊糖尿病者［尿糖(±～＋)，空腹血糖正常或略高］。为了确诊，应作哪项检查 （ B ）

A.饭后血糖测定 B.葡萄糖耐量试验

C.空腹血浆胰岛素水平测定

D.血脂测定

11.糖尿病的治疗应是 （ B ）

A.控制饮食的基础上选用口服降糖药或胰岛素

B.合理的生活作息及体力活动，饮食疗法，酌情选用降血糖药，防治并发症

C.饮食治疗为主，辅以运动治疗

D.以饮食治疗为主，辅以口服降血糖药

12. 下列哪项不符合胰岛素的作用机理　　(A)

A. 促进糖元分解

B. 促进蛋白质和脂肪合成

C. 促进葡萄糖进入肌肉和脂肪细胞内

D. 促进某些氨基酸进入肌肉细胞内

13. 磺尿类降糖药的降血糖机理　　(C)

A. 增强胰岛素的作用

B. 具有类似胰岛素的作用

C. 刺激胰岛B 细胞分泌胰岛素

D. 增进细胞对葡萄糖的利用

14. 下列哪项不符合 1 型糖尿病　　(C)

A. 血浆胰岛素水平显著降低

B. 易发生酮症酸中毒

C. 口服降糖药治疗有效

D. 久病者影响生长发育身体比较矮小

15. 糖尿病酮症酸中毒时，电解质紊乱表现在　(B)

A. 血清钾正常或偏高

B. 血清中钠、氯降低

C. 血清中钠、钾、氯均增高

D. 血清中钾降低、钠及氯增高

16. 治疗糖尿病高渗性昏迷哪项是错误的　　(C)

A. 若有休克宜先输入生理盐水

B. 若无休克宜先输入 0.45%盐水

C. 血浆渗透压＜320 毫渗量(320mOsm/L)时仍应继续输 0.45%盐水

D. 胰岛素用量可比糖尿病酮症酸中毒小

17. 糖尿病酮症酸中毒治疗中，最重要的措施应是　　(B)

A. 足量胰岛素，纠正酸中毒

B. 足量胰岛素，补液和电解质

C. 足量胰岛素，中枢兴奋剂

D. 纠正酸中毒，补液和电解质

18. 胰岛素治疗最常见的不良反应是　　(B)

A. 过敏反应　　B. 低血糖反应

C. 注射部位脂肪组织萎缩

D. 注射处感染

19. 关于口服降糖药下列哪项是错误的　　(D)

A. 胰岛素依赖型糖尿病不宜选用口服降糖药

B. 磺脲类可直接刺激胰岛素B 细胞释放胰岛素

C. 双胍类适用于轻型肥胖的糖尿病病人

D. 双胍类与磺脲类合用可减弱降糖作用

单项选择答案

1.D　　2.C　　3.D　　4.D　　5 .A

6.C　　7.B　8.B　9.C　10.B

11.B　12.A　13.C　14.C　15 .B

16.C　17.B　18.B　19.D

B 型（配伍选择）：300/3

循环系统疾病

内分泌系统疾病　代谢疾病

结缔组织病

C 型（比较选择）：200/3

循环系统疾病

内分泌系统疾病　代谢疾病

结缔组织病

X 型（多项选择）：1,　0/3

循环系统疾病

双项选择

1.同时作用于小动脉和静脉的血管扩张剂有　　（　BD　）

A.酚妥拉明　　B.硝普钠

C.硝酸甘油　　D.卡托普利

E.消心痛

2.非洋地黄类正性肌力药物有　　（　　）

A.酚妥拉明　　B.转化酶抑制剂

C.多巴酚丁胺　　D.磷酸二酯酶抑制剂

E.西地兰

3.心功能不全时，哪些情况宜选用扩张静脉为主的药物　　（ AC ）

A.肺淤血　　B.周围阻力增高

C.肺水肿　　D.心排出量降低

E.高血压性心脏病

4.发生强心甙中毒后应采取哪些措施?　　（　BD　）

A.将地高辛改为每日维持量

B.停用强心甙药物

C.加用奎尼丁口服

D.停用排钾性利尿剂

E.立即使用电击除颤

5　.慢性心衰急性调节过程中与之有关的是：　　（ BD ）

A.排钠激素的作用　　B.心脏交感神经兴奋

C.钠与水潴留　　D.迷走神经抑制

E.代偿性心肌肥厚

6.与右心衰竭有关的是：　　（　AC　）

A.胸骨左缘第 3、4 肋间舒张期奔马律

B.心尖区可闻舒张期奔马律

C.黄疸伴转氨酶升高

D.端坐呼吸、咯粉红色泡沫痰

E.相对性二尖瓣关闭不全所致心尖部收缩期吹风样杂音

7.慢性心衰时静脉压明显增高见于：　　（　CE　）

A.急性肺水肿

B.左心衰所致肺淤血

C.右心衰伴黄疸

D.臂至舌循环时间延长

E.压迫慢性心衰患者肿大的肝脏时

8.下列哪项不符合右心衰引起的水肿：　　（　AE　）

A.晨间起床时颜面水肿

B.下垂性凹陷性水肿

C.仰卧时骶部水肿

D.全身水肿并发右侧胸水

E.尿液中有明显异常

9.治疗心衰使用的血管扩张药中，同时作用于小动脉及小静脉者是：　　（　BE　）

A.苄胺唑啉　　B.卡托普利

C.肼苯哒嗪　　D.硝酸异山梨醇酯

E.硝普钠

10.引起左室后负荷增加的主要因素是：　　（　BD　）

A.肺动脉高压　　B.体循环高压

C.主动脉瓣关闭不全　　D.主动脉瓣狭窄

E.二尖瓣狭窄

11.下列哪项是心衰的诱发因素?　　（　AD　）

A.感染　　B.偶发性室性早搏

C.高钾低钠饮食　　D.强心甙中毒

E.利尿剂应用

12.不宜用洋地黄的心衰是：　　（　AC　）

A.重度二尖瓣狭窄伴心衰

B.扩张型心肌病伴心衰

C.梗阻型心肌病伴心衰

D.心肌梗塞伴心衰

E.高血压性心脏病伴心衰

13.关于莫氏Ⅱ型的心电图表现，下列哪些正确　　（　AC　）

A.P—R 间期固定不变

B.P—R 间隔逐渐缩短

C.可出现 2：1、3：2 或4：3 房室传导比例

D.QRS 波群增宽畸形

E.P—R 间期逐渐延长

14.关于三度房室传导阻滞的临床表现，正确的有　　（ AB ）

A.心源性脑缺氧综合征

B.大炮音

C.心律绝对不齐

D.颈静脉搏动频率慢于心率

E.心电图示心房率慢于心室率

15.临床死亡的标志是指　　（　AB　）

A.心脏骤停　　B.心跳呼吸停止

C.脑死亡　　D.细胞死亡

E.脑电波消失

16.心脏骤停的可靠而出现较早的临床征象是　　（　BD　）

A.血压测不出　　B.意识突然丧失

C.瞳孔散大　　D.大动脉搏动消失

E.叹息样呼吸

17.风湿热时，以渗出为主的部位有　　（　AB　　）

A.关节　　B.心包　　C.瓣膜　　D.心肌　　E.心内膜

18.关于风湿性关节炎，下列哪些不正确　　（　　）

A.红、肿、热、痛和活动受限

B.游走性

C.最常侵入掌指关节和近端指间关节

D.遗留关节畸形

E.对称性

19.能证明近期有溶血性链球菌感染的免疫学检查是：　　（ BD　　）

A.红细胞沉降率

B.ASO(抗链球菌溶血素“O”)

C.AFP(血清甲种胎儿球蛋白)

D.ASK(抗链球菌激酶)

E.CPK(肌酸磷酸激酶)

20.下列哪种疾病时 ASO 滴度升高?　　（　　AC　　）

A.风湿热　　B.心房粘液瘤

C.亚急性感染性心内膜炎

D.二尖瓣脱垂

E.特发性主动脉瓣下狭窄

21.下列哪些项表示风湿活动?　　（　　）

A.ASO 滴度＜500 单位

B. 白 细 胞 计 数 ＞10×109/L

C.“C”反应蛋白阳性，血清粘蛋白增高

D.ASO＞500 单位，血沉增快

E.ASK＜80 单位

22.风湿炎症侵犯大、中型动脉可引起哪些情况?　　（　　BE　）

A.舞蹈病　　B.无脉病

C.关节炎　　D.肾小球硬化症

E.偏瘫

23.一风湿热患者于心尖部可闻 3 级较粗糙的收缩期杂音，于胸骨左缘第 3 肋间听到高调短促舒张期杂音提示受损害的是：　　（　AD　　）

A.二尖瓣　　B.三尖瓣

C.肺动脉瓣　　D.主动脉瓣

E.属功能性杂音

24.风湿性心脏炎合并心衰时，下列哪项最有关?　　（　　AD　　）

A.窦性心动过速

B.心尖部短促的舒张中期杂音

C.第一心音减弱及舒张期奔马律

D.频发性房性早搏

E.儿童具有严重心肌炎表现

25.下列哪项符合严重风湿性心脏炎?　　（　AE　）

A.风湿热患者出现心包渗液

B.胸骨左缘第 3 肋间高调短促舒张期杂音

C.窦性心动过速于睡眠时心率仍快

D.心脏扩大呈双侧性

E.反复出现皮下结节

26.风湿热患者伴严重心衰，为判断其有无风湿活动，下列哪项有意义?　　（　BD　）

A.白细胞　　B.“C”反应蛋白

C.ASO　　D.粘蛋白

E.ASK

27.下列哪些项目不符合系统性红斑狼疮?　　（　AC　）

A.口唇发绀、两颧紫红色

B.伴肝、肾等多器官损害

C.白细胞计数增多

D.抗核抗体阳性

E.血清补体C3 下降

28.对风湿性心脏炎的治疗，下列哪两项正确?　　（　BD　）

A.绝对卧床休息直至血沉恢复正常

B.使用肾上腺糖皮质激素

C.糖皮质素减量后有低热、血沉增快，应视为风湿复发

D.青霉素肌肉注射足够剂量和疗程

E.伴皮肤损害者，首选阿斯匹林

29.下列体征与左房室瓣狭窄有关的有：　　（　A D　）

A.梨形心　　B.Austin—Flint 杂音

C.靴形心　　D.Graham—Steell 杂音

E.周围血管征

30.左房室瓣狭窄的X 线表现有　　（　AD ）

A.左房大　　B.左室大

C.右房大　　D.右室大

E.靴形心

31.左房室瓣关闭不全的诊断依据有：　　（　AD　）

A.心尖区收缩期杂音

B.心尖区舒张期杂音

C.左房、右室大

D.左房、左室大

E.梨形心

32.下列各项与周围血管征有关的是　　（　AB　）

A.枪击音　　B.颈动脉搏动明显

C.大炮音　　D.颈静脉搏动明显

E.开瓣音

33.联合瓣膜病变最常见的组合包括　　（　AC　）

A.左房室瓣病变　　B.右房室瓣病变

C.主动脉瓣病变　　D.肺动脉瓣病变

E.静脉瓣膜病变

34.下列哪些改变提示二尖瓣狭窄：　　（　AC　）

A.心电图示P 波增宽、顶端有切迹

B.心电图出现高尖P 波，P 振幅 0.25mv

C.超声心动图示二尖瓣前叶活动曲线E—A 峰消失呈城墙型

D.超声心动图示二尖瓣前后叶反向运动

E.X 线示心脏呈靴型增大

35.二尖瓣关闭不全的血流动力学改变是：　　（　BD　）

A.单纯左心房压力增高

B.左心房与左心室扩张、肥厚

C.“肺微血管”压力曲线中a 波升高

D.肺动脉压增高、右心室肥大

E.肺循环阻力降低

36.下列哪项符合风湿性二尖瓣狭窄的主要病理生理特征?　　（　AC　）

A.左心房压力增高、左房扩张肥厚

B.左心室亦扩张肥厚

C.肺动脉高压致右心室肥厚扩张

D.舒张压显著降低，冠脉供血不足

E.肺动脉瓣区第二心音减弱消失

37.二尖瓣关闭不全的体征有：　　（　AD　）

A.心尖区高调、响亮、粗糙的全收缩期杂音

B.心尖区第一心音亢进

C.周围血管征

D.收缩期杂音向左腋传导，可遮盖第一心音

E.胸骨左缘 3、4 肋间舒张早期吹风样杂音

38.下列哪项符合左房粘液瘤?　　（　BD　）

A.常为异位心律

B.杂音呈间歇出现，随体位而改变

C.常有二尖瓣开放拍击音

D.超声心动图示舒张期二尖瓣前、后叶呈反向活动

E.有舒张期喀喇音，易发生周围栓塞

39.下列哪项符合二尖瓣脱垂?　　（　CE　）

A.心尖区可闻收缩早期喷射音

B.心脏舒张时二尖瓣脱垂入左心室

C.为乳头肌功能不全，腱索过长或断裂所致

D.常伴有舒张晚期递增型杂音

E.常因缺血性心脏病和风湿性瓣膜炎所致

40.显著的主动脉瓣关闭不全可产生周围血管征，包括：　　（　　）

A.舒张压增高、脉压变小　　B.交替脉

C.毛细血管搏动　　D.动脉枪击音

E.可出现奇脉

41.主动脉瓣关闭不全在胸骨左缘3、4 肋间听到的舒张早期吹风样杂音，在什么情况下更为清晰?　　（ AC　）

A.坐位并向前倾　　B.平卧位

C.深呼气后屏气　　D.左侧卧位

E.深吸气后

42.风湿性心瓣膜病出现心绞痛时，常见于下列哪项?　　（　BD　）

A.二尖瓣关闭不全　　B.主动脉瓣关闭不全

C.二尖瓣狭窄　　D.主动脉瓣狭窄

E.风湿活动时

43.下列哪项符合主动脉瓣狭窄的心电图特征?　　（　BC　）

A.心电轴右偏、右心室扩大

B.左心室肥厚、劳损

C.常伴左束支或心室内传导阻滞

D.P 波增宽伴右心室肥大

E.晚期常并发心房颤动

44.关于风湿性联合瓣膜病，以下哪项正确?　　（　AC　）

A.常见二尖瓣狭窄伴主动脉瓣关闭不全

B.二尖瓣狭窄合并主动脉瓣关闭不全时心尖区舒张期杂音明显增强

C.合并二狭时主动脉瓣关闭不全的周围血管征变为不显著

D.常见二尖瓣狭窄合并二尖瓣关闭不全

E.各瓣膜病变所致的体征无互相影响

45 .二尖瓣分离术的适应症为：　　（　BD　）

A.二尖瓣狭窄合并关闭不全

B.二尖瓣狭窄隔膜型

C.心功能 4 级

D.心功能 3 级

E.年龄在 50—65 岁

46.肺动脉瓣区第二音亢进伴分裂，可见于下列哪项?　　（　AC　）

A.风湿性二尖瓣狭窄　　B.风湿性主动脉瓣狭窄

C.风湿性二尖瓣关闭不全　　D.风湿性主动脉瓣关闭不全

E.风湿性二尖瓣狭窄合并主动脉瓣关闭不全

47.禁用于房室传导阻滞的降压药是：　　（　BD　）

A.氢氯噻嗪　　B.普奈洛尔

C.卡托普利　　D.地尔硫卓

E.硝苯地平

48.高血病第三期的脑部表现有　　（　BC　）

A.一过性脑缺血　　B.脑出血

C.高血压脑病　　D.株网膜下腔出血

E.脑血栓形成

49.可致左室向心性肥厚的病变有　　（　AD　）

A.主动脉瓣狭窄　　B.肥厚型心肌病

C.扩张型心肌病　　D.高血压性心脏病

E.限制型心肌病

50.近年来哪些药物也被列为第一线降压药物　　（　）

A.利尿剂　　B.β 受体阻滞剂

C.钙拮抗剂　　D.转化酶抑制剂

E.α 受体阻滞剂

51.高血压脑病的治疗，降低颅内压的药物有　　（　）

A.硝酸甘油　　B.地西泮

C.20%甘露醇　　D.呋塞米

E.心得安

52. 下列哪项符合临界高血压的诊断标准：　　（　AC　）

A. SBP=142mmHg，DBP=80mmHg　B. SBP=169mmHg，DBP=80mmHg　C. SBP=140mmHg，DBP=92mmHg　D. SBP=136mmHg，DBP=84mmHg　E. SBP=164mmHg，DBP=96mmHg

53. 在高血压病的发病过程中与交感神经兴奋有关的是哪项?　　（　BD　）

A. 垂体后叶血管加压素　　B. 肾上腺素

C. 醛固酮　　D. 去甲肾上腺素

E. 血管舒缓素

54. 血压增高持续多年后，对血管的影响常表现为：　　（　CE　）

A. 促进静脉栓塞的发生

B. 促进大动脉炎，导致无脉症

C. 促进大、中动脉粥样硬化

D. 促进血栓闭塞性脉管炎的发生

E. 促进全身细小动脉硬化

55. 按照 1979 年我国制订的标准，符合二期高血压病诊断条件的项目是：　（　CE　）

A. 眼底出血和渗出

B. 血清胆固醇、甘油三酯，β脂蛋白增高

C. 左心室肥大

D. 血压达到确诊高血压水平

E. 血浆肌酐浓度 5 ml / dl

56. 符合急进型高血压特点的有：　　（ BE　）

A. 血脂显著增高

B. 舒张压多持续在 17.3—18.6kPa(130—140mmHg)

C. 肾区有高音调的血管杂音

D. 多见于老年人

E. 视网膜病变和肾功能恶化进展迅速

57. 在高血压的鉴别诊断方面，下列哪项支持肾动脉狭窄的诊断?　　（　　）

A. 高血压呈缓进型

B. 使用利尿剂能取得较好降压效果

C. 上腹部或肾区有高音调血管杂音

D. 肾动脉造影有阳性发现

E. 女性多见，有肾区叩击痛

58. 心绞痛发作时的治疗措施包括　　（ AC　）

A. 立刻休息　　B. 立即送医院

C. 含化硝酸甘油　　D. 口服硝酸甘油

E. 立即吸氧

59. 心绞痛合并高血压的治疗用药有　　（ BC　）

A. 单硝酸异山梨酯　　B. 美托洛尔

C. 硝苯地平　　D. 双嘧达莫

E. 呋塞米

60. 心绞痛缓解期可用下列哪些药物预防发作?　　（　DE ）

A. 可待因　　B. 消炎痛

C.洋地黄　　D.心得安

E.二硝酸异山梨醇

61.在冠心病的治疗中，需强调下列哪些措施?　　（　BE　）

A.每天坚持长跑　　B.低脂、低热量饮食

C.每天摄取热量 3000 大卡

D.在监护室中监护 6 周

E.戒烟

62.下列哪些心绞痛不易为硝酸甘油缓解?　　（　AB　）

A.自发性心绞痛　　B.恶化型劳累性心绞痛

C.变异型心绞痛　　D.初发劳累性心绞痛

E.稳定型劳累性心绞痛

63.急性心肌梗死的先兆表现有　　（　AC　）

A.初发型心绞痛　　B.稳定型的心绞痛

C.恶化型心绞痛　　D.卧位型心绞痛

E.劳累性心绞痛

64.诊断急性心肌梗死特异性较高的血清酶有　　（　　）

A.ALT　　B.AST　　C.LDH

D.CPK—MB　　E.γ—GT

65　.急性心肌梗塞时心律失常的特点是：　　（　BD ）

A.病程第二周常见

B.室性心律失常最多见

C.不发生房室传导阻滞

D.室性早搏频发、多源性或成对出现

E.不发生心动过缓

66.无并发症的急性心肌梗塞，下列哪项正确?　　（　AE　）

A.完全卧床休息 2 周，护士帮助料理生活

B.完全卧床休息 8 周，护士帮助料理生活

C.卧床 2 周后即下床活动，减少血栓形成

D.冠心病监护室治疗，三天后回家治疗

E.卧床 2 周后可在床上活动，逐断增加活动量，至4 周方可下床

67.65 岁女性，以易疲乏为主诉入院，心率 45 次 / 分，心电图示：窦性心动过缓，运动负荷试验心率可增至 65 次 / 分。下列哪些药物能增加脉搏数?　　（　CE　）

A.心得安　　B.奎尼丁

C.阿托品　　D.普鲁卡因酰胺

E.异丙基肾上腺素

68.冠心病心电图缺血图型包括下列哪项?　　（　AC　）

A.以 R 波为主的导联中 T 波倒置

B.出现异常Q 波C.S—T

段水平型下移

D.出现房室或束支传导阻滞

E.出现各种早搏、心房颤动图型

69.典型心绞痛发作，最常见的疼痛部位是：　　（　BC　）

A.心尖部　　B.胸骨体上段的后方

C.胸骨体中段的后方　　D.上腹部
E.左或右前胸

70.下列哪些药物属于钙运转阻滞剂　　（　　）
A.潘生丁　　B.疏甲丙脯酸
C.异搏定　　D.硝苯吡啶
E.消心痛

71.急性心肌梗塞和急性心包炎的鉴别中，哪项支持后者的诊断?　　（　BD ）
A.胸痛
B.心电图多数导联ST 段弓背向下抬高
C.多数导联ST 段弓背向上抬高
D.无异常Q 波
E.有异常Q 波

72.对急性心肌梗塞患者采用的院外紧急措施中，哪项不恰当?　　（　　BD　）
A.可用镇痛剂及针刺止痛
B.心率 60 次/分者给予阿托品 0.5mg 肌注
C.有室性早搏者静注利多卡因 50—100mg
D.常规使用利多卡因肌注预防心律失常
E.发现心脏骤停立即给予胸外按压和人工呼吸，待病情稳定后护送医院治疗

73.病毒性心肌炎常见的心律失常是：　　（　　BD　　）
A.窦性心律不齐　　B.房室传导阻滞
C.交界性心律　　D.室性早搏
E.房性早搏

74.引起病毒性心肌炎最常见病毒是：　　（　　BE ）
A.腺病毒　　B.风疹病毒
C.腮腺炎病毒　　D.流感病毒
E.柯萨奇病毒

75.下列哪项符合急性病毒性心肌炎的诊断?　　（　AD　）
A.发病前有上呼吸道病毒感染症状及近期出现的心脏体征及异常心电图
B.血清抗体滴度 4 倍
C.有临床症状心电图改变持续一年以上
D.血清抗体滴度增高 4 倍以上
E.尚未排除已知的心血管疾病

双项选择答案

多项选择

1.慢性心衰亚急性调节时，下列哪些项起重要作用?　　（ AB　）
A.肾小球滤过率减少
B.肾内血流的重新分布
C.排钠激素的可能作用
D.肾素一血管紧张素一醛固酮系统兴奋
E.抗利尿激素分泌减少

2.左心室舒张期顺应性减少，可见于下列哪些情况?　　（　　BDE　　）
A.风湿性心肌炎　　B.缺血性心脏病
C.严重贫血　　D.高血压病

E.梗阻性心肌病

3.心律失常可诱发心衰的发生，常包括下列哪些项?　　（　ABCE　）

A.阵发性心动过速　　B.心房颤动

C.重度窦性心动过缓　　D.偶发性房性早搏或室性早搏

E.高度房室传导阻滞

4.　心肌病变引起的心肌收缩力减弱是慢性心功能不全的基本病因之一，常见于：（　ACE ）

A.继发于心肌梗塞的左心室壁运动异常

B.高血压病早期　　C.扩张性心肌病

D.慢性心包缩窄　　E.病毒性心肌炎

5.强心甙应用的相对禁忌症包括：　　（ B　 E　）

A.强心甙中毒

B.急性心肌梗塞最初 24 小时

C.单纯性重度二尖瓣狭窄

D.病态窦房结综合征

E.Ⅰ°房室传导阻滞

6.关于非甙类正性肌力药物多巴胺，下列哪些正确?　　（　 B　　）

A.是一种新的β肾上腺素能受体阻滞剂

B.对肾小动脉有扩张作用

C.用较小剂量静滴时可增加心排血量

D.用较大剂量可使外周阻力增加

E.用大剂量可使心率增快，但不增加心肌耗氧量

7.左心衰竭的体征是：　　（　 AB E　　）

A.心率快、第一心音减弱

B.肺动脉瓣区第二心音增强

C.心尖区收缩期吹风样杂音

D.两肺底部可闻及湿性罗音

E.交替脉出现

8.心衰治疗中血管扩张剂应用指征：　　（　ABDE　　）

A.急性心肌梗塞最初 24h 内并发左心衰

B.二尖瓣、主动脉瓣关闭不全所致的左心衰

C.低血容量性休克伴心动过速

D.肺毛细血管通透性增高致急性肺水肿

E.扩张型心肌病引起的难治性心衰

9.下列哪些情况应停用洋地黄?　　（　 ABC　）

A.室性早搏呈二联律

B.出现黄视

C.房性心动过速伴不完全性房室传导阻滞

D.室上性阵发性心动过速

E.心电图示ST 段斜形下移呈鱼钩状

10.应用血管扩张剂的指征有　　（　 A E ）

A.急性心肌梗塞并发急性左心衰和肺水肿

B.血容量不足

C.高血压性心脏病所致的肺水肿

D.难治性心衰　　E.高血压危象

11.洋地黄的毒性反应有：　　（　AB E　）

A.恶心、呕吐　　B.绿视

C.多源性室性早搏　　D.房室传导阻滞

E.非阵发性交界性心动过速

12.听诊心尖部第一心音强弱不等可见于　　（　　ABD　）

A.心房颤动　　B.室早三联律

C.一度房室传导阻滞　　D.莫氏Ⅱ型

E.预激综合征

13.关于阵发性室性心动过速，哪些是正确的描述　　（　ABCE　　）

A.房室分离　　B.心室夺获

C.心室融合搏动　　D.差异性心室内传导

E.利多卡团治疗

14.房颤的治疗，不宜试行转复的情况包括　　（　　AB E　　）

A.合并完全性房室传导阻滞

B.合并病态窦房结综合征

C.持续 3 年以上　　D.合并重度心力衰竭

E.有长期反复发作房速病史者

15　.房室传导阻滞的治疗药物包括　　（　A　　）

A.异丙肾上腺素　　B.阿拉明

C.阿托品　　D.糖皮质激素

E.可拉明

16.关于房颤的叙述，正确的有　　（　　AB E　）

A.常见于风湿性心脏病　　B.易致房内血栓形成

C.控制心室率可用毛花甙💔💔注

D.阵发性房颤可用胺碘酮转复

E.脉搏短拙

17.阵发性室上性心动过速发作期治疗措施包括　　（　AB　　）

A.压迫眼球　　B.普奈洛尔

C.同步直流电转复　　D.射频消融术

E.首选利多卡因静注

18.心脏猝死的危险因素有　　（　ABE　　）

A.不伴急性心肌梗死的原发性室颤患者

B.伴室性心动过速的冠心病患者

C.急性心肌梗塞后 6 个月内，有重度心力衰竭

D.Q—T 间期延长伴晕厥史E.

急性心肌梗塞伴多源室早

19.可以导致心脏骤停的非心源性因素有　　（　　BE　）

A.电——机械分离　　B.高血钾

C.洋地黄中毒　　D.青霉素过敏反应

E.呼吸停止

20.关于心脏骤停的先兆，相关因素有　　（　　ABDE　）

A.频发室早　　B.R on T 室早

C.短阵房速　　D.Q—T 间期显著延长

E.成对室早

21.开胸心脏挤压术的适应症有　　（　　ABE　　）

A.胸廓畸形　　B.心肌破裂

C.胸部挤压伤　　D.手术过程中心脏骤停

E.人工瓣膜置换术后

22.终止心肺复苏的指征包括　　（　　ABC　　）

A.深度意识丧失　　B.无自主呼吸

C.瞳孔散大固定 30 分钟以上

D.连续复苏,　　分钟而心电图无心电活动

E.血压测不到

23.防治脑缺氧和脑水肿的措施包括　　（　　ABE　　）

A.控制过度换气　　B.冬眠降温

C.利尿　　D.脱水

E.高压氧疗

24.与风湿性心肌炎有关的临床表现包括　　（　　AB　　）

A.心动过速与体温升高不成比例

B.钟摆律或胎心律

C.儿童充血性心力衰竭

D.过早搏动

E.心包摩擦音

25　.风湿性全心炎时，可有下列哪些体征出现　　（　ABE　）

A.心率 130 次 / 分　　B.舒张期奔马律

C.心尖部舒张中期杂音　　D.心包摩擦音

E.过早搏动

26.风湿热时，心电图可有哪些表现　　（　ABE　　）

A.心动过速　　B.过早搏动

C.P—R 间期延长　　D.ST 段弓背向下抬高

E.Q—T 间期延长

27.诊断风湿热常需与哪些鉴别?　　（　ABE　）

A.类风湿性关节炎　　B.结核变态反应性关节炎

C.系统性红斑狼疮　　D.病毒性心肌炎

E.亚急性感染性心内膜炎

28.以下哪项阿斯匹林可作为首选?　　（　ACE)

A.风湿性关节炎　　B.风湿性心脏炎

C.环形红斑　　D.舞蹈病

E.风湿性关节炎伴环形红斑

29.一风心病患者合并严重心衰肝肿大瘀血，为判断其有无风湿活动，应检查哪项?

（　B　　E　）

A.血沉　　B.“C”反应蛋白

C.粘蛋白　　D.ASO

E.白细胞计数分类

30.下列哪项符合风湿热 Jones 标准?　　（　BCE　）

A.心脏炎+发热+C 反应蛋白阳性

B.心脏炎+环形红斑+ASO 滴度升高

C.多发性关节炎+血沉增快+ASO 升高+发热

D.心脏炎+多发性关节炎+血沉增快

E.风心病患者发热+环形红斑+ASO 升高

31.为使风湿热复发率减少应采取下列哪些措施? （ ABCE ）

A.防寒保暖、避免潮湿

B.去除链球菌感染灶

C.每 2—4 周肌注长效青霉素

D.使用肾上腺糖皮质激素

E.急性咽炎时即时给予治疗量青霉素

32.风湿性心肌炎时心电图表现： （ ABE ）

A.P—R 间期延长 B.ST 段下移

C.T 波低平、倒置 D.Q—T 间期延长

E.房室传导阻滞

33.风湿性炎症较少侵犯的是： （ E ）

A.皮肤 B.中枢神经系统

C.肺 D.肾

E.胸膜

34.风湿性心肌炎时听诊可闻及： （ B ）

A.第一心音增强 B.舒张期奔马律

C.心尖部全收缩期杂音 D.心脏早搏

E.胸膜摩擦音

35.下列哪项符合风湿性心包炎? （ ABE ）

A.心前区疼痛 B.心包摩擦音

C.心包渗液 D.ASO 滴度升高E.

心电图 S—T 段呈弓背向下的抬高

36.下列哪项符合风湿热舞蹈病表现? （ BDE)

A.多见于男性青年

B.四肢不自主、不协调无目的快速运动

C.皮疹中心肤色正常、不痒

D.经数周后消退，消退后不遗留痕迹

E.可在原部位反复出现

38.心尖部舒张期杂音，可见于哪些情况 （ B E ）

A.左房室瓣关闭不全 B.左房粘液瘤

C.主动脉瓣关闭不全 D.扩张型心肌病

E.左房室瓣狭窄

39.心尖部收缩期杂音，下列相关的有 （ B E ）

A.左房室瓣狭窄 B.左房室瓣脱垂综合征

C.高血压性心脏病 D.贫血性心脏病

E.左房室瓣关闭不全

40.关于主动脉瓣关闭不全的体征，下列正确的有 （ A E ）

A.胸骨左缘第三、四肋间舒张期杂音

B.Carey—Coombs 杂音

C.Austin—Flint 杂音

D.Duroziez 双重杂音

E.周围血管征

41.关于主动脉瓣狭窄的症状，正确的有　　（　ABE　）

A.呼吸困难　　B.晕厥

C.心绞痛　　D.黑蒙

E.猝死

42.左房室瓣分离术的适应症有　　（　AB　）

A.单纯左房室瓣狭窄　　B.心功能二级或三级

C.年龄 20 至 5 0 岁　　D.半年内无风湿活动

E.明显瓣膜返流

43.以下哪些与风湿性二尖瓣狭窄符合?　　（　ABE　）

A.阵发性夜间呼吸困难　　B.咳嗽、咯血

C.声音嘶哑　　D.吞咽困难

E.肝肿大、压痛和腹水

44.单纯二尖瓣狭窄的 X 线表现：　　（　A　）

A.左心房增大、后前位可见双重阴影

B.左心房和左心室增大

C.肺动脉段突出、心腰消失

D.右心室增大

E.后前位心脏呈靴形改变

45.风心病主动脉瓣狭窄可有：　　（　BCE　）

A.水冲脉　　B.脉压小

C.头晕、晕厥　　D.头颈部搏动感

E.主动脉瓣区收缩期杂音伴震颤

46.以下哪些属主动脉瓣关闭不全表现?　　（　ADE　）

A.毛细血管搏动现象　　B.平脉

C.胸骨右缘 2 肋间响亮、粗糙、喷射性收缩期杂音

D.X 线示心脏呈靴形增大

E.超声心动示左室增大，主动脉瓣关闭时呈双线

47.二尖瓣狭窄合并主动脉瓣关闭不全时下列哪些不符合?　　（　BDE　）

A.左侧位可闻舒张期隆隆样杂音，仰卧位时不能听到

B.胸骨右缘 2 肋间响亮粗糙收缩期杂音

C.颈动脉搏动显著，心尖搏动向左下移位，未发现周围血管征

D.心尖搏动向左下移位，主动脉瓣区第二心音亢进

E.超声心动图示左心房后壁有较深C 凹

48.符合风湿性二尖瓣狭窄诊断标准的是：　　（　ACE　）

A.心尖区听到舒张中晚期隆隆样杂音，左侧卧位时明显

B.心尖区间歇性出现舒张期隆隆样杂音，随体位而改变

C.左心房增大　　D.左房、左室增大

E.既往有风湿热病史

49.风心病的并发症有　　（ ABE　）

A.呼吸道感染　　B.心律失常

C.栓塞　　D.心力衰竭

E.亚急性感染性心内膜炎

5 0.二尖瓣分离术的禁忌症有　　（　BDE　）

A.二尖瓣狭窄隔膜型有肺瘀血及右室大

B.风湿活动控制已满三个月

C.单纯二尖瓣狭窄出现大咯血，经内科治疗无效

D.亚急性感染性心内膜炎治愈已三个月

E.二尖瓣狭窄伴中度以上关闭不全

51.风湿性二尖瓣关闭不全诊断条件：　　（　AC　）

A.心尖区出现响亮粗糙的全收缩期杂音

B.心尖区舒张期隆隆样杂音，于收缩期前增强

C.心尖区第一心音减弱或消失

D.左心房及左心室增大

E.左心房及右心室增大

52.符合风湿性主动脉瓣狭窄的是：　　（　AD　）

A.胸骨右缘 2 肋间响亮粗糙收缩期杂音

B.胸骨左缘 2 肋间高调吹风样舒张早期杂音

C.胸骨右缘 2 肋间第二心音亢进

D.胸骨右缘 2 肋间第二心音减弱

E.左心室增大

53.下列哪项符合特发性肥厚性主动脉瓣下狭窄　　（　BCE　）

A.胸骨右缘 2 肋间响亮粗糙收缩期杂音

B.胸骨左缘 3、4 肋间收缩期杂音

C.心脏杂音不向颈部传导

D.超声心动图示收缩时主动脉瓣径减少，瓣膜增厚

E.超声心动图示室间隔与左室后壁之比 1.3∶1

54.关于亚急性感染性心内膜炎下列哪项正确　　（　ABD　）

A.二尖瓣关闭不全病变早期多见

B.主动脉瓣关闭不全早期病变多见

C.二尖瓣关闭不全晚期病变多见

D.二尖瓣狭窄少见

E.主动脉瓣狭窄早期多见

55 .风心病合并栓塞下列哪项正确　　（　ABCE　）

A.常见于二尖瓣狭窄伴心房颤动

B.栓子来自左心房　　C.栓子来自右心房

D.以四肢动脉栓塞最多见

E.血栓阻塞二尖瓣口可发生晕厥

56.老年人高血压的特点有　　（　B　）

A.多为单纯舒张期高血压　　B.血压波动大

C.易有体位性低血压　　D.易发生心力衰竭

E.易有意识障碍

57.诊断高血压病需排除的症状性高血压包括　（　ABE　）

A.慢性肾炎 B.嗜铬细胞瘤

C.原发性醛固酮增多症　　D.皮质醇增多综合征

E.肾动脉狭窄

58.高血压合并左心衰宜选用哪些药物 （ ABCE ）

A.利尿剂　　B.α 受体阻滞剂
C.转化酶抑制剂　　D.β 受体阻滞剂
E.硝普钠

59.高血压病第三期的并发症包括　　（　AE　）
A.高血压脑病　　B.左心室肥大
C.肾功能衰竭　　D.视神经乳头水肿
E.脑出血

60.高血压急症的治疗用药有　　（　ABCE ）
A.呋塞米　　B.硝酸甘油
C.硝普钠　　D.卡托普利
E.甘露醇

61.高血压心脏病的诊断条件有：　　（　ABE　）
A.年龄在 40 岁以上　　B.有五年以上高血压病史
C.血压超过 26.6 / 16kPa(200 / 120mmHg)
D.有心绞痛病史　　E.左心室增大

62.下列哪项与高血压有关?　　（　ABCE　）
A.脑出血　　B.急性心肌梗塞
C.肾功能减退　　D.左房粘液瘤
E.视神经乳头水肿

63.以下哪项可见于高血压病?　　（　ABE　）
A.蛋白尿、红细胞及管型尿
B.尿比重降低、尿素氮增高
C.心电图示左室肥大或兼有劳损
D.血浆肾素活性增高
E.血浆肾素活性正常

64.高血压患者，突然心悸气短、咯粉红色泡沫痰、血压为26.6 / 16.5kPa(200 / 124mmHg)、心率 136 次 / 分，除其它治疗外，还需用：　　（　ABC　）
A.西地兰　　B.速尿
C.硝普钠　　D.肼苯哒嗪
E.异丙基肾上腺素

65 .高血压病发病危险因素可有：　　（　ABDE　）
A.长期精神紧张，缺少体力活动
B.有高血压家族史　　C.长期高钾、低钠饮食
D.长期低钾高钠钦食　　E.体重超重

66.高血压病发病机理可能涉及：　　（　ABE　）
A.大脑皮质兴奋与抑制过程失调
B.血管收缩神经冲动占优势
C.脏器缺血、特别是肾缺血
D.肾素～血管紧张素～醛固酮分泌增加
E.去甲肾上腺素分泌增多

67.持续高血压使脏器供血减少、负荷加重而发生病变常见于：　　（　ABE　）
A.心脏　　B.肾脏　　C.肝脏　　D.脾脏　　E.脑

68.下列哪项与高血压脑病有关?　　（　AB　）
A.血压呈缓进型表现，但常突然发病

B.血压显著升高常超过 26.6 / 16kPa(200 / 120mmHg)

C.剧烈头痛、眩晕、恶心、呕吐

D.癫痫样抽搐

E.脑细小动脉严重而持久痉挛所致，而与颅内压增高无关

69.下列哪些与高血压性心脏病有关?　　（　BE　）

A.血压升高使左室前负荷增加导致心肌肥厚

B.可无症状出现

C.可出现左心衰竭

D.有 5 年以上高血压病史

E.客观检查显示左心室增大

70.下列哪项符合高血压病肾脏表现?　　（　ABC　）

A.可无明显泌尿系统症状

B.肾功能减退时可有多尿、夜尿

C.可有蛋白尿、血尿、随血压下降而好转

D.常伴有贫血、水肿明显

E.血压水平和肾功能以及尿中阳性发现无关

71.下列哪项与嗜铬细胞瘤有关?　　（ ABDE　）

A.常为急进型高血压表现

B.血压升高时有剧烈头痛、心悸、大汗

C.注射苄胺唑啉后血压明显升高

D.断层摄片可发现肿瘤

E.高血压表现为阵发性也可呈持续性

72.高血压病坚持长期治疗的好处是：　　（　BE)

A.可以使高血压病得到根治

B.可以推迟动脉硬化过程

C.减少急性脑血管病的发生

D.降低病死率

E.可以使已肥厚的心肌逆转

73.高血压病的一般治疗包括：　　（　AE　）

A.保证足够的睡眠　　B.坚持长期休息

C.低钠、低胆固醇饮食

D.肥胖者应控制食量和总热量摄入

E.适当减轻体重

74.哪些高血压病人应服降压药?　　（　AE　）

A.DBP13.3kPa(100mmHg)而无症状者

B.DBP 正常，但近期内SBP 波动于 18.6～19.9 kPa(140～150mmHg)

C.糖尿病患者DBP 在 12～13.3kPa(90～100mmHg)

D.高脂血症者DBP 在 12～13.3kPa(90～100mmHg)

E.血压持续 22.6 / 12kPa(170 / 90mmHg)

75 .下列哪些属于交感神经末梢抑制药?　　（　B　）

A.甲基多巴　　B.利血平

C.降压灵　　D.胍乙啶

E.长压定

76.下列哪些属血管舒张药?　　（　ACE　）

A.肼苯哒嗪　　B.心得安
C.二氮嗪　　D.胍乙啶
E.硝普钠

77.下列哪些不属钙运转阻滞剂?　　（　　ACE　　）
A.心得安　　B.异搏定
C.哌唑嗪　　D.硝苯吡啶
E.疏甲丙脯酸

78.高血压病的降压治疗哪项符合治疗目标?　　（　　ABE　　）
A.无并发症者血压可降至正常水平
B.年轻患者可使血压降至略低水平
C.年老患者可使血压降至稍高水平
D.已有心脑肾并发症者血压不宜下降过低
E.已有肾功能不全者血压降至 19.9／13.3～22.6／14.7kPa(150／100～170／110mmHg)为宜

79.高血压病合并急性左心衰宜用：　　（　　E　　）
A.心得安　　B.肼苯哒嗪
C.速尿　　D.硝普钠
E.阿方那特

80.　高血压病合并脑血管病者宜用：　　（　　BDE　　）
A.胍乙啶　　B.甲基多巴
C.口服利血平　　D.硝苯吡啶
E.尼莫地平

81.高血压合并肾功能不全时宜用：　　（　　ABDE　　）
A.速尿　　B.长压定
C.胍乙啶　　D.甲基多巴
E.可乐宁

82.关于典型心绞痛，下列正确的有　　（　　ABDE　　）
A.突发胸骨中段后憋闷感　　B.饱餐后诱发
C.持续 30 分钟　　D.休息后缓解
E.向左上肢放射

83.下列哪些药物用于抗心绞痛治疗　　（　　ABCE　　）
A.长效硝酸甘油制剂　　B.阿替洛尔
C.地尔硫卓　　D.氢氯噻嗪
E.硝苯地平

84.关于冠心病心绞痛，下列哪项正确　　（　　B　　）
A.乳酸脱氢酶高于正常两倍以上
B.血脂增高
C.平静心电图可正常
D.冠状动脉造影至少有一主支管腔狭窄 7 %
E.白细胞计数升高，血沉增快

85.对顽固性心绞痛可考虑用　　（　　ABE　　）
A.低分子右旋糖酐　　B.β受体阻滞剂
C.硝苯吡啶　　D.中医药治疗
E.冠状动脉旁路手术

86.关于急性心肌梗死心电图的进行性演变，下列正确的有　　（　A　E　）

A.起病数小时内出现高耸 T 波

B.急性期ST 段弓背向下抬高

C.Q 波出现后大多永久存在D.

陈旧期T 波倒置可永久存在

E.ST 段抬高后渐回至基线

87.下壁心肌梗死心电图演变的相关导联有　　（　　B　　）

A.Ⅰ　　B.Ⅱ　　C.Ⅲ　　D.aVF　　E.aVL

88.符合急性心肌梗塞表现的是：　　（　　A　　）

A.胸痛呈压榨“频死感”，持续 1～2 h 或数天

B.用硝酸甘油可以缓解

C.疼痛部位常涉及整个心前区或上腹部

D.常伴有大汗、恶心、呕吐

E.安静心电图多为正常

89.急性心肌梗塞发生心源性休克时可出现下列哪项　　（ ABC　　）

A.收缩压小于 12kPa(90mmHg)

B.原有高血压者收缩压较原有水平下降10.6kPa(80mmHg)以上

C.随血压下降出现，四肢厥冷多汗、脉细弱而快

D.尿量小于 30 毫升 / 小时

E.疼痛使血压降低，给予吗啡止痛后血压即回升

90.病毒性心肌炎时，应用糖皮质激素的适应症有　　（　　BE　）

A.发病 10 日内　　B.严重心力衰竭

C.心源性休克　　D.高度房室传导阻滞

E.严重全身毒血症状

多项选择答案

1.AB　　2.BDE　　3.ABCE　　4.ACE

5.BE　6.B　　7.AB　　E　8.ABDE9.ABC　　10.AE

11.ABE　12.ABD13.ABCE　14.ABE　15.A

16.ABE17.AB　　18.AB　　E　19.BE　20.ABDE

21.ABE　22.ABC　23.AB　　E　24.AB　25.ABE

26.ABE　27.AB　　E　28.ACE29.BE　30.BCE

31.ABCE　32.ABE33.　E　34.B　　35.ABE

36.BDE37.ACE　38.B　　E　39.B　　E　40.AE

41.AB　　E　42.AB　　43.ABE　44.A　45 .BCE

46.ADE　47.BDE　48.ACE49.ABE　50.BDE

51.AC　52.AD53.BCE　54.ABD　55 .ABCE

56.B　57.AB　　E 5 8.ABCE　59.AE　60.ABCE

61.ABE　62.ABCE　63.ABE　64.ABC65 .ABDE

66.ABE　67.ABE　68.AB　69.B　　E 70.ABC

71.ABDE　72.BE73.AE 74.AE　75 .B

76.ACE77.ACE 78.ABE　79.　E　80.BDE

81.ABDE　82.ABDE　83.ABCE　84.B　85.ABE

86.AE　87.B　　88.A　89.ABC　90.BE

内分泌系统疾病　代谢疾病

双项选择

1.甲状腺功能亢进时甲状腺肿大表现为　　（　　AC　　）

A.一般为轻、中度弥漫性对称性肿大，质软，表面光滑B.局限性肿大，质地较硬

C.在腺体部位两侧可扪及震颤和听到血管杂音

D.弥漫性肿大、质地硬、表面不平

E.可触及结节性肿块

2.甲状腺功能亢进症的手术治疗适应证为　　（ BC　）

A.所有甲亢患者均可采用手术治疗

B.甲状腺肿大明显且压迫附近器官者

C.经抗甲状腺药物治疗无效或停药后复发者

D.甲亢患者妊娠期

E.甲亢患者有恶性突眼时

双项选择答案

1.AC　　2.BC

多项选择

1.甲状腺功能亢进症在心血管系统的临床表现是　　（　AB　　）

A.心动过速，休息和睡眠时也快，不易为一般药物所缓解

B.脉压差增大而出现周围血管征

C.心律失常，以早搏、阵发性心动过速、房颤较常见

D.心脏扩大，心功能不全

E.周围循环衰竭

2.甲状腺功能亢进症因高代谢状态的临床表现有　　（　　ABE　　）

A.怕热喜凉　　B.全身皮肤温暖潮湿、多汗

C.食欲亢进、体重减轻　　D.慢性甲亢性肌病

E.骨质疏松脱钙

3.甲状腺功能亢进症良性突眼的表现是　　（　　B　　）

A.畏光、灼痛、眼内有异物感

B.眼裂增宽，少眨，凝视，两眼聚合欠佳

C.眼下看时上眼睑不能及时随眼球下落

D.眼上看时前额皮肤不能皱起

E.严重时可致失明

4.关于三碘甲状腺原氨酸的解释，正确的是　　（　ACE ）

A.三碘甲状腺原氨酸(T3)的血清浓度较甲状腺素(T4)低得多，但其生理作用却较T4 强数倍

B.T3 与T4 的生理作用无差异

C.T4 主要是通过转换成T3 而发挥生理作用

D.T4 是诊断甲亢的灵敏指标

E.T3 是诊断甲亢的灵敏指标

5.甲状腺功能亢进症经抗甲状腺药治疗后，下列哪些情况可以逐步减少药物剂量

(AB　　)

A.症状基本消失

B.心率 80 次/分左右

C.体重增至接近标准体重

D.T3、T4 测定正常E.

基础代谢率＞15 %

6.甲状腺危象时，其特殊处理是　　（　E　）

A.降低体温，纠正水、电解质紊乱

B.针对心功能不全、感染、休克等合并症，作相应处理

C.口服或静滴碘剂以抑制甲状腺素的释放

D.口服较大剂量他巴唑以抑制甲状腺素的合成

E.用利血平等以降低组织对甲状腺激素的反应

7.糖尿病酮症酸中毒治疗，下列哪些是正确的　　（　ABE　）

A.治疗开始先给生理盐水静滴

B.原则上采用小剂量胰岛素

C.当动脉血PH＜7.1 或二氧化碳结合力＜22 容积/分升时应补碱

D.谨慎补钾

E.经过补钾 2～3 日后，血钾仍低者，要考虑补镁

8.胰岛素治疗的适应证是　　（　ABE　）

A.胰岛素依赖型糖尿病

B.非胰岛素依赖型糖尿病经饮食和口服降糖药治疗未能良好控制时

C.糖尿病者妊娠及分娩时

D.糖尿病人需行大手术的前后

E.并发酮症酸中毒，感染，结核病

多项选择答案

1.AB　　2.ABE　　3.B　　4.ACE

5.AB　　6. E　　7.ABE　　8.ABE

判断：200/3

循环系统疾病

1.左心衰时，臂至肺循环时间延长，右心衰对臂至舌循环时间延长。　　（　×　）

2.心脏的工作效能可用心搏量或心排血量来代表。　　（　√　）

3.在心衰的慢性调节过程中，心室肌肥厚除肌纤维增粗外，肌纤维数、细胞核、毛细血管数也有绝对的增加。　　（　√　）

4.肝脏压痛、肝颈静脉回流征阳性是右心衰较早期的表现,长期右心衰导致心源性肝硬化时，以上二体征则更加明显。　　（　×　）

5.在心衰的急性调节过程中，通过心脏迷走神经兴奋可使心率减慢，从而缓解心悸症状。　　（　×　）

6.慢性心衰以左心衰开始较多见，以后继发肺动脉高压导致右心衰，单纯的右心衰较少见。（　√　）

7.右心衰时X 线检查示右心大或全心增大，也常有左心衰所致的淤血表现。　　（　√　）

8.治疗慢性心衰时采用扩张周围小静脉药以减轻心脏排血时的阻抗。　　（　×　）

9.对急性肺水肿晚期休克患者的治疗，除采取坐位、两腿下垂以减少静脉回流外，还应给予吗啡皮下注射和速尿静注。　　（　×　）

10.急性肺水肿可出现粉红色泡沫痰。　　（　√　）

11.硝酸甘油主要作用于小动脉。　　（　×　）

12.洋地黄中毒出现频发室早可首选苯妥英钠。　　（　√　）

13.每个窦性心搏后出现两个早搏称为三联律。　　（　×　）

14.室性过早搏动代偿间歇多不完全。　　（　×　）

15. 阵发性室上性心动过速的治疗可选用升压药。　　（　　√　）
16. 严重的三度房室传导阻滞可发生心源性脑缺氧综合征。　　（　　√　）
17. 二度Ⅱ型房室传导阻滞又叫文氏现象。　　（　　×　）
18. WHO 将 6 小内发生的非创伤性、不能预期的突然死亡，称为猝死。　　（　　√　）
19. 脑循环完全终止仅 2 分即可发生不可逆损害。　　（　　×　）
20. 风湿性心肌炎患者在心尖部听到 2 级收缩期杂音，于风湿热控制后，此杂音可消失。（　　√　）
21. 根据 1965 年修订的 Jones 诊断风湿热标准，当患者有两个主要表现或一个主要表现，再加上临床和实验室中的两项次要表现时，即可诊断为风湿热。　　（　　×　）
22. 在风湿热的病理过程中，瘢痕形成主要限于心内膜和心肌，而关节和心包病变以增殖性为主。　　（　　×　）
23. 反复出现皮下结节，多见于严重风湿性心脏炎患者。　　（　　√　）
24. 风湿性心内膜炎主动脉瓣受侵时，胸骨左缘第 3　肋间可听到高调短促的舒张期杂音，此杂音多在心内膜炎症停止后完全消失。　　（　　×　）
25. 一发热患者，ASO 及 ASK 均有滴度增高时可肯定为风湿活动。　　（　　×　）
26. 风湿性心脏炎患者宜绝对卧床休息，如无明显心脏炎，在活动期也应卧床休息。（　　√　）
27. 为预防风湿活动发作，去除链球菌感染灶，对反复感染的扁桃体，一经发现，应立即摘除。　　（　　×　）
28.　为预防风湿活动发作，去除链球菌感染灶，对反复感染的扁桃体，一经发现，应立即摘除。　　（　　×　）
29. 风湿热是与 A 族乙型溶血型链球菌有关的感染性疾病。　　（　　×　）
30. 风湿性关节炎可首选阿司匹林治疗。　　（　　√　）
31. 风心病二尖瓣狭窄时最早期的血流动力学改变是左室压力增高。　　（　　×　）
32. 风心病二尖瓣狭窄咯血都是因肺瘀血所致。　　（　　×　）
33. 二尖瓣关闭不全也可有右心衰竭的症状，但急性肺水肿、咯血等较二尖瓣狭窄为少。（　　√　）
34. 主动脉瓣关闭不全和狭窄的心电图表现均可能出现左心室肥大劳损和心室内传导阻滞。（　　√　）
35. 二尖瓣狭窄合并主动脉瓣关闭不全时舒张期杂音可以减轻，周围血管征可以不明显。（　　√　）
36. 栓塞最常见于二尖瓣关闭不全。　　（　　×　）
37. 风湿性主动脉瓣狭窄大部分同时合并关闭不全或二尖瓣病变。　　（　　√　）
38. Austin-Flint 杂音可见于二尖瓣狭窄，Graham-Steell 杂音多见于主动脉瓣关闭不全。（　　×　）
39. 先天性主动脉瓣狭窄，常无风湿热病史，很小年龄即有本病征象，杂音随年龄的增长而增强。　　（　　√　）
40. 主动脉瓣区第二心音减弱可见于主动脉瓣狭窄或关闭不全。　　（　　√　）
41. 高血压动脉粥样硬化主动脉瓣关闭不全，多见于60 岁以上，主动脉瓣区第二心音减弱。（　　×　）
42. 左房室瓣开放拍击音表示左房室瓣弹性及活动度良好。　　（　　√　）
43. Graham-Steell 杂音提示相对性肺动脉瓣关闭不全。　　（　　√　）
44. 左房室瓣狭窄超声心动图“城垛样改变”提示前后叶逆向运动。　　（　　×　）
45. 周围血管征主要见于主动脉瓣狭窄患者。　　（　　×　）

46. 主动脉瓣狭窄时，左室呈对称性、向心性肥厚。　　（　　√　）
47. 关于高血压发病机理，一般认为高级神经功能障碍在发病中占主导地位，体液、内分泌因素，肾脏等也参与发病过程。　　（　　√　）
48. 缓进型高血压病患者多有头晕、头痛、耳鸣、眼花、失眠、乏力等症状，其轻重与血压增高程度相一致。　　（　　×　）
49. 缓进型高血压病如并发主动脉粥样硬化时，舒张压增高显著。　　（　　×　）
50. 高血压病并发心肌梗塞后，血压可降至正常，并可能从此不再升高。　　（　　√　）
51. 高血压可促进冠状动脉粥样硬化，引起缺血性心脏病。　　（　　√　）
52. 急进型高血压病经治疗后，病情亦可转稳定而呈缓进型经过。　　（　　√　）
53. 少部分缓进型高血压病患者，在病程的某一阶段可转变为急进型。　　（　　√　）
54. 急进型高血压病的死因，最常见的是心力衰竭。　　（　　×　）
55. 凡血压持续增高达到高血压标准即可诊断为高血压病。　　（　　×　）
56. 急进型高血压以视网膜病变和肾功能很快衰竭为特点。　　（　　√　）
57. 老年人高血压多为单纯舒张期高血压。　　（　　×　）
58. 高血压危象迅速降压治疗首选硝普钠。　　（　　√　）
59. 缺血性心脏病心绞痛发生的病理基础是冠状动脉粥样硬化所致的管腔狭窄。（　　√　）
60. 部分急性心肌梗塞患者在起病前有先兆症状。其中最常见的是稳定型心绞痛变为不稳定型心绞痛。　　（　　√　）
61. 不典型心绞痛可能是胸痛部位和性质的不典型，也无其它特点是典型的。　　（　　×　）
62. 血脂增高、血糖增高可作为冠心病重要诊断依据。　　（　　×　）
63. 硝酸酯类治疗心绞痛时，对已狭窄和硬化的冠状动脉均有明显扩张作用。　　（　　×　）
64. 无痛性急性心肌梗塞多见于老年、糖尿病、或神志不清者。　　（　　√　）
65. 变异型心绞痛发作时 ST 段抬高。　　（　　√　）
66. 心绞痛发作时首选硝酸甘油口服。　　（　　×　）
67. 治疗变异型心绞痛以β受体阻滞剂的疗效最好。　　（　　×　）
68. 急性心肌梗塞时，CPK 出现最早，持续时间最长。　　（　　×　）
69. 急性心肌梗塞心肌再灌注的时机在发病 6 小时以内。　　（　　√　）
70. 荧光免疫检查是一种诊断病毒性心肌炎的特异性检查方法，可代替病毒分离。（　×　）
71. 在慢性心肌炎与原发性心肌病的鉴别中，若无急性病毒性心肌炎病史，则二者不容易鉴别。　　（　　√　）
72. 急性病毒性心肌炎所致的心律失常中以早搏和房室传导阻滞最为常见。　　（　　√　）
73. 病毒性心肌炎出现严重心力衰竭宜使用糖皮质激素。　　（　　√　）

内分泌系统疾病　代谢疾病

1. 空腹血糖测定是诊断糖尿病的主要依据　　（　　×　　）
2. 空腹血糖测定是判断糖尿病的病情控制良好与否的唯一指标　　（　　×　）
3. 胰岛素是目前治疗糖尿病的最重要的药物。　　（　　√　）
4. 糖尿病病人经胰岛素治疗，病情控制良好后即可随意进食。　　（　　×　）
5. 酮症酸中毒是糖尿病唯一的严重急性并发症。　　（　　×　）
6. 糖尿病失明的主要原因是视网膜微血管病变。　　（　　√　）
7. 肾性糖尿多因肾小管重吸收功能低下，肾糖阈降低所致。其血糖及糖耐量均正常。（　　√　）
8. 磺脲类降糖药能增进细胞对葡萄糖的利用及抑制糖元异生、肠壁细胞对葡萄糖的吸收而降

低血糖。　　（　×　）
9.他巴唑等抗甲状腺药因阻止甲状腺激素释放而发挥治疗甲亢作用。　　（　×　）
10.甲状腺功能亢进症者，在其甲状腺部位两则可扪及震颤和听到血管杂音，是由于腺体内血管扩张、增生，血流充沛所致。　　（　√　）
11.血清总甲状腺素测定是诊断甲亢的灵敏指标。　　（　×　）
12.甲状腺功能亢进症者的心悸、心动过速于入睡后常减慢。　　（　×　）
13.临床上可根据晨醒后卧床时的(脉率+脉压差)-111 来粗略估计基础代谢率。　　（　√）
14.典型甲状腺功能亢进症的临床表现主要为交感神经兴奋性增高和高代谢状态的表现。　　（　×　）
15.^{131}Ⅰ放射治疗甲亢时释放α射线，使甲状腺滤泡上皮细胞受到破坏而减少甲状腺激素的合成。　　（　×　）
16.甲状腺危象的处理首选丙基硫氧嘧啶。　　（　√　）
17.甲状腺手术适用于良性突眼甲亢者。　　（　×　）
18.药物治疗甲亢疗程一般在 1 年半到 2 年半之间。　　（　√　）
19.甲状腺具有非选择性吸收及浓集无机碘的功能。　　（　×　）
20.甲状腺危象死亡的主要原因是心力衰竭、高热虚脱、肺水肿。　　（　√　）

循环系统疾病

1.慢性心衰的基本病因包括原发性心肌收缩力减弱　，　___、　心脏负荷过重　___和心室舒张期充盈受限。
2.心功能不全的主要代偿调节机制包括　交感神经兴奋___、　水钠潴留　___和　心肌肥厚___。
3.左心衰竭的呼吸困难的表现形式包括　劳力性呼吸困难___、　端坐呼吸　___和　夜间阵发性呼吸困难___。
4.在无左房室瓣狭窄或肺部疾病时，以　___表示左心室前负荷，此值增高提示左心室功能不全。
5 .慢性心衰的治疗主要包括两方面　减轻心脏负荷___和　增强心肌收缩力___。
6.心肌病变引起的心肌收缩力减弱可见于　冠心病___、　心肌炎___、　扩张型心肌病___、　心肌浸润型病变___等。
7.左室舒张期顺应性减低见于　高血压心肌肥厚___、　冠心病心肌缺血___、　肥厚型心肌病___等引起的心室肥厚的疾病中。
8.约有半数慢性心功能不全患者的心衰可由各种诱发因素引起，它们是：感染　___、严重心律失常___、　体力劳动与情绪激动　___、肺栓塞，　___、出血与贫血　___、　电解质与酸碱平衡紊乱　___、　药物　___等。
9.通过抑制心肌功能而诱发心力衰竭的常见药物种类是：　___、　___、　___等。
10.使用强心甙治疗心衰时，一般分为两个步骤，即先给予　负荷 ,____量，获效后仍需每天给予　维持,　___量，以维持疗效。
11.指出下列症状是由左心衰抑或右心衰引起：呼吸困难　左　___心衰；尿少　右____心衰；消化不良、恶心呕吐💔 _____心衰；咳嗽咯血💔 _____心衰；下垂性凹陷性水　右___心衰；咯粉红色泡沫痰 左____心衰；紫绀　左右___心衰。
12.左心衰竭主要是由于左心排血量降低使 肺____淤血及　重要脏器___供血不足引起。
13.近年提出诊断早期心衰和隐性心衰的一项重要检查方法是　血流动力学检查___。
14.需与心衰相鉴别的主要症状和体征是　呼吸困难____、 肝脏肿大___和　水肿___。
15 .在心衰的亚急性调节过程中使代偿期转为失代偿期是由于　静脉压 ,____、　心肌氧耗

量,_____和 后负荷,____增加超过一定限度。
16. 急性左心衰竭的典型表现是　　急性肺水肿,_____，右心衰的典型体征为　下垂性凹陷性水肿,_____。
17. 急性肺水肿的主要诊断依据是：有引起急性左心衰的病因，突发呼吸困难,_____、 粉红色泡沫痰,_____、两肺满布湿罗音,_____等表现。
18. 心律失常按发作时心率的快慢分为两大类：　　快速性,_____和　缓慢性,_____。
19. 心律失常的诊断主要依靠　心电图____。
20. 过早搏动根据早搏起源部位的不同分为　　房性,____、房室交界性____和　室性,　　____。其中以室性早搏____最为常见。
21. 主动性异位心搏与心律的发生机制可分为　异位起搏点自律性增高,_____、折返激动,_____和　触发活动,_____。
22. 急性心肌梗塞出现室早，首选药物是　　利多卡因,_____。
23. 室上性心动过速是指　　房性　____和 交界性心动过速____。
24. 心室融合搏动由　心室夺获_____和　　室性异位冲动_____几乎同时激动心室形成。
25. 阵发性室性心动过速的首选治疗药物是利多卡因　　____。
26. 房颤的临床表现是心律绝对不规则____、第一心音强弱不一_____和脉搏短绌　　____。
27. 心脏骤停按心电图表现分为 3 种类型：心室颤动____、缓慢而无效的心室自身节律　　____和心脏停顿　　。
28. 心脏骤停____或心跳呼吸停止____是临床死亡的标志。
29. 心脏骤停最可靠而出现较早的临床征象是意识突然丧失_____伴大动脉搏动消失____。
30. 建立人工有效循环包括畅通气道,_____、人工呼吸,_____和 人工胸外按压,_____三步曲。
31. 心肺复苏时，人工呼吸的频率是每分钟　16～20_____次，胸外心脏按压的频率是　80～100____次/分。
32. 心室颤动的处理，首选非同步直流电击除颤_____方法。
33. 风湿热是一种与　族乙型溶血性链球菌,_____感染有关的自身免疫性疾病，反复发作后常易导致慢性风湿性心脏病,　　____病。
34. 链球菌菌体及其代谢产物具有高度抗原性，其中以细胞壁上的　　M 蛋白,_____和多糖,____最重要。
35 .风湿热的病理过程分 3 期：变质渗出期,_____、 增生期,　　____和瘢痕期,_____。　阿绍夫小体,_____是病理确诊风湿病的依据。关节和心包以　渗出,_____病变为主；瘢痕,_____病变形成主要限于心内膜和心肌。
36. 心包炎是严重心脏炎的标志，其最重要的体征是 心包摩擦音,_____。
37. 风湿性关节炎的特点有　多发性____、 游走性,_____、大关节,_____和不留畸形,_____。
38. 风湿热初次发作的主要表现有　　心肌炎,_____、 多发性关节炎，　　____、 舞蹈症,____、 边缘性红斑,_____和　皮下结节,_____。
39. 风湿热出现心脏炎，应选用　　糖皮质激素____药物治疗。
40. 已患风湿热者，长期使用　　苄星青霉素____药物预防复发。
41. 风湿热的主要病变是　　全身结缔组织非细菌性炎症____。
42. 风湿热最常侵犯的瓣膜是　　左房室瓣，　____，其次是　主动脉瓣，　____。
43. 风湿热的治疗原则是 消除炎症,____、保护心脏,　　____、控制风湿活动,_____、预防风湿复发,____、防止形成慢性心瓣膜病,_____。
44. 类风湿关节炎的临床特点是多数不侵犯　　心脏,　　____,无,　　溶血性链球菌　____感染为其前驱，常侵犯小,_____关节，并遗留,_____畸形。
45 .风湿热最主要的临床表现是　心脏炎,_____，包括 心肌炎,____和 心内膜炎,_____、 心

包炎,_。其中以 前两者最重要。
46. 风湿性心肌炎可有下列一种或多种表现： 窦性心动过速,___ 、 心脏扩大, __ 、 心音改变, 、心脏杂音, 、心律失常, 、 心衰, 。
47. 风湿热皮肤表现有 边缘性红斑 和 皮下结节, 。
48. 风湿炎症偶可侵犯 胸膜,__ 、肺,___ 、腹膜,___ 、肾,___ 等引起相应症状。大、中型动脉炎可致无脉症, , 如侵犯大脑中动脉时可引起偏瘫, 。
49. 系统性红斑狼疮面部常有.蝶形红斑,_ 伴 肝,__ 肾,__ 等脏器损害， 白__ 细胞少，血液、骨髓涂片可找到 狼疮,__ 细胞， 抗核,__ 抗体阳性和血清补体C3 下降为其特点。
50.左房室瓣狭窄的病理改变分为两型：隔膜型 和漏斗型, 。
51. 左房室瓣狭窄最常见的症状是 呼吸困难, , 最重要的体征是 心尖区舒张期杂音, ___, 其心脏浊音界呈 梨形,_。
52. 存在 左房室瓣区舒张中晚期隆隆样杂音, ___和左房大,_____证据即可诊断为左房室瓣狭窄。
53. 存在 心尖区全收缩期杂音,_____伴 左房、左室增大,_____, 可诊断为左房室瓣关闭不全。
54. 根据 主动脉瓣第二听诊区舒张期杂音,_____、 左室增大, ___及 周围血管征, ___, 可诊断为主动脉瓣关闭不全。
55. 联合瓣膜病最常见的组合形式是 主动脉瓣病变___并发, 左房室瓣病变___。
56. 风心病常见的并发症包括 心力衰竭,_____、心律失常,_____、栓塞,_____、 亚急性感染性心内膜炎,____和 肺部感染, ___。
57. 风心病手术治疗的方法有 瓣膜分离术, ___、 人工瓣膜替换术 ___和 经皮气囊瓣膜成形术 , ___。
58. 左房室瓣狭窄的主要症状有 呼吸困难 , ___、 咯血 , ___、 咳嗽 ___和压迫症状 ,_____。
59. X 线检查，左房室瓣狭窄呈 梨形,_____心影。主动脉瓣关闭不全呈 靴形, ___心影。
60. 显著的主动脉瓣关闭不全产生的周围血管体征包括： 动脉舒张压降低和脉压增宽 , ___、 水冲脉 , ___、 毛细血管搏动 , ___、 动脉枪击音, ___。
61. 风湿性二尖瓣关闭不全的主要病理改变 瓣膜增厚 , ___、 瓣膜缩短 , ___、 腱索粘连缩短 D , ___。
62. 二尖瓣狭窄时由于左心房压力增高，出现 左心房 , ___扩张肥厚，以后肺动脉压逐渐上升最后可导致 右心室, ___肥厚、扩张。
63. 二尖瓣狭窄超声心动图示前叶活动曲线 双峰 , ___峰(舒张期)消失呈 , 城垛_型，前、后叶呈 同向 , ___运动。
64. 风湿性二尖瓣关闭不全时于心尖区可听到响亮、粗糙，音调 .较高, ___、时限较长 , ___的 , 全收缩 , ___期 吹风 , ___样杂音，常向 左腋下或背部 ___传导。
65 .二尖瓣脱垂可由多种疾病引起，较常见者 , 缺血性心脏病 , ___、 风湿性心瓣膜炎 , ___等。
66. 功能性收缩期杂音可见于 高热 , ___、 重度贫血 , ___、 甲亢 , ___等。
67. 二尖瓣脱垂可在心尖区出现收缩中、晚期 喀喇音 ,_____，伴有 收缩晚期 , ____递型杂音。
68. 二尖瓣狭窄合并关闭不全 ___或 联合瓣膜病变者, ___，在适当病例可作人工瓣膜置换术。
69. 原发性高血压病发生的继发性脏器改变以 脑 , ___、 心 ,____和 肾 ,____最为重要。

70. 急进型高血压以　　视网膜病变,_____和　　肾功能很快衰竭,　　____为特点,　肾脏,____损害最为显著，最后多因　　尿毒症____而死亡。

71. 当舒张压　71.12.1～12.5kPa____或收缩压　18.8～21.2kPa____时，称为临界高血压。

72. 老年人高血压的心电图特点是　　单纯收缩期高血压,_____、　血压波动大,_____、　易有体位性低血压,_____和　易有心力衰竭____。

73. 高血压的标准是收缩压　21.3kPa ,_____和(或)舒张压　12.7kPa____。

74. 高血压病的标准是　血压达高血压标准,　____和 排除症状性高血压____。

75 .高血压病第三期指血压达到确诊高血压水平，并有下列一项者：　脑出血或高血压脑病,____、　左心衰竭,　____、　　肾功能衰竭,____和　眼底出血或视神经乳头水肿____。

76. 需与高血压病鉴别的症状性高血压包括 肾实质性疾病,_____、肾血管性高血压,　　____、嗜铬细胞瘤,_____、　原发性醛固酮增多症,_____和 库欣综合征____。

77. 高血压病合并冠心病者宜选用　β 受体阻滞剂,　____、钙拮抗剂,　　____和　　,　　转化酶抑制剂____降压药物。

78. 高血压急症的主要临床类型有　高血压危象,　____、高血压脑病,_____和　急进型高血压____。

79. 血压持续升高可引起　全身细小,_____动脉硬化，并可影响　大中,　____动脉内膜的脂质沉着，促进　动脉粥样硬化____。

80. 高血压病后期常并发急性脑血管病，包括1)　出血性,　____疾病；2)　缺血性____疾病。

81. 高血压脑病的发病原因为　　脑小动脉严重而持久痉挛,_____使脑血液循环障碍，引起脑水肿颅内压____增高所致。

82. 世界卫生组织根据缺血性心脏病的临床特点分为以下　,　大类型:　原发性心脏骤停,____、 心绞痛,_____、 心肌梗死,_____、 缺血性心脏病中的心力衰竭,　____和 心律失常____。

83. 典型心绞痛的发作部位在　　胸骨体上段或中段的后方 ,　____，持续时间一般为3～5 分钟____。

84. 参照 WHO 的缺血性心脏病的分类法，将心绞痛分为两大类:　劳累性心绞痛,　____和自发性心绞痛____。

85. 不稳定型心绞痛是,初发劳累性心绞痛　____、恶化型劳累性心绞痛____和自发性心绞痛,____的统称。

86. 心绞痛发作时，心电图的特征性表现为　　相关导致 ST 段下移或 T 波倒置____。

87. 心绞痛发作时应立刻休息，首选药物是　硝酸甘油,　____，给药途径是 舌下含____。

88. 心绞痛缓解期的治疗药物有　硝酸盐类,_____、β 受体阻滞剂,_____、钙离子拮抗剂,_____和 血小板聚集抑制剂____四类。

89. 不典型心绞痛是指疼痛部位不典型可在上腹部,_____、左或右前胸,_____、颈,_____、下颌或牙齿____；疼痛性质不典型表现为烧灼感、闷胀感等。

90. 典型心绞痛的胸痛特点是:　　常有诱因，突发胸骨体上段或中段的后方疼痛,　　____、压迫、憋闷或紧缩样,_____、一般持续 3～ 5 分钟,_____、休息或含服硝酸甘油迅速缓解____。

91. 典型心绞痛发作的诱因有　　劳累,　____、　　情绪激动,　____、　受寒，饱餐。

92. 典型心绞痛发作历时短暂常为　3～5 分钟,____分钟，很少超过　1 分钟____分钟。

93. 劳累性心绞痛可分为三型：(1)　稳定型,_____、(2) 初发型,____、恶化型____。

94. 变异型心绞痛的心电图特点是　发作时 ST 段抬高____。

95. 心肌梗死的发生，主要有三个方面:　　冠脉迅速闭塞,_____、心排血量骤降,_____和　左心室负荷剧增____。

96. 心肌梗死常见的冠脉闭塞部位依次为　左前降支,____、右冠脉,_____和左回旋支____。

97. 急性心肌梗死最常见的先兆表现有：恶化型,_____和 初发型劳累性心绞痛_____。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/945112101124011141