

2024 年福建省芗城区《执业药师之西药学专业二》考试王牌题库【夺分金卷】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 肝癌晚期患者疼痛剧烈，可以选用的镇痛药物是

- A: 哌替啶
- B: 可待因
- C: 布桂嗪
- D: 阿司匹林

答案：A

2. 糖尿病患者低血糖时，可导致患者不适甚至生命危险，也是血糖达标的主要障碍。为了预防低血糖事件的发生，应用胰岛素或促胰岛素分泌剂时，需要注意的事项不包括

- A: 谨慎地调整剂量
- B: 有可能误餐时应提前做好准备
- C: 患者应定时定量进餐
- D: 个体化给药，直接给予所需治疗剂量

答案：D

3. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。

医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次/日。

A: 化疗所致的恶心、呕吐

- B: 功能性消化不良
- C: 糖尿病胃轻瘫
- D: 胃食管反流病

答案：A

4. 下列药物与甲氧氯普胺合用，可增加锥体外系不良反应风险的是

- A: 金刚烷胺
- B: 干扰素
- C: 奥司他韦
- D: 阿昔洛韦

答案：A

5. 戈那瑞林属于

- A: 雌激素类
- B: 短效口服避孕药
- C: 促性腺激素
- D: 促性腺激素释放激素类似物

答案：D

6. 胰岛素依赖型重症糖尿病需

- A: 西格列汀
- B: 胰岛素皮下注射
- C: 阿卡波糖
- D: 吡格列酮

答案：B

7. (2016 年真题) 可升高红细胞，用于肾性或非肾性贫血的药品是

- A: 重组人促红素

B: 人血白蛋白

C: 硫酸亚铁

D: 维生素 B12

答案：A

8. 氨基苷类通过下列哪种屏障比较容易

A: 胎盘屏障

B: 血脑屏障

C: 血睾屏障

D: 黏液屏障

答案：A

9. 与卡比马唑合用应谨慎的是

A: 丙硫氧嘧啶

B: 糖皮质激素

C: 放射性碘

D: 甲状腺素

答案：C

10. 外用糖皮质激素作用强度的比较，正确的是()。

A: 卤米松>地塞米松>氟轻松

B: 地塞米松>卤米松>氟轻松

C: 地塞米松>氟轻松>卤米松

D: 卤米松>氟轻松>地塞米松

答案：D

11. 渗透到异常细胞的药量比正常细胞多的药物

A: 异维 A 酸

B: 阿达帕林

C: 壬二酸

D: 维 A 酸

答案: C

12. 地西泮用于

A: 慢性脑功能不全

B: 神经源性尿崩症

C: 特发性震颤

D: 早期帕金森病

答案: C

13. 容易引起周围神经炎的抗结核药物是

A: 链霉素

B: 利福平

C: 乙胺丁醇

D: 异烟肼

答案: D

14. 华法林应用过量可选用的拮抗药是

A: 鱼精蛋白

B: 氨基己酸

C: 葡萄糖酸钙

D: 维生素 K1

答案: D

15. 30 岁，农民，头昏乏力，粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L。诊断：钩虫感染，缺铁性贫血。

- A: 对胃酸缺乏者，宜与稀盐酸并用，有利于铁剂的解离
- B: 注意预防铁负荷过重
- C: 选择适宜的病期、疗程和监测
- D: 尽量选择三价铁

答案：D

16. 以下关于过氧苯甲酰的描述中，不正确的是

- A: 可杀灭痤疮丙酸杆菌
- B: 为强还原剂，极易分解
- C: 可分解出新生态氧而发挥作用
- D: 可导致皮肤干燥，脱屑

答案：B

17. 关于第一、二、三、四代头孢菌素类抗菌药物药理作用的叙述，错误的是

- A: 第一代头孢菌素对青霉素酶稳定，但可被革兰阴性菌产生的 β -内酰胺酶所破坏
- B: 第三代头孢菌素对革兰阴性菌有较强的抗菌作用，但对 β -内酰胺酶不稳定
- C: 第二代头孢菌素对铜绿假单胞菌无效，对多种 β -内酰胺酶较稳定
- D: 第四代头孢菌素对革兰阳性菌、革兰阴性菌、厌氧菌显示广谱抗菌活性

答案：B

18. 患者，女，56岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式（控制饮食，增强运动）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片治疗。

- A: 2~4mg

B: 10~15mg

C: 20~40mg

D: 5~10mg

答案：C

19. 渗透性泻药()

A: 硫酸镁

B: 甘油

C: 地芬诺酯

D: 乳果糖

答案：D

20. 异丙托溴铵属于

A: M 胆碱受体阻断剂

B: β 肾上腺素受体激动剂

C: 白三烯调节剂

D: 黄嘌呤类药物

答案：A

21. 与奥美拉唑、甲硝唑三联治疗幽门螺杆菌感染的是

A: 红霉素

B: 万古霉素

C: 罗红霉素

D: 克拉霉素

答案：D

22. 硫脲类的严重不良反应是

A: 关节痛

- B: 药疹、瘙痒
- C: 粒细胞缺乏症
- D: 甲状腺肿大

答案：C

23. 属于维生素 K 类抗出血药的是

- A: 酚磺乙胺
- B: 氨甲环酸
- C: 艾曲泊帕乙醇胺
- D: 甲苯氢醌

答案：D

24. 属于 α 受体激动剂，缓解鼻黏膜充血肿胀的药物是

- A: 麻黄碱
- B: 酮替芬
- C: 过氧化氢
- D: 克罗米通

答案：A

25. 精神紧张、情绪恐惧所致的失眠

- A: 夸西泮
- B: 氯美扎酮
- C: 氟西泮
- D: 谷维素

答案：B

26. 以肝细胞膜损害为主的急慢性肝炎患者，宜使用的药物是

- A: 还原型谷胱甘肽

B: 多烯磷脂酸胆碱

C: 葡醛内酯

D: 甘草酸二铵

答案：B

27. 选择性抑制 COX-2 的是

A: 塞来昔布

B: 对乙酰氨基酚

C: 吲哚美辛

D: 阿司匹林

答案：A

28. 属于抗雄激素类，首选用于晚期前列腺癌的药物是

A: 甲羟孕酮

B: 乙烯雌酚

C: 他莫昔芬

D: 氟他胺

答案：D

29. 耳底、耳塞、耳内流黄水等症可选用

A: 9%硼酸冰片滴耳液

B: 曲伏前列素

C: 四环素

D: 1%碘甘油

答案：A

30. 下列关于氯化钾注射液的描述，正确的是()

A: 严禁肌肉注射和直接静脉注射，仅可静脉滴注

- B: 可以肌肉注射，禁止直接静脉注射
- C: 可以肌肉注射，也可以直接静脉注射
- D: 禁止肌肉注射，可以直接静脉注射

答案：A

31. 氨基糖苷类抗生素对哪类细菌无效

- A: 结核杆菌
- B: 厌氧菌
- C: 铜绿假单胞菌
- D: 革兰阴性菌

答案：B

32. 可作为气道痉挛的应急缓解药物的长效 β 受体激动剂是

- A: 福莫特罗
- B: 沙美特罗
- C: 沙丁胺醇
- D: 丙卡特罗

答案：A

33. 可用于缓解绝经后更年期症状的药品是()。

- A: 地屈孕酮
- B: 依普黄酮
- C: 他莫昔芬
- D: 戊酸雌二醇

答案：D

34. 下列药动学/药效学 (PK/PD) 参数中，适用于浓度依赖型抗菌药物的评估指标

- A: 血浆药时曲线下面积与血浆达峰时间比值 (AUC/T_{max})
- B: 血浆药物峰浓度与达峰时间比值 (C_{max}/T_{max})
- C: 血浆药物峰浓度与最低抑菌浓度比值 (C_{max}/MIC)
- D: 血浆药物半衰期 (t_{1/2})

答案: C

35. 可单独或联合用于以胆固醇升高为主的患者，特别适合作为不能耐受他汀治疗者的替代，用于原发性高胆固醇血症、纯合子家族性高胆固醇血症、纯合子谷甾醇血症的是

- A: 依折麦布
- B: 阿昔莫司
- C: 非诺贝特
- D: 烟酸

答案: A

36. 在体外无抗凝作用，在体内有抗凝作用的是

- A: 噻氯匹定
- B: 肝素
- C: 华法林
- D: 尿激酶

答案: C

37. 主要作用于有丝分裂 M 期，干扰微管蛋白合成的药物是

- A: 多柔比星
- B: 氟尿嘧啶
- C: 顺铂
- D: 高三尖杉酯碱

答案: D

38. 患者,女,55 岁诊断为“甲癣”宜使用的药物是

- A: 氟康唑
- B: 氟胞嘧啶
- C: 特比萘芬
- D: 卡泊芬净

答案: C

39. 多柔比星与肝素、头孢菌素等同用()

- A: 增加心脏毒性
- B: 导致坏死性结肠炎
- C: 易产生沉淀
- D: 增加肝毒性

答案: C

40. 属于第四代头孢菌素的药物是

- A: 头孢克洛
- B: 头孢噻肟
- C: 头孢吡肟
- D: 头孢拉定

答案: C

41. 下列不属于糖皮质激素的药理作用的是

- A: 抗炎作用
- B: 抗菌作用
- C: 抗毒作用
- D: 免疫抑制

答案: B

42. 有减轻体重作用的口服降糖药是

- A: 吡格列酮
- B: 格列苯脲
- C: 达格列净
- D: 那格列奈

答案：C

43. (2019 年真题) β -内酰胺酶抑制剂的抑酶活性由强到弱的顺序是
()

- A: 他唑巴坦>克拉维酸>舒巴坦
- B: 舒巴坦>克拉维酸>他唑巴坦
- C: 舒巴坦>他唑巴坦>克拉维酸
- D: 他唑巴坦>舒巴坦>克拉维酸

答案：A

44. 主要用于预防静脉血栓的口服药物是

- A: 华法林
- B: 链激酶
- C: 尿激酶
- D: 低分子肝素

答案：A

45. 糖皮质激素隔日疗法用于()

- A: 湿疹
- B: 抑制器官移植急性排斥危象
- C: 肾病综合征
- D: 变态反应性疾病

答案：C

46. 下列关于氟尿嘧啶的说法，错误的是()

- A: 应当先给予氟尿嘧啶，再用四氢叶酸
- B: 与四氢叶酸合用时，可降低其毒性，提高其疗效
- C: 与甲氨蝶呤合用，两者可产生协同作用
- D: 用药期间不宜饮酒或同用阿司匹林类药物

答案：A

47. 可调节表皮细胞有丝分裂和更新()

- A: 维 A 酸
- B: 过氧苯甲酰
- C: 阿达帕林
- D: 异维 A 酸

答案：A

48. 制成脂质体以降低药物肾毒性的抗真菌药是

- A: 卡泊芬净
- B: 两性霉素
- C: 氟胞嘧啶
- D: 阿糖胞苷

答案：B

49. 与奥美拉唑-替硝唑三联治疗胃溃疡的是

- A: 红霉素
- B: 克拉霉素
- C: 罗红霉素
- D: 克林霉素

答案：B

50. 通过促进或恢复凝血过程而止血的药物是

- A: 卡巴洛克
- B: 氨甲苯酸
- C: 氨基己酸
- D: 酚磺乙胺

答案：D

51. 属于二氢叶酸还原酶抑制剂的抗肿瘤药是

- A: 来曲唑
- B: 甲氨蝶呤
- C: 卡莫氟
- D: 羟喜树碱

答案：B

52. （2018 年真题）酪氨酸激酶抑制剂吉非替尼的特征性不良反应是（ ）

- A: 痤疮样皮疹
- B: 骨髓抑制
- C: 心肌损伤
- D: 血压升高

答案：A

53. 大剂量静脉给药时，可能出现可逆性黄疸的抗生素是()

- A: 磷霉素
- B: 小檗碱
- C: 利奈唑胺

D: 夫西地酸

答案: D

54. 下列对甲状腺素应用的表述，错误的是

A: 左甲状腺素是主要替代治疗药，一般需终身替代

B: 本类药起效迅速，24h 达血药浓度高峰

C: 成人初始剂量 25~50 μg ，一日 1 次

D: 可用于呆小病的治疗

答案: B

55. (2021 年真题) 属于阳离子型表面活性剂，可用于治疗咽喉炎的药物是 () e

A: 西地碘

B: 氨溴索

C: 羟甲唑啉

D: 度米芬

答案: D

56. 缓解轻、中度急性哮喘症状应首选

A: 沙美特罗

B: 孟鲁司特

C: 沙丁胺醇

D: 异丙托溴铵

答案: C

57. 对伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者，在服用镇咳药的同时，应及时联合应用的药品是

A: 泼尼松龙

- B: 多索茶碱
- C: 羧甲司坦
- D: 左氧氟沙星

答案：C

58. 某患者，63 岁，诊断为"慢性支气管炎急性发作"，痰培养为"铜绿假单胞菌"，下列哪种药物对铜绿假单胞菌无效()

- A: 头孢他啶
- B: 头孢克洛
- C: 哌拉西林
- D: 头孢哌酮

答案：B

59. 患者，女，60 岁。凌晨突发脚痛，查体尿酸水平偏高，临床诊断为高尿酸血症，医生处方秋水仙碱胶囊，塞来昔布胶囊，碳酸氢钠治疗。

- A: 抑制黄嘌呤氧化酶，阻滞尿酸的生成
- B: 抑制粒细胞浸润和白细胞趋化，减轻炎症症状
- C: 抑制肾小管对尿酸盐的重吸收，使尿酸排出增加
- D: 促进尿酸分解，将尿酸转化为溶解性好的尿囊素

答案：B

60. (2018 年真题) 患者，女，28 岁，因“多汗、心慌、消瘦、易怒半月余”就诊，实验室检查显示 FT4 和 FT3 均升高，TSH 降低，甲状腺 I 度肿大，心率 92 次/分，诊断为“甲状腺功能亢进症”简称甲亢”。给予甲巯咪唑片 10mg，一日 3 次盐酸普萘洛尔片 10mg，日 3 次。患者 1 月后复查，FT3 和 FT4 恢复正常，但出现膝关节疼痛。

- A: 不可停药妊娠，应手术切除甲状腺后再准备妊娠

- B: 妊娠期间应将甲状腺功能维持在正常下限
- C: 甲状腺激素水平恢复正常后即可停药准备妊娠
- D: 可以妊娠,选择适当的抗甲状腺药物以最小剂量维持

答案: D

61. 通过抑制 GABA 的降解或促进合成而达到抗癫痫作用的药物是

- A: 二苯并氮革类
- B: 乙内酰胺类
- C: γ -氨基丁酸类似物
- D: 脂肪酸类

答案: D

62. 严重肝病时应减量慎用、肾功能减退时可按原治疗量使用的是

- A: 氟胞嘧啶
- B: 青霉素
- C: 异烟肼
- D: 红霉素

答案: D

63. 抗菌活性强, 并对 β -内酰胺酶高度稳定, 属于碳青霉烯类的抗菌药物是()。

- A: 亚胺培南
- B: 头孢吡肟
- C: 氨曲南
- D: 头孢美唑

答案: A

64. 以下选项中, 不属于沙美特罗的适应证的是()

- A: 缓解支气管痉挛的急性症状
- B: 肺气肿伴气道痉挛的治疗
- C: 慢性支气管炎伴气道痉挛的治疗
- D: 夜间哮喘的预防和维持治疗

答案：A

65. (2015 年真题) 下列药品中，属于酰胺类的脑功能改善及抗记忆障碍主要是 ()。

- A: 利斯的明
- B: 多奈哌齐
- C: 吡拉西坦
- D: 胞磷胆碱

答案：C

66. 尼尔雌醇属于

- A: 雌激素
- B: 孕激素
- C: 雄激素
- D: 糖皮质激素

答案：A

67. 下列关于药物与抗痛风药的相互作用，错误的是

- A: 丙磺舒可促进肾小管对吡罗美辛的排出，使其血浆药物浓度降低而疗效减弱
- B: 别嘌醇与双香豆素同用时，抗凝血药的效应可加强
- C: 别嘌醇与呋塞米同用可降低其控制痛风和高尿酸血症的效力
- D: 秋水仙碱可降低口服抗凝血药、抗高血压药的作用

答案：A

68. (2019 年真题) 患者，男，67 岁，既往有癫痫病史。因感染性脑膜炎入院治疗，在脑脊液标本的病原学结果回报之前，可经验性选用的抗菌药物是 ()

- A: 亚胺培南西司他丁
- B: 头孢曲松
- C: 卡泊芬净
- D: 米诺环素

答案: B

69. 可能引起高铁血红蛋白血症的抗高血压药是

- A: 硝普钠
- B: 阿利克仑 (阿利吉仑)
- C: 阿托普利
- D: 氨氯地平

答案: A

70. 长期服用糖皮质激素不产生下列哪种副作用

- A: 满月脸
- B: 高血钾
- C: 溃疡或出血穿孔
- D: 骨质疏松

答案: B

71. (2019 年真题) 患者，女，36 岁，近期经常上腹灼烧痛、反酸，疼痛多出现在上午 10 点及下午 4 点，有时夜间痛醒，进食后缓解，X 线钡餐诊断为十二指肠溃疡，该患者宜使用的治疗药物是 ()

- A: 甲氧氯普胺

B: 多潘立酮

C: 奥美拉唑

D: 颠茄

答案: C

72. 可增高甲氨蝶呤血浆浓度的药物不包括

A: 氯霉素

B: 水杨酸类

C: 碳酸氢钠

D: 磺胺类

答案: C

73. 30 岁，农民，头昏乏力，粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L，诊断：钩虫感染，缺铁性贫血。

A: 输血+注射右旋糖酐铁

B: 驱钩虫

C: 驱钩虫+口服铁剂

D: 驱钩虫+注射右旋糖酐铁

答案: C

74. (2020 年真题) 关于维 A 酸软膏治疗痤疮的说法，错误的是

A: 使用初期可能出现皮肤干燥或脱屑，对紫外光敏感性增强，宜在睡前使用

B: 为了加强疗效，可以一日多次给药

C: 有明确的致畸性，妊娠期妇女禁用

D: 不宜用于皮肤皱褶部位

答案: B

75. 长期频繁使用可致眼部真菌感染

- A: 利巴韦林
- B: 四环素可的松
- C: 氯霉素
- D: 更昔洛韦

答案：B

76. (2020 年真题) 患者，女，26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺素(FT3、FT4)增高、促甲状腺素(TSH)降低，诊断为甲状腺功能亢进症。医师处方给予抗甲状腺药治疗。

- A: 特布他林
- B: 利多卡因
- C: 碘化钾
- D: 普萘洛尔

答案：D

77. 对视觉起作用的是

- A: 维生素 A
- B: 视黄酸
- C: 视黄醇
- D: 视黄醛

答案：D

78. 适用于重症哮喘、慢性反复发作哮喘、激素依赖性哮喘的是

- A: 孟鲁司特
- B: 沙丁胺醇
- C: 色甘酸钠

D: 吸入性糖皮质激素

答案：D

79. (2019 年真题) 某患儿因高烧就医，诊断为重症流感，医生对患儿进行治疗的同时，建议与患儿有密切接触的家属预防服用奥司他韦。

关于奥司他韦预防用药的说法，正确的是 ()

A: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 75mg

B: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日两次，每次 75mg

C: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 150mg

D: 应于密切接触流感患儿的 3 天以内预防服用，每日两次，每次 150mg

答案：A

80. (2016 年真题) 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

A: 餐后半小时

B: 餐后 1 小时

C: 餐时

D: 餐前半小时

答案：C

81. 易引起过敏性休克的药物是 ()

A: 磺胺嘧啶

B: 青霉素

C: 四环素

D: 链霉素

答案：B

82. (2019 年真题) 支气管哮喘急性发作时，宜使用的药物是 ()

- A: 沙美特罗氟替卡松粉吸入剂
- B: 沙丁胺醇气雾剂
- C: 吸入用布地奈德混悬液
- D: 孟鲁司特钠咀嚼片

答案: B

83. (2016 年真题) 军团菌和支原体混合感染宜首选的抗菌药物是

- A: 头孢他啶
- B: 头孢曲松
- C: 罗红霉素
- D: 利奈唑胺

答案: C

84. 下列关于过氧化氢的用法及注意事项，叙述错误的是

- A: 遇氧化物或还原物即迅速分解并产生泡沫
- B: 遇光稳定，不易变质
- C: 避免皮肤及黏膜接触高浓度溶液
- D: 妊娠及哺乳期妇女慎用

答案: B

85. (2019 年真题) 竞争性抑制胃肠道的 α -葡萄糖苷酶活性减慢肠道内多糖、寡糖或双糖的降解从而延缓单糖的吸收，可降低餐后血糖的药物是 ()

- A: 吡格列酮
- B: 格列吡嗪

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 伏格列波糖

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/945214240120012033>