

福建省建阳区 2024 年《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题真题（轻巧夺冠）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 以下治疗荨麻疹的抗过敏药中，属于过敏活性物质阻释剂的药物是

- A: 赛庚啶
- B: 酮替芬
- C: 异丙嗪
- D: 苯海拉明

答案：B

2. 患者女，80 岁高血压病史 28 年近日自觉憋气昨夜出现呼吸困难，不能平躺喘憋咳粉红色泡沫样痰诊断为心力衰竭应选用的药物是（）

- A: 氟桂利嗪
- B: 呋塞米
- C: 胺碘酮
- D: 硝酸异山梨酯

答案：B

3. 服用他汀类血脂调节药可能导致

- A: 血白细胞减少
- B: 血清血红蛋白升高
- C: 血清碱性磷酸酶升高
- D: 血清总胆固醇升高

答案：C

4. 具有心脏毒性，治疗期间每 3 个月进行一次心脏评估，且在治疗后每 6 个月重复一次，直至停止治疗后 24 个月的靶向药是

- A: 贝伐珠单抗
- B: 帕博利珠单抗
- C: 利妥昔单抗
- D: 曲妥珠单抗

答案：D

5. 适用于伴发膀胱过度活动症的良性前列腺增生症的是（）

- A: 非那雄胺
- B: 特拉唑嗪
- C: 米多君
- D: 奥昔布宁

答案：D

6. 亚胺培南

- A: 与氯霉素合用因竞争药物的结合位点而产生拮抗作用
- B: 与多种药物存在配伍禁忌，一般应单独给药
- C: 与呋塞米合用可加重肾功能损害
- D: 与丙戊酸钠合用可导致血药浓度过低而引发癫痫

答案：D

7. 以下治疗沙眼的药物中，属于处方药的是

- A: 2%硝酸银
- B: 红霉素眼膏
- C: 硫酸锌滴眼剂
- D: 酞丁安滴眼剂

答案：A

8. 下列药品中，新生儿局部应用过多可能导致中毒的是

- A: 滑石粉
- B: 硼酸
- C: 氧化锌
- D: 炉甘石

答案：B

9. 中危患者

- A: 立即使用抗高血压药物
- B: 立即进行抢救治疗
- C: 先观察（血压及危险因素）数周，然后决定是否进行药物治疗
- D: 观察相当一段时间，再决定是否进行药物治疗

答案：C

10. 患儿，男，6 个月，体重 9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有乒乓球感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

- A: 10000IU
- B: 400IU
- C: 4000IU
- D: 6000IU

答案：C

11. 细菌感染性腹泻患者宜选用

- A: 阿苯达唑
- B: 干酵母

C: 乳果糖

D: 小檗碱

答案: D

12. 分析以下用药错误的事例，属于"认知缺失"的是

A: 新手值班以及计算机医嘱系统缺陷

B: 医师非主观意愿的诊断错误、造成误诊误治

C: 患者自行选购药品、误用假药、劣药

D: 调剂工作过于繁忙

答案: B

13. 对于窦性心动过速，最宜选用

A: 利多卡因

B: 地高辛

C: 硝酸酯类

D: 普萘洛尔

答案: D

14. “发现并确认‘仙牛健骨颗粒’III期临床试验过程中连续发生严重不良事件，即暂停其新药试验”显示药物警戒的作用是

A: 发现药品质量问题

B: 药品上市后风险评估

C: 药品上市前风险评估

D: 发现与规避假、劣药品流入市场

答案: C

15. 患者，女，61岁，有痛风病史。间歇期服用别嘌醇、丙磺舒治疗时，又出现一次急性发作，此时应采取的治疗方法是

- A: 加大别嘌醇、丙磺舒剂量，加服秋水仙碱
- B: 减少别嘌醇、丙磺舒剂量，加服秋水仙碱
- C: 停用别嘌醇、丙磺舒，改用秋水仙碱
- D: 加大别嘌醇、丙磺舒剂量，加服对乙酰氨基酚

答案：B

16. 重症、急救治疗时，要求药物迅速起效，最不适宜选用的给药途径是

- A: 喷雾给药
- B: 腔道给药
- C: 静脉滴注
- D: 吸入给药

答案：B

17. 患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

- A: 肺动脉栓塞
- B: 支气管哮喘
- C: 急性左心衰竭
- D: 慢性支气管炎急性发作

答案：C

18. (痛风的不同分期的治疗原则)，哪个时期的治疗原则是应有效控制血尿酸浓度、排酸

- A: 发作间歇期
- B: 首次发作期
- C: 急性发作期

D: 痛风性肾病治疗期

答案：A

19. 可用红霉素的敏感性预测自身敏感性的药物是

A: 头孢洛林

B: 替考拉宁

C: 克拉霉素

D: 阿莫西林

答案：C

20. 患者，女，44 岁，半年前诊断为支气管哮喘，间断口服沙丁胺醇片 4mg tid 治疗，没有规律用药治疗。近日，因秋冬季节交替，出现明显喘憋、话不成句，被紧急送往医院。

A: 沙丁胺醇气雾剂

B: 布地奈德气雾剂

C: 沙丁胺醇片

D: 沙美特罗-氟替卡松干粉吸入剂

答案：A

21. 无并发症的普通感冒一般几天后可痊愈

A: 5~7 日

B: 2~3 日

C: 5~10 日

D: 3~4 日

答案：A

22. 轻度冻疮患者可以选用的非处方药是

A: 维 A 酸软膏

- B: 樟脑软膏
- C: 红霉素软膏
- D: 杆菌肽软膏

答案：B

23. 艾滋病抗病毒治疗强调须多种药物联合治疗，俗称”鸡尾酒疗法”，目前国内免费治疗的一线方案是（）

- A: 拉米夫定+替诺福韦+齐多夫定
- B: 替诺福韦+依非韦伦+雷特格韦
- C: 拉米夫定+司他夫定+奈韦拉平
- D: 齐多夫定+依非韦伦+利托那韦

答案：C

24. 用量化的方法表达治疗目的，不以货币为单位。该药物经济学评价方法是

- A: 成本-效益分析
- B: 成本-效用分析
- C: 最小成本分析
- D: 成本-效果分析

答案：D

25. 可用于治疗夜盲症的药物是

- A: 维生素 A
- B: 维生素
- C: 复合维生素 B
- D: 维生素 C

答案：A

26. 下列药物中属于弱阿片类药物的为（）

- A: 哌替啶
- B: 羟考酮
- C: 吗啡
- D: 可待因

答案：D

27. 真菌引起阴道炎（）

- A: 咪康唑
- B: 聚甲酚磺醛
- C: 甲硝唑
- D: 庆大霉素

答案：A

28. 人体健康参数：肥胖的腰围标准是

- A: 男性>95cm，女性>85cm
- B: 男性>90cm，女性>80cm
- C: 男性>85cm，女性>80cm
- D: 男性>90cm，女性>85cm

答案：D

29. 根据英国 Cochrane 中心联合循证医学和临床流行病学专家共同制定的循证医学证据分级标准，同质病例对照研究的系统评价在循证医学评价中的证据级别属于

- A: IIIa 级
- B: I a 级
- C: II a 级
- D: V 级

答案：A

30. 患者，男性，80 岁，患有帕金森病伴闭角型青光眼，近 2 个月出现尿频、尿急、夜尿增多，无法控制。诊断为急迫性尿失禁，给予米拉贝隆治疗。药师应告知患者药物的主要不良反应是

- A: 口干、便秘、尿潴留
- B: 卧位和坐位时高血压
- C: 直立性低血压
- D: 鼻咽炎和尿路感染

答案：D

31. 对于铁剂的使用，正确的为

- A: 为迅速纠正患者贫血症状，初始治疗用大剂量
- B: 碳酸氢钠抑制铁剂吸收
- C: 口服铁剂宜选用 3 价铁
- D: 待血红蛋白恢复正常后，即可停止服用

答案：B

32. 主要通过肝脏清除的药物的代谢速度和程度降低，是指

- A: 药物代谢
- B: 药物分布
- C: 药物排泄
- D: 药物吸收

答案：A

33. 表现为“牛肉样舌”的疾病为()

- A: 缺铁性贫血
- B: 白血病

C: 再生障碍性贫血

D: 巨幼细胞性贫血

答案：D

34. 脑梗死的分期，恢复期

A: 15 天

B: 2~3 个月

C: 1~6 个月

D: 1 个月内

答案：C

35. 导致老年男性下尿路症状最常见的原因是

A: 良性前列腺增生症

B: 肾盂肾炎

C: 前列腺炎

D: 膀胱炎

答案：A

36. (2016 年真题) 患者，女，35 岁，在不知怀孕的情况下服用诺氟沙星胶囊。经询问，获知其服药时间距末次月经时间是 20 天。该用药行为对胎儿可能造成的影响是 ()。

A: 腭裂

B: 流产或发育成正常胚胎

C: 骨骼发育异常

D: 牙齿色素沉着

答案：B

37. (2018 年真题) 患者,男,60 岁,因轻度冻疮(无破溃)到药店购药,药师应推荐的药品是 ()

- A: 利巴韦林软膏
- B: 10%樟脑软膏
- C: 特比萘芬乳膏
- D: 氢化可的松软膏

答案: B

38. 可用于香豆素类杀鼠药中毒药物是

- A: 碘解磷定
- B: 亚硝酸钠
- C: 维生素 K1
- D: 乙酰胺

答案: C

39. 药品通用名容易混淆的抗真菌药是

- A: 氟尿嘧啶
- B: 氟胞嘧啶
- C: 阿糖胞苷
- D: 阿糖腺苷

答案: B

40. 下列引起药源性疾病的事例中,其影响因素主要是"药物制剂因素"的是

- A: 输液中颗粒物引起肺部异物肉芽肿
- B: 排钾利尿药增加心脏对强心苷的敏感性
- C: 以 50%乙醇、抗组胺药、抗抑郁药可增强催眠药的作用
- D: 阿司匹林与华法林同服会增加出血风险

答案：A

41. 非霍奇金淋巴瘤的 CHOP 方案中不包括的治疗药物是

- A: 长春新碱
- B: 阿霉素
- C: 利妥昔单抗
- D: 环磷酰胺

答案：C

42. （2015 年真题）患者，女。62 岁，医师处方如下：

- A: 阿卡波糖
- B: 氯吡格雷
- C: 二甲双胍
- D: 氨氯地平

答案：B

43. “药师参与临床药物治疗，提供药学服务的重要方式和途径”的工作是

- A: 静脉药物配置
- B: 处方调剂
- C: 参与临床药物治疗
- D: 治疗药物监测

答案：D

44. 药品外观质量检查时，下列哪种药品需要进行澄明度检查

- A: 糖浆剂
- B: 注射剂
- C: 口服液

D: 片剂

答案: B

45. I 期临床试验

A: 以目标适应证患者为给药对象

B: 以健康志愿者为给药对象

C: 以患者为给药对象

D: 以特殊人群为给药对象

答案: B

46. 患者，男，23 岁，近日出现大便有鲜血、便后出血自行停止、肛门有坠胀感，无感染症状，诊断为痔疮。可用于患者的治疗药物是

A: 10%樟脑软膏

B: 复方甲硝唑栓

C: 地塞米松软膏

D: 复方片仔癀软膏

答案: D

47. 患者，女，65 岁，诊断为房性心律失常，给予胺碘酮治疗。近日，因胃溃疡开始用西咪替丁，出现窦性心动过缓症状。

A: 胺碘酮与西咪替丁竞争 CYP2D6，减慢胺碘酮的代谢

B: 西咪替丁抑制 CYP1A2，升高胺碘酮血浆药物浓度

C: 西咪替丁抑制 CYP3A4，升高胺碘酮血浆药物浓度

D: 西咪替丁诱导 CYP2C9，升高胺碘酮血浆药物浓度

答案: C

48. 餐后 1~2h 服用的是

A: 解痉、镇痛药

B: 质子泵抑制剂

C: 胃黏膜保护剂

D: 抗酸药

答案：D

49. 治疗病毒性腹泻宜选用的药物是

A: 泛昔洛韦

B: 庆大霉素

C: 山莨菪碱

D: 双歧杆菌

答案：A

50. 同时使用 2 种药物，药物不良事件的发生率为

A: 0.72

B: 0.13

C: 0.58

D: 0.38

答案：B

51. 容易引湿的药物是

A: 阿朴吗啡、水杨酸钠

B: 胃蛋白酶

C: 牛痘菌苗

D: 青霉素类、头孢菌素类

答案：B

52. 血糖正常、尿葡萄糖阳性可以提示患者可能

A: 伴活动性指端肥大症

- B: 伴心肌梗死
- C: 伴肾性肾小球肾炎
- D: 伴甲状腺功能亢进

答案：C

53. 心律失常患者用药治疗期间应该禁用的是

- A: 烟
- B: 食醋
- C: 酒
- D: 浓茶

答案：D

54. 不宜选静滴 5%碳酸氢钠注射液、碱化尿液的情况是是

- A: 异戊巴比妥中毒
- B: 司可巴比妥中毒
- C: 苯巴比妥中毒
- D: 苯妥英钠中毒

答案：A

55. 用前摇匀，尽量将痰液咳出、口内的食物咽下，含激素类制剂用后以温水漱口

- A: 阴道栓剂
- B: 泡腾片
- C: 气雾剂
- D: 膜剂

答案：C

56. 绝经激素治疗的基本原则错误的是

- A: 对有子宫的妇女，补充雌激素的同时必须加上孕激素
- B: 治疗窗口为绝经 5 年之内或 50 岁之前
- C: 选择能达到治疗目的的最低有效剂量
- D: 药物选择个体化，剂量个体化

答案：B

57. 以下引起药源性疾病的影响因素中，主要是药物相互作用的是

- A: 二甘醇是"亮菌甲素"事件的祸首
- B: 着色胶囊剂引起固定性药疹
- C: 服用阿司匹林引起哮喘、慢性荨麻疹
- D: 同服氟西汀与华法林的患者呈现牙龈出血

答案：D

58. 不良反应有恶心、呕吐、心律失常、血压下降及多尿等，个体差异大，应进行血药浓度监测的药物是

- A: 沙丁胺醇气雾剂
- B: 异丙托溴铵气雾剂
- C: 茶碱片
- D: 孟鲁司特钠咀嚼片

答案：C

59. 用药后有可能出现球后视神经炎的抗结核药物是

- A: 乙胺丁醇
- B: 利福平
- C: 吡嗪酰胺
- D: 链霉素

答案：A

60. 尿酸减少提示

- A: 肾小管重吸收障碍
- B: 痛风
- C: 核蛋白代谢增强
- D: 肾功能不全

答案：D

61. 可引起口渴、头晕的是

- A: 阿米洛利
- B: 东莨菪碱
- C: 右美沙芬
- D: 抗过敏药

答案：A

62. 患者，男，66 岁，身高 170cm，体重 85kg，以“头晕、胸闷、乏力 1 周”为主诉入院治疗。空腹血糖 11.2mmol / L，餐后血糖 16.5mmol / L。诊断结果：2 型糖尿病。既往有磺胺类药过敏史，一直服用硝苯地平控释片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片控制高血压和冠心病。医师处方：二甲双胍 0.5gbid、消渴丸 10 丸（规格 30g / 120 丸）bid、罗格列酮 4mgqd 治疗。

- A: 白细胞计数
- B: 餐后血糖
- C: 糖化血红蛋白（HbA1c）
- D: 空腹血糖

答案：C

63. （2018 年真题）患者，女，25 岁，产后 2 个月，哺乳期，因尿路感染需要给予抗感染治疗，首选的药物是（）

- A: 左氧氟沙星
- B: 阿米卡星
- C: 头孢呋辛
- D: 多西环素

答案：C

64. 以下咨询问题的分类属于药品名称的是

- A: 这药能治我这种病吗
- B: 这种药需要服用多久
- C: 这次拿的"×××"(商品名)是我以前一直服用的"格列齐特"吗
- D: 中午忘吃药了怎么办

答案：C

65. 长期服用可引起干咳的药物是

- A: 右美沙芬
- B: 卡托普利
- C: 氯沙坦
- D: 苯丙哌林

答案：B

66. 属于苯二氮革类药物的是

- A: 舍曲林
- B: 阿米替林
- C: 丁螺环酮
- D: 艾司唑仑

答案：D

67. 患者，女，30 岁，情感低落、反应迟钝半年余，晨重夜轻，临床诊断为抑郁症。

- A: 氟西汀
- B: 丙米嗪
- C: 多塞平
- D: 阿米替林

答案：A

68. 可应用于有反复性偏头痛的抗偏头痛药是

- A: 苯噻啶
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 地西泮
- D: 阿司匹林

答案：A

69. 血清丙氨酸氨基转移酶正常参考区间是

- A: 成人<50U/L
- B: 男性<40U/L
- C: 成人<40U/L
- D: 男性 11~50U/L

答案：C

70. 运动员在比赛前使用可快速降低体重，但容易导致脱水甚至休克的兴奋剂是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 可待因
- C: 人促红细胞生成素
- D: 苯丙酸诺龙

答案：A

71. 患儿，男，5 个月，体重 9.0kg，平素健康，近日出现多汗、夜哭、易惊。体检：前囟平软，颅骨有“乒乓球”感，枕秃，肋骨串珠。人工喂养，尚未添加任何辅食，平素较少出门。

- A: 脑瘫
- B: 坏血病
- C: 智障
- D: 佝偻病

答案：D

72. 属于胆固醇吸收抑制剂的药物是

- A: 依折麦布
- B: 辛伐他汀
- C: 甲基多巴
- D: 非诺贝特

答案：A

73. 痛风急性发作期选用的抗痛风药物

- A: 秋水仙碱
- B: 别嘌醇
- C: 阿司匹林
- D: 呋塞米

答案：A

74. 饮食对粪外观的影响, 肉食

- A: 黑褐色
- B: 红色

C: 酱色

D: 暗绿色

答案: A

75. 患者，女，72 岁，因心力衰竭急性发作入院，水肿明显，给予呋塞米 40mg 静脉滴注，给药后应定期监测的生理指标是

A: 血钙

B: 血钾

C: 血脂

D: 血糖

答案: B

76. 原发性失眠首选 ()

A: 佐匹克隆

B: 苯巴比妥

C: 劳拉西泮

D: 水合氯醛

答案: A

77. 与联用药物竞争结合血浆蛋白的是

A: 丙磺舒

B: 阿司匹林

C: 丙胺太林

D: 西沙必利

答案: B

78. 2 型肥胖型糖尿病患者首选

A: 比格列酮

B: 格列喹酮

C: 阿卡波糖

D: 二甲双胍

答案: D

79. (2017 年真题) 患者女, 68 岁体重 54kg, 因慢性阻塞性肺病急性加重再次入院, 入院后生化检查 ALT20IU/L, 血肌酐 (Cr) 1.8mg/dL, 痰培养为铜绿假单胞菌。临床选用头孢他啶。头孢他啶药品说明书成人常用剂量为 1 日 1.5~6g, 分 2~3 次给药肌酐清除率为 31~50ml/min 时剂量为每 12 小时 1g; 肌酐清除率为 16~30ml/min 时剂量为每 24 小时 1g; 肌酐清除率为 6~15ml/min 时量为每 24 小时 0.5g; 肌酐清除率 $\leq$ 5ml/min 时剂量为每 48 小时 0.5g。

A: 每 24 小时 0.5g

B: 每 12 小时 1g

C: 每 24 小时 1g

D: 每 8 小时 2g

答案: C

80. 患者, 女, 26 岁, 临床诊断为“甲状腺功能亢进症”, 给予丙硫氧嘧啶 450mg / d 治疗, 应嘱咐患者定期复查以下哪项指标

A: 红细胞

B: 血红蛋白

C: 白细胞

D: 嗜酸粒细胞

答案: C

81. 根据循证医学证据分级, 同质 RCT 的系统评价结果属于

A: Ia 类证据

B: II b 类证据

C: II a 类证据

D: I b 类证据

答案: A

82. 肝功能检查，总胆红素数值超过正常值数倍可诊断为

A: 黄疸

B: 痛风

C: 心肌梗死

D: 贫血

答案: A

83. 患者，男，因药物中毒被紧急送医，中毒表现为昏迷、针尖样瞳孔、呼吸抑制，造成这种中毒症状的常见药物是

A: 香豆素类杀鼠药

B: 阿米替林

C: 吗啡

D: 苯巴比妥

答案: C

84. 中毒时宜用毛果芸香碱解毒，不能用毒扁豆碱解毒的药物是()。

A: 乙酰胺

B: 阿托品

C: 毒扁豆碱

D: 卡马西平

答案: B

85. 用药不适宜处方

- A: 二甲双胍用于糖尿病患者
- B: 无适应证用药
- C: 无正当理由不首选国家基本药物
- D: 黄连素用于细菌性腹泻

答案：C

86. 患者，男，38 岁，因“心房颤动”服用华法林治疗 2 年余，后因抑郁使用氟西汀，用药后 INR 升高并出现咳血症状，出现该症状的主要原因是

- A: 氟西汀可抑制 CYP2C9，导致华法林血药浓度升高
- B: 氟西汀可增加华法林的吸收，导致华法林血药浓度升高
- C: 氟西汀抑制华法林的肾脏排泄，导致华法林血药浓度升高
- D: 氟西汀具有较强的血浆蛋白结合力，导致血中游离的华法林浓度升高

答案：D

87. 药学服务的对象涉及面广，其服务中心是（）。

- A: 以医院为中心的药学服务
- B: 以患者为中心的药学服务
- C: 以医师为中心的药学服务
- D: 以药师为中心的药学服务

答案：B

88. 以下所列药物中，有腹泻的 2 岁以下儿童不宜使用的是

- A: 盐酸小檗碱
- B: 鞣酸蛋白
- C: 双歧三联活菌制剂

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 洛哌丁胺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/945344243344012034>