

2024 年甘肃省夏河县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题完整题库（含答案）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者,男,60 岁,坏死性胰腺炎剖腹探查术术后 2 年,恢复良好。进食油炸食品后出现轻度腹泻。宜选用的药物是（）

- A: 干酵母片
- B: 奥美拉唑肠溶胶囊
- C: 蒙脱石散
- D: 复方阿嗪米特肠溶片

答案：D

2. 医疗机构制剂申请要求临床研究受试例数不得少于

- A: 60 例
- B: 80 例
- C: 40 例
- D: 20 例

答案：A

3. 对防范用药错误的策略而言，个人观认为发生用药错误的原因主要是

- A: 工作流程不规范
- B: 人员短缺
- C: 人的行为失常
- D: 环境缺陷

答案：C

4. 患者用药咨询的内容是

- A: 不宜选用氯化钠注射液溶解的药品
- B: 抗菌药物的合理使用
- C: 减肥、补钙、补充营养素
- D: 栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法

答案：D

5. 药物相互作用使毒性增加的事例是

- A: 阿托品联用吗啡
- B: 山莨菪碱联用哌替啶
- C: 阿托品联用普萘洛尔
- D: 铁剂联用维生素

答案：B

6. 头孢曲松

- A: 与氯霉素合用因竞争药物的结合位点而产生拮抗作用
- B: 与多种药物存在配伍禁忌，一般应单独给药
- C: 与丙戊酸钠合用可导致血药浓度过低而引发癫痫
- D: 与呋塞米合用可加重肾功能损害

答案：B

7. (2016 年真题) 用于治疗铅中毒的特殊解毒剂是 ()。

- A: 青霉胺
- B: 乙酰胺
- C: 氟马西尼
- D: 纳洛酮

答案：A

8. 服药期间饮酒可引起低血糖反应的是

- A: 泼尼松
- B: 硫酸亚铁
- C: 格列本脲
- D: 西咪替丁

答案：C

9. 以下关于抑郁症的介绍错误的是

- A: 抑郁症的病因明确
- B: 抑郁症的好发年龄在 20~50 岁
- C: 该病具有高发病、高复发、高致残的特点
- D: 及时恰当的治疗能提高抑郁症的临床治愈率

答案：A

10. 铁剂联用维生素 C

- A: 作用不同的靶点
- B: 延缓或降低抗药性
- C: 促进机体的利用
- D: 协同作用

答案：C

11. 可提示隐性黄疸或亚临床性黄疸的是

- A: $>342 \mu\text{mol/L}$
- B: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$
- C: $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$
- D: $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

答案：B

12. 药师调剂处方时必须做到"四查十对"。以下对"四查十对"的叙述中，不正确的是

- A: 查临床诊断，对用药适宜性
- B: 查用药合理性，对临床诊断
- C: 查配伍禁忌，对药品性状、用法用量
- D: 查处方，对科别、姓名、年龄

答案：A

13. 瑞舒伐他汀钙的日剂量范围是()

- A: 40—200mg
- B: 10—20mg
- C: 5—20mg
- D: 10—80mg

答案：B

14. 影响人类寿命的因素中，社会因素占

- A: 0.15
- B: 0.08
- C: 0.07
- D: 0.1

答案：D

15. 清洁手术的预防用药时间不超过

- A: 6 小时
- B: 48 小时
- C: 24 小时

D: 12 小时

答案：C

16. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛；查体：T38℃，肾区叩击痛：血常规见 WBC15X10⁹ / L，中性粒细胞百分比 85%，尿常规见尿液混浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

- A: 如该患者为妊娠期，可选用氨苄青霉素
- B: 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高
- C: 首选针对革兰阳性菌的药物
- D: 选用肾毒性小、不良反应少的抗菌药物

答案：C

17. 药师在知道合理用药时应正确的交代给药途径和给药方法，下列交代的内容错误的是：

- A: 活菌制剂不能超过 40℃ 的水送服
- B: 泡腾片是可以溶解于温开水后服用，也可以作为咀嚼片服用
- C: 栓剂是外用制剂，不可口服
- D: 肠溶片要整体吞服，不易咀嚼服用

答案：B

18. （2016 年真题）高血压伴痛风的患者慎用的药物是（）。

- A: 氢氯噻嗪
- B: 普萘洛尔
- C: 硝苯地平
- D: 卡托普利

答案：A

19. 欲了解更多的药品不良反应信息，可优先查阅的文献是

- A: 《新编药物学》
- B: 《中华人民共和国药典》
- C: 《中国国家处方集》
- D: 《梅氏药物副作用》

答案：D

20. 已肯定的致畸药物禁止使用，即

- A: 选用对胎儿危害较小的药物
- B: 可用可不用的药物应尽量不用或少用
- C: 用药必须有明确的指征和适应证
- D: 禁止用试验性药

答案：A

21. 对沙眼衣原体有强大的抑制作用的药物是

- A: 米诺环素？
- B: 泼尼松龙？
- C: 酞丁安滴眼液？
- D: 硫酸锌滴眼液？

答案：C

22. 杨某，男性，25 岁，间断上腹痛 2 年，表现为两餐之间出现上腹痛，持续至下餐进餐后缓解，以秋冬季多发。

- A: 克拉霉素？
- B: 氯化氢？
- C: 碳酸氢钠？
- D: 奥美拉唑？

答案：B

23. (2017 年真题) 良性前列腺增生症老年患者应用 α_1 肾上腺素能受体阻断治疗时可能导致的不良反应是 ()

- A: 乳腺增生
- B: 体位性低血压
- C: 干咳
- D: 尿潴留

答案: B

24. 过敏性疾病患者可出现

- A: 红细胞/血红蛋白减少
- B: 中性粒细胞增多
- C: 嗜酸性粒细胞增多
- D: 血小板增多

答案: C

25. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第一跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 $500 \mu\text{mol/L}$ ；足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

- A: 布洛芬
- B: 尼美舒利
- C: 阿司匹林
- D: 对乙酰氨基酚

答案: D

26. 癌症患者化疗出现腹泻合并中性粒细胞核左移时，需给予的预防性治疗药物是

- A: 洛哌丁胺
- B: 莫沙必利

C: 广谱抗生素

D: 药用炭

答案: C

27. 对于 ACEI 类药描述错误的是

A: 抑制交感神经活性作用

B: 唯一的抑制心肌及血管重构药物

C: 抑制血管紧张素转化酶 (ACE) 活性

D: 明显降低全身血管阻力

答案: A

28. 若空腹服药，则胃排空较快，药物在短时间内可进入十二指肠与小肠。餐后服用可延缓胃排空，使药物在胃中较充分地吸收，且能够减少或避免药物对胃黏膜的刺激。因此，许多药品适宜餐后服用。

A: 清晨服用

B: 餐前服用

C: 餐中服用

D: 餐后服用

答案: D

29. 治疗结核病的患者的注意事项错误的是

A: 充分了解抗结核药物服用中可能出现的不良反应，一旦出现要及时报告医生

B: 口服抗结核药可自行决定饭后服用

C: 患者所用食具应于餐后煮沸消毒

D: 增强体质增加高蛋白和维生素的摄入，日光浴

答案: B

30. (2016 年真题) 药库接收了一批药品，其中需要在冷处贮藏的是 ()。

- A: 硫普罗宁片
- B: 乳酶生片
- C: 西地碘片
- D: 双歧三联活菌胶囊

答案: D

31. 可引起尿肌酐减少的是

- A: 病毒性肝炎
- B: 肺结核
- C: 再生障碍性贫血
- D: 肾小球肾炎

答案: D

32. (2018 年真题) 患者, 男 58 岁, 高血压病史 5 年, 吸烟史 40 年, 日均 40 支, 6 小时前出现左侧肢体无力, 并逐渐加重, 不能站立, 家属发现其说话迟钝含混, 右侧嘴唇变浅, 意识清楚, 到某院急诊 BP190/120mmHg, 血常规基本正常, 行头部 MRI 检查后, 诊断为急性脑梗死。

- A: 尼莫地平注射液 20mgqdiv
- B: 甘露醇注射液 250mlq6hiv
- C: 胞二磷胆碱注射液 200mgqdiv
- D: 呋塞米片 200mgqdp

答案: B

33. 长期服用可加重消化道溃疡风险, 不宜与非甾体抗炎药合用的药物是

- A: 匹伐他汀

- B: 多奈哌齐
- C: 铝碳酸镁
- D: 美金刚

答案: B

34. (2017 年真题) 频繁应用可引起局部组织萎缩的药物是 ()

- A: 西地碘含片
- B: 氯己定含漱液
- C: 地塞米松粘贴片
- D: 替硝唑含漱液

答案: C

35. 一般情况下, 以洗胃方式解救经口中毒的有效时间是

- A: 毒物经口进入体内 4~6 小时以内
- B: 中毒后 2~4 小时以内
- C: 中毒后 4~6 小时以内
- D: 中毒后 6~8 小时以内

答案: A

36. 患者, 女, 31 岁, 因丙型病毒性肝炎使用 α 干扰素联合利巴韦林治疗。下列关于用药期间避孕和备孕措施的说法, 正确的是 ()

- A: 干扰素、利巴韦林较为安全, 停药后即可备孕
- B: 干扰素、利巴韦林较为安全, 不必停药, 即可备孕
- C: 干扰素、利巴韦林易引起畸胎或者胚胎致死效应, 治疗期间和治疗后 6 个月内, 必须采取避孕措施
- D: 干扰素、利巴韦林较为安全, 停药 3 个月后可备孕

答案: C

37. 最容易受湿度影响而变质的药品是

- A: 水溶性基质栓
- B: 肝素等生物制品
- C: 滴眼剂
- D: 胰岛素制剂

答案：A

38. 兴奋交感神经，引起高血压的药物是

- A: 咖啡因
- B: 伪麻黄碱
- C: 糖皮质激素
- D: 重组人促红细胞生成素

答案：A

39. 治疗非心源性栓塞性缺血性脑卒中，宜选用的药物是（）

- A: 依诺肝素钠
- B: 氯吡格雷
- C: 尿激酶
- D: 达比加群酯

答案：B

40. 患者，女，37 岁，因小腹胀痛 2 月余、加重 5 天就诊。主诉就诊前无明显诱因出现小腹胀痛，阴道不规则流液，流出物呈黄色脓状，量时多时少，下腹及腰骶部间歇性坠痛。间断性院外治疗（口服金刚藤胶囊、阿莫西林胶囊，具体用量不详）。5 天前月经来潮，下腹部坠痛与腰骶部胀痛难忍，遂来院就诊。8 超提示右侧卵巢囊肿、盆腔积液。妇科检查提示外阴发育正常，阴道黏膜充血，有黄色脓性鱼腥臭味白带，宫颈肥大充血并有举痛，子宫大小正常。门诊以“急性盆腔炎、卵巢囊肿、阴道炎”收治入院。

- A: 阿奇霉素
- B: 氧氟沙星
- C: 克林霉素
- D: 多西环素

答案：C

41. （2017 年真题）正常剂量维生素 D 的妊娠毒性分级是（）

- A: D 级
- B: A 级
- C: C 级
- D: X 级

答案：B

42. 口服避孕药可能导致

- A: 血清总胆固醇升高
- B: 血清血红蛋白升高
- C: 血白细胞减少
- D: 粪便细胞显微镜检查检出真菌

答案：A

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

43. 消化性溃疡发病机制中的防御因子为（）

A: 吸烟

B: H. pylori 感染

C: 酒精

D: 前列腺素

答案：D

44. β 受体阻断剂的主要不良反应是

- A: 直立性低血压
- B: 足踝部水肿
- C: 血尿酸升高
- D: 支气管痉挛

答案：D

45. 抑酸剂泮托拉唑长期应用可引起的典型不良反应是

- A: 高钾血症
- B: 血糖升高
- C: 定向力障碍、意识混乱
- D: 低镁血症

答案：D

46. 很多药物存在血液系统影响，会造成某些血细胞增多或减少烟酸主要会造成

- A: 中性粒细胞减少
- B: 嗜酸性粒细胞减少
- C: 嗜碱性粒细胞增多
- D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：B

47. 除胰岛功能低下外，主要引起血糖超过正常参考区间高限的疾患是

- A: 肾功能衰竭
- B: 激素分泌功能亢进
- C: 肝癌、重症肝炎
- D: 激素分泌功能减退

答案：B

48. 慢性肾盂肾炎时，尿中可见()。

- A: 乳糜尿
- B: 白细胞管型
- C: 红细胞管型
- D: 血红蛋白尿

答案：B

49. 可引起视力模糊的是

- A: 抗过敏药
- B: 右美沙芬
- C: 东莨菪碱
- D: 阿米洛利

答案：C

50. 以下药物中，可引起白细胞计数降低的药物为

- A: 枸橼酸铋钾
- B: 埃索美拉唑
- C: 法莫替丁
- D: 铝碳酸镁

答案：D

51. 由医师和药师加强指导来减少

- A: 医师处方差错
- B: 患者执行医嘱差错
- C: 药师调配处方差错
- D: 护士执行医嘱差错

答案：B

52. 消化不良性腹泻宜选用的药物是

- A: 双歧三联活菌制剂
- B: 双八面体蒙脱石
- C: 山莨菪碱
- D: 胰酶

答案：D

53. 下列药物中，患胸膜炎伴胸痛的咳嗽患者宜选用的药物是

- A: 苯丙哌林
- B: 可待因
- C: 喷托维林
- D: 羧甲司坦

答案：B

54. （2018 年真题）患者，男，38 岁，因腹部受寒胃痉挛疼痛，应选用的药物是（）

- A: 卡马西平
- B: 麦角胺咖啡因
- C: 布洛芬
- D: 山莨菪碱

答案：D

55. 患者，女，62 岁，医师处方如下：患者：××X，性别：女，年龄：62 岁。临床诊断：2 型糖尿病高血压 2 级高脂血症 PCI 术后。

- A: 二甲双胍
- B: 阿卡波糖

C: 氨氯地平

D: 氯吡格雷

答案: C

56. 当创伤应激严重时，由葡萄糖与脂肪提供 NPC 的比例是

A: NPC5: 5

B: 150kcal: 1gN

C: 100kcal: 1gN

D: NPC7: 3

答案: A

57. 是否增加房颤患者死亡率尚无定论，可谨慎地用于房颤的心室率控制的是()

A: 美托洛尔

B: 普罗帕酮

C: 地尔硫

D: 地高辛

答案: D

58. (2017 年真题) 伴有甲状腺功能亢进症的口腔溃疡患者应避免使用的药物是 ()

A: 氯己定含漱液

B: 西地碘含片

C: 地塞米松粘贴片

D: 替硝唑含漱液

答案: B

59. 荨麻疹患者常出现

- A: 嗜酸性粒细胞增多
- B: 血小板计数增高
- C: 血红蛋白减少
- D: 中性粒细胞增多

答案：A

60. 无症状菌尿

- A: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在 6 周内再次出现菌尿，菌种与上次相同
- B: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次（同一菌株），尿细菌数 $>10^5\text{cfu/ml}$
- C: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药 6 周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同
- D: 宜选用毒性小的抗菌药物

答案：B

61. 用药后可出现非痛风性多关节痛的抗结核药是

- A: 利福平
- B: 链霉素
- C: 吡嗪酰胺
- D: 乙胺丁醇

答案：C

62. 患者女 29 岁孕 25+6 周近日出现乏力、困倦、食欲不振、恶心等症状，化验结果为 $\text{Hb}71\text{g/L}$ ，诊断为缺铁性贫血，予以蔗糖铁治疗。该药适宜的给药方式是（）

- A: 快速静脉注射
- B: 先静脉注射负荷剂量再静脉滴注余下剂量

C: 口服，每次 5ml，一日 3 次

D: 先少量缓慢静滴，观察无过敏反应后再继续静脉滴注余下剂量

答案：D

63. 阿托品

A: 可使驾驶员视物模糊或辨色困难

B: 可导致驾驶员多尿或多汗

C: 可使驾驶员出现眩晕和幻觉

D: 可使驾驶员出现定向力障碍

答案：A

64. 某女性，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛，血分析见 WBC $15 \times 10^9/L$

A: 如该患者为妊娠期，可选用氨苄西林

B: 选用肾毒性小、副作用少的抗菌药物

C: 首选针对革兰阳性菌的药物

D: 抗菌药物在尿和肾内的浓度要高

答案：C

65. 把重心集中在监控高频发生错误的药物使用上，归属

A: 知识培训

B: 管理规范到位

C: 环境与流程的优化与持续改进

D: 社会进步

答案：B

66. 摄入过多可增加体内血容量，促发充血性心力衰竭或高血压的是

A: 食盐

B: 酒

C: 食醋

D: 脂肪

答案: A

67. 硝酸甘油

A: 嗜酸性粒细胞减少

B: 血小板减少

C: 中性粒细胞减少

D: 血红蛋白量增多

答案: D

68. 频繁应用可引起局部组织萎缩的药物是()

A: 替硝唑含漱液

B: 西地碘含片

C: 地塞米松粘贴片

D: 氯己定含漱液

答案: C

69. 某男孩，12 岁，近来反复突发意识丧失、颤动持续数秒钟缓解。

A: 丙戊酸

B: 苯妥英钠

C: 氯丙嗪

D: 地西洋

答案: A

70. 肾小管对钠、氨基酸、葡萄糖等再吸收能力强，使用利尿剂等较易出现酸碱失衡，即

- A: 药物吸收
- B: 药物代谢
- C: 药物排泄
- D: 药物分布

答案：C

71. 退热或缓解疼痛都“不宜同时应用两种以上解热镇痛药”的主要依据是

- A: 可能引起肝、肾、胃肠道的损伤
- B: 可能导致酸中毒
- C: 可能导致血管性水肿
- D: 可能引起哮喘发作

答案：A

72. ADR 报表内容填写不齐全、等待补充，或因果关系难以定论。缺乏文献资料佐证；其 ADR 因果关系可评价为

- A: 可能无关
- B: 很可能
- C: 可能
- D: 待评价

答案：D

73. 与甲氧苄啶组成复方制剂复方新诺明的药物是

- A: 磺胺甲噁唑
- B: 替硝唑
- C: 磺胺嘧啶
- D: 磺胺多辛

答案：A

74. 用于治疗苯二氮?类药物中毒的特殊解毒剂是

- A: 氟马西尼
- B: 青霉胺
- C: 纳洛酮
- D: 乙酰胺

答案：A

75. 再感染

- A: 宜选用毒性小的抗菌药物
- B: 治疗后症状消失，尿菌阴转后在 6 周内再次出现菌尿，菌种与上次相同
- C: 治疗后症状消失，尿菌阴性，但在停药 6 周后再次出现真性细菌尿，菌株与上次不同
- D: 患者无尿路感染症状，但中段尿培养连续两次（同一菌株），尿细菌数 $>10^5$ cfu / ml

答案：C

76. 消化性溃疡抗 Hp 的四联疗法使用疗程为

- A: 6~8 周
- B: 1~2 周
- C: 8~12 周
- D: 4~6 周

答案：B

77. 按照药品不良反应程度分级标准评判,症状明显,重要器官或系统功能有中度损害,应评判为

- A: 中度

- B: 重度
- C: 弱轻度
- D: 轻度

答案：A

78. 阿托伐他汀钙的日剂量范围是()

- A: 40—200mg
- B: 10—80mg
- C: 5—20mg
- D: 10—20mg

答案：B

79. 患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇紫绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

- A: 体位性低血压
- B: 快速房性心律失常伴传导阻滞
- C: 高血钾
- D: 心动过缓

答案：B

80. 患者，女，53 岁，既往有痛风史，长期坚持服药控制。近日因高血压就诊，该患者禁用的药物是

- A: 氢氯噻嗪
- B: 洛伐他汀
- C: 卡托普利
- D: 普萘洛尔

答案：A

81. 对于围手术期抗菌药物的预防性应用原则，说法错误的是

- A: 应尽量选择单一抗菌药物预防用药，避免不必要的联合使用
- B: 若术前发现有耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）定植的可能或者该医疗机构 MRSA 发生率高，可选用氨曲南预防感染
- C: 针对革兰阴性杆菌可用氨曲南、磷霉素或氨基糖苷类
- D: 对于清洁手术（I 类切口），通常不需预防用抗菌药物

答案：B

82. （2019 年真题）患者，女，27 岁，确诊慢性乙型肝炎 3 年，近日化验结果：HBV-DNA 2×10^5 opies/ml，ALT122U/L。予以抗病毒治疗首选的药物是

- A: 阿糖腺苷
- B: 泛昔洛韦
- C: 恩替卡韦
- D: 利巴韦林

答案：C

83. 人体健康参数：肥胖的腰围标准是

- A: 男性 >85 cm，女性 >80 cm
- B: 男性 >90 cm，女性 >80 cm
- C: 男 >95 cm，女性 >85 cm
- D: 男性 >90 cm，女性 >85 cm

答案：C

84. 咳嗽较弱者宜选用的药物是

- A: 右美沙芬
- B: 喷托维林

C: 苯丙哌林

D: 氨溴索

答案: B

85. 氟乙酰胺中毒的特效解毒剂是 ()

A: 维生素 K1

B: 青霉胺

C: 乙酰胺

D: 纳洛酮

答案: C

86. 单纯餐后血糖高，而空腹和餐前血糖不高的 2 型糖尿病患者首选

A: 二甲双胍

B: 阿卡波糖

C: 格列喹酮

D: 比格列酮

答案: B

87. 下列叙述正确的是

A: 淋巴细胞为有粒细胞

B: 白细胞均是有粒细胞

C: 有粒细胞根据其颗粒的嗜好可分为中性、嗜酸性、嗜碱性 3 种

D: 单核细胞为有粒细胞

答案: C

88. 长期、大量使用可对肝脏造成不可逆性损伤的药物是

A: 阿司匹林

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 对乙酰氨基酚

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/946014032100011030>