

2024 湖南省新化县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题完整题库【达标题】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 有机氟杀虫农药中毒的特效解毒剂是

- A: 乙酰胺
- B: 毒扁豆碱
- C: 碘解磷定
- D: 维生素 K1

答案：A

2. 患者，男 64 岁，身高 174cm，体重 92KG，既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗

- A: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、辛伐他丁
- B: 特拉唑嗪片、辛伐他丁、阿司匹林肠溶片
- C: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、单硝酸异山梨酯注射液
- D: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片

答案：C

3. 美金刚的作用机制为

- A: 钙离子拮抗剂
- B: 抑制 N-甲基天冬氨酸受体
- C: 脑循环改善剂
- D: 抑制胆碱酯酶

答案：C

4. 服用磺胺甲噁唑不宜同食

A: 高蛋白食物

B: 咖啡

C: 葡萄柚汁

D: 食醋

答案：D

5. 夏季用前宜在冰箱冷藏室放置 15 分钟的剂型是（）

A: 含漱剂

B: 滴眼剂

C: 直肠栓剂

D: 软膏剂

答案：C

6. 肥胖、某些疾病、中毒都可成为非酒精性脂肪肝的诱因。脂肪肝合并其他疾病时应采取相应的治疗措施

A: 替米沙坦

B: 别嘌醇

C: 奥利司他

D: 二甲双胍

答案：A

7. 最方便、最安全、最经济的给药途径是

A: 口服给药

B: 静脉注射

C: 直肠给药

D: 肌肉注射

答案：A

8. 引起发冷、寒战、面部和四肢发绀，继而发热等输液反应的 DMARDs 是

A: 环孢素

B: 氯喹

C: 利妥昔单抗

D: 硫唑嘌呤

答案：C

9. “1 天给药 1 次；如需要立即达到治疗浓度，可首剂加倍”是针对

A: 半衰期 8~24 小时的药品

B: 半衰期大于 24 小时的药品

C: 半衰期小于 30 分钟的药品

D: 半衰期大于 30 小时的药品

答案：B

10. (2016 年真题) 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别。

A: B 级

B: D 级

C: A 级

D: C 级

答案：B

11. 解救有机磷中毒过程中，入阿托品应用过量，应立即给予：

A: 山莨菪碱

B: 毛果芸香碱

C: 东莨菪碱

D: 麻黄碱

答案：B

12. 药物相互作用使药物吸收增加的联合用药事例是

A: 硝苯地平联用普萘洛尔

B: 青蒿素联用乙胺嘧啶

C: 阿托品联用普萘洛尔

D: 铁剂联用维生素

答案：D

13. 应用格列本脲时，应注意的事项是

A: 用药期间宜吃高蛋白食物

B: 用药期间不宜食用富含组胺类的食物

C: 服药期间不宜饮茶

D: 服药期间不宜饮酒

答案：D

14. 属于蛋白酶抑制剂的抗 HIV 药物是

A: 利托那韦

B: 替诺福韦

C: 拉替拉韦

D: 阿德福韦

答案：A

15. 发病急剧，常累及双眼（或间隔 1~2 天）伴有大量的黏液性分泌物（眼屎），于夜间分泌较多，在晨起时常会被分泌物糊住双眼的是

- A: 过敏性结膜炎
- B: 急性卡他性结膜炎
- C: 流行性结膜炎
- D: 流行性出血性结膜炎

答案：B

16. 代表乙型肝炎病毒表面抗体的是

- A: HBeAg
- B: HBsAb
- C: HBcAb
- D: HBeAb

答案：B

17. 与左旋多巴合用，可提高疗效的是()

- A: 奥美拉唑
- B: 苄丝肼
- C: 叶酸
- D: 克拉维酸钾

答案：B

18. 氯喹与伯氨喹合用

- A: 根治间日疟
- B: 引起心脏房室传导阻滞
- C: 加重神经肌肉接头抑制作用
- D: 诱发癫痫

答案：A

19. 阿片类中毒出现呼吸抑制时给予（）

- A: 阿托品
- B: 苯妥英钠
- C: 去甲肾上腺素
- D: 有机硫类

答案：A

20. 奎尼丁与地高辛合用可导致

- A: 尖端扭转型室性心动过速
- B: 奎尼丁中毒
- C: 明显的心动过缓
- D: 地高辛中毒

答案：D

21. 患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

- A: 硝普钠
- B: 多索茶碱
- C: 硝苯地平
- D: 毛花苷丙

答案：D

22. 清晨 5 时至中午 11 时最低，下午 2 时至次日凌晨 1 时最高，是指

- A: 糖皮质激素的分泌规律
- B: 肝脏合成胆固醇的规律
- C: 胃酸的分泌规律
- D: 胰岛 B 细胞的分泌规律

答案：C

23. 下列止咳药中，夜间咳嗽患者宜选用的是

- A: 可待因
- B: 氨溴索
- C: 喷托维林
- D: 右美沙芬

答案：D

24. 分为儿童卷、化学药品与生物制品卷的是

- A: 《英国国家处方集》
- B: 《中国国家处方集（2010 年版）》
- C: 《国家基本药物处方集（2012 年版）》
- D: 《医师案头参考》

答案：B

25. （2017 年真题）依那普利的妊娠毒性分级是（）

- A: X 级
- B: D 级
- C: C 级
- D: A 级

答案：B

26. 能有效抑制肠道内胆固醇的吸收，禁用于妊娠期和哺乳期的是（）

- A: 普罗布考
- B: 烟酸类
- C: 他汀类
- D: 依折麦布

答案：D

27. 患者，男，80 岁，患有高血压、2 型糖尿病、前列腺增生，近日出现暂时性尿失禁症状，怀疑与其服用的药物有关。复核其使用的药物，可能造成其尿失禁的药物是（）

- A: 非那雄胺
- B: 依那普利
- C: 珍菊降压片(含氢氯噻嗪)
- D: 二甲双胍

答案：C

28. 患儿，男，12 岁，患有常年性过敏性鼻炎，药师推荐使用布地奈德鼻喷雾剂。关于用药剂量和使用方法，正确的是

- A: 每侧鼻孔 $64\mu\text{g}$ （一喷），早、晚各一次，取得效果后改为每日早晨每侧鼻孔喷入 $64\mu\text{g}$
- B: 每侧鼻孔 64μ （一喷），早、晚各一次，取得效果后改为每日睡前每侧鼻孔喷入 $64\mu\text{g}$
- C: 每侧鼻孔 $128\mu\text{g}$ （两喷），早、晚各一次，取得效果后改为每日睡前每侧鼻孔喷入 $128\mu\text{g}$
- D: 每侧鼻孔 $128\mu\text{g}$ （两喷），早、晚各一次，取得效果后改为每日早晨每侧鼻孔喷入 $128\mu\text{g}$

答案：A

29. 患者接受索拉非尼治疗时，药师应重点监测的不良反应是（）

- A: 肺纤维化
- B: 心脏毒性
- C: 生殖系统毒性
- D: 肝脏毒性

答案：C

30. 处方审核是处方调配的重要环节，药师只有在审核处方内容正确无误时才能进行药品调配。处方审核的结果分为合理处方和不合理处方，不合理处方包括不规范处方、用药不适宜处方和超常处方。

- A: 单张门诊处方超过 5 种药品
- B: 无正当理由开具高价药
- C: 无适应证用药
- D: 联合用药不适宜

答案：D

31. 属于 HIV 蛋白酶抑制剂的是（）

- A: 阿巴卡韦
- B: 洛匹那韦
- C: 奈韦拉平
- D: 多替拉韦

答案：B

32. 某患者，男，71 岁，既往有血脂异常，胆固醇 7.7mmol/L，甘油三酯 2.3mmol/L，肝功能正常，患者连续服用氟伐他汀和非诺贝特 5 个月，检测肝功能 AST142U/L(正常值为 40U/L)，ALT126(正常值为 40U/L)，磷酸激酶 CPK2000U/L(正常值为 25~200U/L)。依据上述复查结果判断患者

- A: 肝脏毒性
- B: 肾脏毒性
- C: 心脏毒性
- D: 肌肉毒性

答案：D

33. 癫痫持续状态的好发年龄段为 ()

- A: 55 岁以上
- B: 1 岁以内及 65 岁以上
- C: 65 岁以上
- D: 6 岁以内

答案：B

34. 若某药的成人剂量是每次 500mg，那么一个体重 35kg 的儿童按体表面积计算每次服用剂量约为

- A: 250mg
- B: 400mg
- C: 350mg
- D: 300mg

答案：C

35. 检查片剂的硬度属于

- A: 触觉试验
- B: 嗅觉试验
- C: 视觉试验
- D: 听觉试验

答案：A

36. 患者，男，45 岁，患有高血压，因感冒致发热、咽痛、流涕到药店买药，药师不应推荐其使用的药物是

- A: 速克感冒片
- B: 速感宁胶囊
- C: 维 C 银翘片
- D: 复方酚咖伪麻胶囊

答案：D

37. 血脂调节药的合理应用有效降低 LDL-C 和 TG 水平，升高 HDL-C 水平的是（）

- A: 普罗布考
- B: 伊曲康唑
- C: 他汀类与贝特类联用
- D: 依折麦布

答案：C

38. 一 2 型糖尿病患者，伴高血压、高胆固醇血症，如有胃部不适或感冒即需联合用药。对该患者的用药教育应该是适宜清晨服用的药品是

- A: 普伐他汀
- B: 格列美脲
- C: 阿司匹林
- D: 呋塞米

答案：D

39. 属于非核苷类逆转录酶抑制剂的是

- A: 依非韦伦
- B: 齐多夫定
- C: 利巴韦林
- D: 利托那韦

答案：A

40. 主要降胆固醇的抗氧化剂是

- A: 他汀类
- B: 贝丁酸类

C: 普罗布考

D: 考来烯胺

答案: C

41. 向患者提供的用药咨询的主要内容是

A: 服药后预计疗效起效时间及维持时间

B: 输液药物稳定性和配伍的理化性质变化

C: 有否替代药物或其他疗法

D: 漏服后的补救方法

答案: B

42. 痛风慢性期应长期使用的促尿酸排泄药是

A: 阿司匹林

B: 别嘌醇

C: 秋水仙碱

D: 丙磺舒

答案: D

43. 巨幼细胞贫血患者出现周围神经系统症状应首选

A: 硫酸亚铁片

B: 苯妥英钠注射液

C: 叶酸片

D: 维生素 B12

答案: D

44. (2016 年真题) 在指导合理用药时，应交代宜在睡前服用的药物是 ()。

A: 苯妥英钠

- B: 硫酸亚铁
- C: 辛伐他汀
- D: 双磷酸盐

答案：C

45. 以下所列病症中，依据"血淀粉酶超过正常值"可以诊断的是

- A: 高血压
- B: 高脂血症
- C: 肾病综合征
- D: 急性胰腺炎

答案：D

46. 配制 10%葡萄糖注射液 500ml，现用 50%和 5%的葡萄糖注射液混合，需要

- A: 50%葡萄糖注射液 85ml 和 5%葡萄糖注射液 415ml
- B: 50%葡萄糖注射液 94ml 和 5%葡萄糖注射液 406ml
- C: 50%葡萄糖注射液 72ml 和 5%葡萄糖注射液 428ml
- D: 50%葡萄糖注射液 56ml 和 5%葡萄糖注射液 444ml

答案：D

47. 毒物中毒的严重程度与后果往往取决于作用毒物的剂量、作用的时间以及诊断和救治是否准确与及时等。对于急性中毒者，必须迅速作出准确判断，及时采取有效的救治措施，以挽救生命、减轻损害程度。

- A: 5~10 分钟
- B: 15~30 分钟
- C: 10~20 分钟
- D: 20~30 分钟

答案：B

48. 糖尿病合并肾病者首选

- A: 二甲双胍
- B: 比格列酮
- C: 阿卡波糖
- D: 格列喹酮

答案：D

49. 患者,男,65 岁因咳嗽、咳大量脓痰、呼吸困难入院,诊断为慢性阻塞性肺病急性加重。该患者临床治疗不应选用的药物是 ()

- A: 羧甲司坦
- B: 氨溴索
- C: 右美沙芬
- D: 乙酰半胱氨酸

答案：C

50. 患者,女,40 岁,既往有风湿性心脏病病史,近 2 年来出现劳累性呼吸困难,1 天前因受凉出现发热、咳嗽,咳粉红色泡沫样痰,不能平卧。查体:半卧位,口唇发绀,两肺大量水泡音及哮鸣音。

- A: 快速性房性心律失常伴传导阻滞
- B: 心动过缓
- C: 高钾血症
- D: 直立性低血压

答案：A

51. (2021 年真题) 在一定范围内,其水平与动脉粥样硬化和冠心病的发生、发展呈负相关的指标是 ()

- A: HDL-C
- B: TG
- C: LDL-C
- D: HbA1c

答案：A

52. 对肠道寄生虫具有神经肌肉阻滞作用，蛔虫产生痉挛性麻痹作用的是

- A: 噻嘧啶
- B: 阿苯达唑
- C: 枸橼酸哌嗪
- D: 甲苯咪唑

答案：A

53. 患者，男，54 岁，以“咳嗽、不适、呼吸困难和喘息、咳痰逾 3 日”就诊，患者无基础疾病，近 1 周内未服用药物，诊断为支气管炎。对该患者的经验治疗应选择

- A: 阿奇霉素分散片
- B: 美托洛尔片
- C: 头孢克洛颗粒剂
- D: 复方甲氧那明胶囊

答案：D

54. 以下所列处方书写的各项要求中，最正确的是

- A: 每张处方不得超过 5 种药品
- B: 每张处方不得合开中西药品
- C: 每张处方不得超过 3 日用量
- D: 处方中不得使用药品缩写名称

答案：A

55. 下列不属于痛风的非药物治疗方法的是

- A: 运动治疗
- B: 多饮水，每日保持尿量 2~3L
- C: 禁酒
- D: 保持理想体重

答案：A

56. 患者，男，58 岁，高血压病史 5 年；吸烟史 40 年，日均 40 支。2 小时前出现左侧肢体无力，并逐渐加重，不能站立；家属发现其说话迟钝、言语含混，左侧鼻唇沟变浅；意识清楚。急送医院急诊，BP170/100mmHg；血常规基本正常；头颅 CT 检查未见高密度病灶。诊断为脑梗死。

- A: 呋塞米片 20mgqdp
- B: 甘露醇注射液 250mlq6hivgtt
- C: 尼莫地平注射液 200mgqdivgtt
- D: 甘油果糖注射液 500mlbidivgtt

答案：B

57. 患者，男 64 岁，身高 174cm，体重 92KG，既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗

- A: 曲美他嗪片
- B: 阿司匹林肠溶片
- C: 特拉唑嗪片
- D: 氨氯地平片

答案：C

58. “治疗指数低者静脉滴注给药；治疗指数高者可分次给药，以保证血药浓度始终高于最低有效浓度”是针对

- A: 半衰期小于 30 分钟的药品
- B: 半衰期 8~24 小时的药品
- C: 半衰期大于 30 小时的药品
- D: 半衰期大于 24 小时的药品

答案：A

59. 将 0.5g 氨茶碱注射液加入到 5%葡萄糖注射液 250ml 中。临床要求给药速度是 60mg / h，输注速度应是

- A: 60ml / h
- B: 10ml / h
- C: 30ml / h
- D: 20ml / h

答案：C

60. 药学服务是药师对患者的关怀和责任。下列人员中，属于药学服务的重要人群是

- A: 过敏体质者
- B: 门诊患者
- C: 住院患者
- D: 社区患者

答案：A

61. 老年人用氨基糖苷类药物时应谨慎，主要是因为老年人()。

- A: 血浆蛋白含量降低，使游离性药物增加
- B: 消化腺分泌减少，药物吸收增加

C: 对药物处于高敏状态，影响中枢神经系统的功能

D: 肾功能降低，药物半衰期延长，耳、肾毒性增加

答案：D

62. 能够给予当即解答的就当即解答

A: 保护患者的隐私

B: 特别关注特殊人群

C: 解释的技巧

D: 及时回答不拖延

答案：D

63. 按照药品不良反应程度分级标准评判,轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无需治疗，应评判为

A: 弱轻度

B: 中度

C: 重度

D: 轻度

答案：D

64. 以下所列药物中，一般不会导致蛋白尿的是

A: 多黏菌素

B: 庆大霉素

C: 甲氨蝶呤

D: 青霉素

答案：D

65. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第 1 跖趾关节剧痛，3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为 $500 \mu\text{mol/L}$ ；足部 x 线示非特征性软组织肿胀。

- A: 痛风
- B: 风湿性关节炎
- C: 假性痛风
- D: 类风湿关节炎

答案：A

66. 以下维生素类药物中，可能导致尿液酸碱度降低的是

- A: 维生素 E
- B: 维生素 D
- C: 维生素 C
- D: 维生素 B

答案：C

67. 巴比妥类药物重度中毒的表现是

- A: 抽搐反复发作
- B: 呼出气体中可有苦杏仁气味
- C: 恶心、呕吐、视力模糊
- D: 意识障碍、昏迷

答案：D

68. 患者，女，35 岁，因感冒所致流涕、咳嗽发热等症状到药店购药，药师应推荐的药品是()

- A: 对乙酰氨基酚片
- B: 氯苯那敏片
- C: 萘甲唑啉滴鼻液

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 酚麻美敏片

答案：D

69. 患者女 56 岁，诊断为高血压伴快速型心律失常，首选的药物是（）

A: 氯沙坦

B: 美托洛尔

C: 维拉帕米

D: 螺内酯

答案：B

70. ADR 报表内容填写不齐全、等待补充，或因果关系难以定论，缺乏文献资料佐证；可评价为

A: 可能无关

B: 很可能

C: 可能

D: 待评价

答案：D

71. 属于癌症第二阶梯止痛药物的是

A: 二氢可待因

B: 美沙酮

C: 谷维素

D: 对乙酰氨基酚

答案：A

72. 影响维生素 B12 吸收的药物是

A: 二甲双胍

B: 甲氨蝶呤

C: 苯妥英钠

D: 苯巴比妥

答案: A

73. 患者女,55 岁,因持续性中上腹疼痛 2 日入院。查体:体温 38℃中上及左上腹有压痛。化验结果:白细胞计数 $18.7 \times 10^9/L$,血清淀粉酶 1993U/L,血脂肪酶 6116U/L。其诊断可考虑是 ()

A: 急性胆囊炎

B: 急性阑尾炎

C: 急性胰腺炎

D: 急性胃炎

答案: C

74. 用二甘醇替代丙二醇所致的假药事件是

A: 关木通事件

B: 鱼腥草事件

C: 欣弗事件

D: 亮菌甲素事件

答案: D

75. 通过抑制磷酸二酯酶,升高 cAMP 水平,加强心肌收缩力的非苷类药物是

A: 洋地黄毒苷

B: 米力农

C: 地高辛

D: 卡维地洛

答案: B

76. (2017 年真题) 患者, 男, 72 岁既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。一个月前因出现哮喘症状就诊医师布地奈德气雾剂 200 μ g bid 吸入沙丁胺醇气雾剂 100 μ g prn 吸入, 氨氯地平片 5mg qd 口服及硝酸甘油片 0.5mg prn 舌下含服治疗。

- A: 氨氯地平的不良反应
- B: 布地奈德剂量太大
- C: 硝酸甘油剂量不足
- D: 沙丁胺醇的不良反应

答案: D

77. 糖尿病合并肾病者宜首选的药物是

- A: 二甲双胍
- B: 阿卡波糖
- C: 罗格列酮
- D: 格列喹酮

答案: D

78. 缺铁性贫血最早和最常见症状是

- A: 记忆力减退
- B: 头晕
- C: 乏力、困倦、活动耐力减退
- D: 食欲不振

答案: C

79. 在脑卒中各亚型中发病率最高的疾病为 ()

- A: 原发性蛛网膜下腔出血
- B: 脑梗死
- C: 缺血性脑卒中

D: 脑出血

答案：C

80. 患者，男，65 岁，慢性咳嗽、喘息 10 余年，活动后症状明显，近 7 天症状加重入院，伴便秘，每周 2 次排便。既往有高血压病史 12 年；长期口服硝苯地平控释片 30mgqd，血压控制良好。体格检查：体温 36.6℃，P82 次/分，R22 次/分，端坐位，喘息，桶状胸，双肺叩诊呈过清音，可闻及散在干鸣音，双下肺少许湿啰音，杵状指。辅助检查：血常规 WBC $11.2 \times 10^9/L$ ，肺功能 FEV₁/FVC60%，FEV₁55%。治疗方案如下：氨溴索注射液 30mg tid ivgtt，莫西沙星氯化钠注射液 0.4g bid ivgtt，异丙托溴铵溶液 0.5mg bid 雾化吸入，布地奈德混悬液 1mg bid 雾化吸入

A: 需掌握吸入技术

B: 单独应用 ICS 减少急性发作频数

C: 偶发呼吸困难可使用短效支气管舒张剂

D: 后期发作必要时可使用 PDE-4 抑制剂

答案：B

81. 同时服用，有利于铁吸收的药物是（）

A: 维生素 B

B: 维生素 A

C: 维生素 D

D: 维生素 C

答案：D

82. 处方是医疗机构的重要医疗文书，具有

A: 法律性、技术性和经济性

B: 技术性、有效性和经济性

C: 技术性、经济性和合法性

D: 经济性、法律性和合理性

答案：A

83. 老年人退热服用贝诺酯，1 日 3 次；1 日用量不得超过

A: 2.5g

B: 1.5g

C: 2.0g

D: 3.0g

答案：A

84. 临床上将酚妥拉明 20mg、多巴胺 20mg、呋塞米 20mg 加入到 5%葡萄糖注射液 250ml 后,出现黑色沉淀。出现沉淀的原因是()

A: 多巴胺和呋塞米发生反应

B: 酚妥拉明和呋塞米发生反应

C: 酚妥拉明和多巴胺发生反应

D: 酚妥拉明在葡萄糖溶液中分解

答案：A

85. 尿中白细胞增多见于

A: 肝硬化

B: 服用磺胺药

C: 甲状腺功能亢进

D: 慢性肾盂肾炎

答案：D

86. “尽量为患者选择给药方便的药物和剂型”体现选择治疗药物的

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 有效性

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/946130020054011030>