



深圳南山人民医院

深圳市第六人民医院

Shenzhen Sixth Hospital



# 器质性精神障碍专业 知识讲座



- 功能性精神障碍 (functional mental disorders)
- 器质性精神障碍(organic mental disorders)

脑器质性精神障碍:脑器质性疾病所致的精神障碍

躯体疾病所致精神障碍:脑以外的躯体疾病所致精神障碍



# 器质性精神障碍

- 器质性精神障碍：因为脑部疾病或躯体疾病引起的精神障碍。
- 脑器质性精神障碍：脑病造成的精神障碍。脑变性病 脑血管病 脑外伤 颅内感染 癫痫等。
- 躯体疾病所致精神障碍：脑以外的躯体疾病引起的精神障碍，躯体感染 肾病等。



# 讲授内容

- 脑器质性疾病所致精神障碍概述
- 意识障碍和智能障碍
- 常见的脑器质性综合征
- 临床体现、诊疗、鉴别和治疗原则
- 阿尔茨海默病 (AD)



# 一、概 念\*

脑器质性疾病所致精神障碍：  
是一组由脑部器质性损伤引起的精神障碍，

如脑变性、脑血管疾病、颅内感染、颅脑  
创伤、颅内肿瘤、癫痫等原因直接损害  
CNS所致精神障碍的总称。



# \*概念的解释

包括：一组疾病

病因：脑部器质性损伤

体现：神经系统症状和体征 + 精神症状

预后：取决于脑部疾病

（性质、部位、范围、严重程度、病程、治疗）



# \*概念的解释：病因

- 变性：阿尔茨海默病 (Alzheimer's disease)、帕金森病、路易体痴呆
- 血管性：脑卒中、血管性痴呆
- 占位：肿瘤、硬膜下血肿
- 感染：脑炎、神经梅毒、艾滋病
- 创伤：脑外伤
- 中毒、缺氧：酒精、一氧化碳、药物
- 癫痫



# \*概念的解釋：臨床體現

神經系統

症狀、體征、試驗室陽性成果

+

精神症狀





# 脑器质性精神障碍：诊疗

## 一、临床体现：

1. 脑部疾病（症状、体征、试验室检验）
2. 多种综合征之一

## 二、严重程度：日常生活或社会功能受损

## 三、病程：精神症状的发生、发展、预后与脑部疾病有关

## 四、排除：其他原因所致精神障碍



# 脑器质性精神障碍：处理原则

- 病因治疗为主（治疗脑部原发疾病）  
作用：1、减轻或消除CNS症状和体征  
2、减轻或缓解精神症状
- 对症治疗为辅（治疗精神症状）  
安全、有效、短期



深圳南山人民医院

深圳市第六人民医院

Shenzhen Sixth Hospital



# 第一节 常见的临床综合症



# 常见的临床综合征

- 谵妄
- 痴呆
- 遗忘综合症



# 谵妄

- 谵妄：一组急性的，一过性的，广泛性的认知障碍，以意识障碍为主要特征。
- 急性起病
- 病程短
- 病变发展迅速



- 病因:

- (1) 感染

- (2) 代谢及内分泌紊乱

- (3) 电解质紊乱

- (4) 颅内损伤

- (5) 手术后的状态

- (6) 药物

- (7) 心理社会原因: 亲人丧亡 病例:



- 引起谵妄的易感原因：  
老年人、  
小朋友、  
有颅脑损伤史  
酒精依赖史



# 谵妄的临床特征



**意识障碍** 昼轻夜重，日落现象

**注意力缺陷（A字测验）**

- 认知功能急性变化
- 记忆力受损（不能记住新的信息）
- 定向力障碍（人物定向障碍）
- 知觉变化（错觉幻觉）
- 思维紊乱 言语受损

**波动性病程**

前驱症状

急性起病





# 谵妄的临床特征

## 觉醒 精神运动和睡眠障碍

- 其他情绪和焦急障碍（焦急、抑郁和愤怒）
- 神经病学异常
- 构造性失用
- 命名不能性失语
- 书写困难
- 运动异常（扑翼样震颤）
- 脑电图异常（全方面减慢）



## 诊疗:

- 急性起病
- 临床体现
- 病史、体检和试验室检验

急性起病, 意识障碍, 定向障碍, 波动性认知  
功能损害

病程: 2w-1m (10-12d)



- 女性,68岁,患慢性肾炎10余年,肾功能衰竭(氮质血症期),维持血透,近期因女儿临终,情绪低落,治疗中,忽然开始出现哭闹,类似哭丧,看到女儿来了,夜间不睡觉,吵闹,白天睡觉,拔管,不配合治疗
- 可能的诊疗?
- 原因?
- 处理?



# 怎样判断是否谵妄

- 定向障碍(时间, 地点, 人物)
- 精神运动性迟滞或者激越状态
- 妄想(被害妄想)
- 错觉幻觉(看到家眷来看他, 幻听)
- 自伤自杀
- 拒绝治疗(拔掉输液管或者引流管)
- 睡眠障碍, 病情昼轻夜重.
- 记忆障碍, 刚吃过饭不记得, 中午吃了什么?



**治疗:**      病因治疗                      对症治疗                      支持治疗

- 治疗原发病, 平静, 避光

- 激惹, 影响治疗时:

氟哌啶醇 2-10mg im st! (代谢快, 锥体外系副反应小嗜睡作用轻)

小剂量第二代抗精神病药物:

利培酮 0.5mg Bid, (症状消失后, 每天减50%的剂量)

奥氮平 2.5-5mg Qn

奎硫平 200mg Qn

谨慎使用镇定类药物




# \*智能 ( intelligence )

- 定义：接受知识和利用知识的能力
- 内容：常识、观察力、注意力、记忆力、了解力、计算力、分析力、发明力、想象力、判断推理



# 韦氏智力测验IQ等级划分





# 智能障碍

(智能各个方面的全方面低下)

1. 精神发育迟滞 (mental retardation)  
大脑发育成熟此前 (<18岁), 有害原因损害大脑, 致使智能发育受阻。





# 智能障碍

## 2. 痴呆 (dementia)

大脑发育成熟后来，致病原因  
损害大脑，造成的智能衰退。



# 痴呆

- 指较严重的 连续的认知障碍。
- 以缓慢出现的智能减退为主要特征，伴有不同程度的人格变化，但是没有意识障碍。



# 痴呆的病因

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 中枢神经系统退行性变</li> <li>• 阿尔茨海默病（AD）</li> <li>• 额颞叶痴呆（涉及pick病）</li> <li>• 帕金森病</li> <li>• 弥漫性路易小体病</li> </ul>	<p><b>营养障碍</b></p> <p>烟酸VB1缺乏</p> <p>VB12缺乏</p> <p>叶酸中毒</p>
<p><b>结缔组织病</b></p> <p>SLE</p> <p>类风湿血管炎</p>	<p><b>感染性疾病</b></p> <p>神经梅毒（麻痹性痴呆）</p> <p>HIV</p>
<p><b>药物，金属</b></p>	



# \*痴呆 (dementia syndrome)

◆ 智能障碍

◆ (主要体现,记忆力,近记忆,计算力)

◆ 人格变化 (爱好降低, 主动性差, 情感淡漠, 社会退缩)

◆ 情感异常

◆ 行为异常



## 诊疗与鉴别诊疗

- 1.慢性起病（至少**6**个月）
- 2.智能减退、记忆障碍和人格变化
- 3.意识清楚
- 4.社会功能受损



## 治疗

- 加强护理
- 抗精神病药物
- 抗抑郁药



# 遗忘综合征

- 遗忘综合征又称柯萨夫综合征，其特点是病人在乎识清楚情况下出现识记忆能力障碍，近事记忆丧失，定向力障碍，虚构、错构，顺行性或逆行性遗忘。



深圳南山人民医院

深圳市第六人民医院  
Shenzhen Sixth Hospital



## 第二节 常见的脑器质性精神障碍





深  
大





深圳南山人民医院

深圳市第六人民医院

Shenzhen Sixth Hospital



# 阿尔茨海默病

(Alzheimer's disease, AD)



# 阿尔茨海默病：概述

- 脑部进行性发展、退行性变性疾病
- 发病年龄：> 65岁
- 病程：平均5 – 23年
- 起病潜隐、发展慢、进行性加重
- 临床体现：痴呆综合征
- 预后：不可逆



**Alzheimer's**

**Disease**

**affects 5% of**

**people over 65**

**affects 20% of**

**people over 80**



# 阿尔茨海默病

## (一) 概念

阿尔茨海默病 (Alzheimer's disease, AD) 是指一组原因未明的原发性脑变性疾病。

常起病于老年或老年前期，以痴呆为主要体现。

多缓慢起病、逐渐进展。女性较男性多见，约为2或3比1。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/946232115130010224>