

2024 年辽宁省建昌县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库加答案 下载

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 高三酰甘油血症，首选的治疗药物是

- A: 贝特类
- B: ω -3 脂肪酸
- C: 烟酸
- D: 他汀类

答案：A

2. 患者，女，35 岁，因患有缺铁性贫血口服硫酸亚铁，该药物主要的不良反应是

- A: 胃肠道反应
- B: 肝毒性
- C: 肾毒性
- D: 心脏相关风险

答案：A

3. 抗凝，抗血小板治疗

- A: 血凝酶
- B: 硝苯地平
- C: 多非利特
- D: 华法林

答案：D

4. 针对单纯性酒精中毒严重患者，下列救治措施，错误的是

- A: 肌肉注射维生素 B1、维生素 B6 和烟酸各 100mg
- B: 静脉注射 5%葡萄糖注射液 100ml 和胰岛素 20U
- C: 适当补充维生素 C
- D: 静脉注射纳洛酮 0.4mg

答案：B

5. 摄入过多可增加体内血容量，促发充血性心力衰竭或高血压的是

- A: 酒
- B: 食盐
- C: 脂肪
- D: 食醋

答案：B

6. 应贮存在凉暗处的药物是

- A: 头孢拉定
- B: 托烷司琼注射剂
- C: 硫酸亚铁片
- D: 重组人促红细胞生成素

答案：B

7. 适宜餐前给药的药物是

- A: 复方铝酸铋
- B: 法莫替丁
- C: 缬沙坦
- D: 二甲双胍

答案：A

8. 胃食管反流病患者应避免服用的药物是

- A: 关托洛尔
- B: 特拉唑嗪
- C: 阿仑膦酸钠
- D: 阿司匹林

答案: C

9. 起效较慢，服用至少 3 个月才可以缓解前列腺增生症状的 5 α 还原酶抑制剂是

- A: 特拉唑嗪
- B: 非那雄胺
- C: 氟伏沙明
- D: 阿夫唑嗪

答案: B

10. 关于胆石症的患者教育，错误的是

- A: 避免快速减重和不吃早餐
- B: 有消化不良症状应做鉴别诊断
- C: 使用抗菌药物
- D: 低胆固醇饮食

答案: C

11. 质子泵抑制剂

- A: 铝碳酸镁
- B: 埃索美拉唑
- C: 多潘立酮
- D: 法莫替丁

答案：B

12. 吸烟后易出现头晕、嗜睡、疲乏等不良反应的药物是

- A: 呋塞米
- B: 西咪替丁
- C: 胰岛素
- D: 氯丙嗪

答案：D

13. 药物临床评价是指

- A: 新药临床研究在未上市以前进行的利益与风险关系的评估
- B: 新药上市以后对药品的理化性质、质量和价格的评估
- C: 对药物临床前研究的一切新药申报资料的真实性和科学性进行的评估
- D: 对药品治疗效果、不良反应、用药方案、贮存稳定性及药品经济学的评估

答案：D

14. 可致直立性低血压的抗焦虑药物为（）

- A: 阿米替林
- B: 丁螺环酮
- C: 氟西汀
- D: 劳拉西泮

答案：A

15. 患者，女，72 岁，主诉“眼干、眼红、刺激感、砂砾感”，医师初步诊断为干眼症，建议患者选用

- A: 山莨菪碱滴眼液

B: 左氧氟沙星滴眼液

C: 聚乙烯醇滴眼液

D: 吡诺克辛滴眼液

答案：C

16. 非甾体类抗炎药导致消化性溃疡病的主要机制是（）

A: 破坏胃黏膜屏障

B: 促进胃酸分泌

C: 影响胃、十二指肠协调运动

D: 抑制胃酸分泌

答案：A

17. 血栓的发生率增加的指标是

A: $INR > 3$

B: $INR > 5$

C: $INR < 3$

D: $INR < 1.5$

答案：D

18. 患者，男，67 岁，慢性哮喘 20 余年，现因哮喘急性发作就诊，首选的药物是（）

A: 异丙托溴铵气雾剂

B: 二羟丙茶碱片

C: 氨茶碱片

D: 沙丁胺醇气雾剂

答案：D

19. (2019 年真题) 合并闭角型青光眼的前列腺增生患者，不宜选用的药物是

- A: 坦索罗辛
- B: 托特罗定
- C: 多沙唑嗪
- D: 非那雄胺

答案：B

20. 滴虫性阴道炎宜选用

- A: 咪康唑
- B: 甲硝唑
- C: 庆大霉素
- D: 聚甲酚磺醛

答案：B

21. 亚硝酸盐中毒的解救药物是

- A: 氯解磷定
- B: 青霉胺
- C: 亚甲蓝
- D: 纳洛酮

答案：C

22. 患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

- A: 高钾血症
- B: 快速性房性心律失常伴传导阻滞
- C: 直立性低血压

D: 心动过缓

答案: B

23. 一位巨幼细胞性贫血患儿肌肉注射维生素 B

A: 0.049~0.20ml

B: 0.25~0.40ml

C: 0.05~0.10ml

D: 0.15~0.30ml

答案: C

24. 代表乙型肝炎病毒 e 抗原的是

A: HBcAb

B: HBsAb

C: HBeAb

D: HBeAg

答案: D

25. 噻嗪类利尿剂的主要不良反应是

A: 血尿酸升高

B: 支气管痉挛

C: 直立性低血压

D: 足踝部水肿

答案: A

26. 女性，32 岁，3 年来月经量增多，乏力、心悸。体格检查面色较苍白。血红蛋白 80g/L，呈小细胞低色素性贫血，白细胞 $7 \times 10^9 / L$ ，血小板 $120 \times 10^9 / L$ ，血清铁 $300 \mu g / L$ 。

A: 硫酸亚铁口服

B: 右旋糖酐铁肌注

C: 输血

D: 维生素 B12 肌肉注射

答案：A

27. 处方是医疗机构的重要医疗文书，具有

A: 技术性、经济性和合法性

B: 技术性、有效性和经济性

C: 经济性、法律性和合理性

D: 法律性、技术性和经济性

答案：D

28. 有家族血栓栓塞性疾病史人群禁用的痤疮药是

A: 维 A 酸

B: 米诺环素

C: 过氧化苯甲酰

D: 口服短效避孕药

答案：D

29. 抗高血压药物中，噻嗪类利尿药的主要不良反应为()。

A: 血钾减低、血钠减低、血尿酸升高

B: 房室传导阻滞，心功能抑制

C: 直立性低血压

D: 血钾增高

答案：A

30. 对于化疗药物引起的呕吐，正确的用药方法对严重呕吐，可给予

A: 苯海拉明

B: 羧甲司坦

C: 阿瑞吡坦

D: 昂丹司琼

答案: D

31. 适用于有完整子宫，仍希望有月经样出血的妇女

A: 雌孕激素连续联合用药

B: 单纯孕激素补充治疗

C: 单纯雌激素补充治疗

D: 雌孕激素序贯用药

答案: D

32. (2015 年真题) 非甾体抗炎药引起的典型药源性疾病是 ()。

A: 神经系统疾病

B: 血液系统疾病

C: 胃肠类疾病

D: 肝病

答案: C

33. 长期应用苯二氮类药物不能突然停止使用，是因为 ()

A: 首剂效应

B: 毒性反应

C: 后遗效应

D: 药物依赖

答案: D

34. 高血压患者的降压目标老年高血压 ()

A: <140 / 90mmHg

B: <120 / 80mmHg

C: <130 / 80mmHg

D: <150 / 90mmHg

答案：D

35. 所有的 UA/NSTEMI 患者均应尽早使用阿司匹林，首次服用剂量为（）

A: 150mg

B: 75mg

C: 100mg

D: 300mg

答案：D

36. （2017 年真题）痛风缓解期宜选用的治疗药物是（）

A: 阿司匹林

B: 苯溴马隆

C: 秋水仙碱

D: 泼尼松

答案：B

37. 以下粪便细胞显微镜检出物中，能提示患者大量或长期应用广谱抗生素的是

A: 红细胞

B: 上皮细胞

C: 白细胞增多

D: 真菌

答案：D

38. 孕妇的急性膀胱炎治疗时间是

- A: 3~7 日
- B: 3~5 日
- C: 10 日
- D: 1~3 日

答案：A

39. 用后不宜马上进食的剂型是()

- A: 软膏剂
- B: 含漱剂
- C: 直肠栓剂
- D: 滴眼剂

答案：B

40. 夜间咳嗽宜选用的药品是

- A: 可待因
- B: 右美沙芬
- C: 羧甲司坦
- D: 苯丙哌林

答案：B

41. 能与胃蛋白酶、胰酶、淀粉酶中的蛋白结合，减弱其助消化药效的是

- A: 食醋中的醋酸
- B: 茶叶中的鞣酸
- C: 食盐中的氯化钠
- D: 酒中的乙醇

答案：B

42. 患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。医师处方：氨氯地平片 10mgpoqd；美托洛尔缓释片 47.5mgpoqd；贝那普利片 20mgpoqd；阿司匹林肠溶片 100mgpoqd；辛伐他汀片 40mgpoqd。

- A: 阿司匹林肠溶片必须于晚上在餐后服用
- B: 阿司匹林肠溶片应整片服用，不能嚼碎
- C: 若需减量，美托洛尔缓释片可掰开服用
- D: 氨氯地平片可于早上服用

答案：C

43. 患者，男，35 岁。于午饭后即开始出现胃部疼痛，胀满食少，后感觉脐周硬结、闷痛、拒按，于 1 日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因蛋白质进食过多而导致的继发性消化不良。

- A: 乳酶生
- B: 多潘立酮
- C: 奥美拉唑
- D: 复方阿嗪米特肠溶片

答案：A

44. 有关尿沉渣管型和尿沉渣结晶的叙述正确的是

- A: 常见的尿沉渣管型有透明细胞管型、白细胞管型、红细胞管型、上皮细胞管型等
- B: 尿沉渣中的无机物沉渣主要为结晶体，多来自于食物代谢的结果
- C: 正常人尿沉渣中的磷酸盐、尿酸盐、草酸盐最为常见
- D: 尿沉渣管型是尿液中的沉渣在肾小管内聚集而成，尿液中出现管型是肾实质性病变的证据

答案：C

45. 关于头痛、偏头痛、紧张性头痛、三叉神经痛的药物治疗(对症治疗),长期精神紧张、紧张性头痛者

A: 推荐应用地西泮(安定)片

B: 乙酰氨基酚、布洛芬、阿司匹林等

C: 服用麦角胺咖啡因片、罗通定片、天麻素、苯噻啉、舒马曲坦、佐米曲坦

D: 一般可首选对乙酰氨基酚，推荐合并应用谷维素、维生素 B1

答案：A

46. 瘦肉精（克伦特罗）中毒时，可采用的解毒药是

A: 乙酰半胱氨酸

B: 乙酰胺

C: 普萘洛尔

D: 氟马西尼

答案：C

47. 患者，男，56 岁，因高血压常年服用苯磺酸氨氯地平 10mgqd，近期体检血脂指标为 LDL—C4.8mmol / L，药师应建议患者加服

A: 福辛普利

B: 叶酸

C: 阿托伐他汀

D: 二甲双胍

答案：C

48. 某患者，女性，28 岁，近半年出现面色苍白、头晕、乏力，近日头晕加重，并出现心慌、气短，到医院就诊，血常规检查示 Hb<90g / L。

A: 餐前

B: 睡前

C: 清晨

D: 餐后

答案: D

49. 下列药物中，适用于急迫性尿失禁的药物为

A: 非那雄胺

B: 米多君

C: 哌唑嗪

D: 奥昔布宁

答案: D

50. 非选择性 β -受体阻断剂的禁忌证是

A: 哮喘

B: 体位性低血压

C: 高血钾

D: 充血性心力衰竭

答案: A

51. (2017 年真题) 治疗中度痤疮宜选用 ()

A: 氢化可的松软膏

B: 维 A 酸乳膏

C: 阿昔洛韦软膏

D: 复方苯甲酸酊

答案: B

52. 应用 α -葡萄糖苷酶抑制药时注意事项错误的是

- A: 非磺酰脲类胰岛素促泌剂与 α -葡萄糖苷酶抑制药合用易出现低血糖现象
- B: 服用后常致胀气，可缓慢增加剂量和控制饮食减轻
- C: 与胰岛素或磺脲类药联合应用，可增加发生低血糖的危险
- D: 餐后服用可减少胃肠道刺激

答案：D

53. 张先生，30 岁，来药店咨询湿疹治疗药物。经询问后得知：他有多年的湿疹病史，经常购买氢化可的松软膏治疗湿疹。这次湿疹加重，足踝、小腿部、双手都有皮损分布，手部皮肤破裂并有渗出。药师应给予的正确建议是

- A: 建议改用强效外用糖皮质激素哈西奈德
- B: 建议患者就医
- C: 建议口服氢化泼尼松
- D: 建议使用炉甘石洗剂

答案：B

54. 有关一级信息的特点描述，错误的是

- A: 结论正确
- B: 含有研究的具体细节
- C: 内容比二、三级信息更新
- D: 对读者专业水平要求高

答案：A

55. （2019 年真题）配制下列化疗药时，只能选择葡萄糖注射液做溶媒的是

- A: 奥沙利铂
- B: 环磷酰胺

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 博来霉素

D: 依托泊苷

答案: A

56. 对巨幼细胞贫血者应选用 ()

A: 叶酸+维生素 B12

B: 富马酸亚铁

C: 维生素 K1

D: 甲磺酸去铁胺

答案: A

57. 与两性霉素 B 合用需要严密监测血钾

A: 碳酸氢钠

B: 链霉素

C: 强心苷

D: 酮康唑

答案: C

58. 属于润滑性泻药的是

A: 硫酸镁

B: 乳果糖

C: 开塞露

D: 番泻叶

答案: C

59. 血小板计数正常值范围是 (/L)

A: $(150 \sim 200) \times 10^{12}$

B: $(100 \sim 300) \times 10^9$

C: $(200 \sim 250) \times 10^{12}$

D: $(50 \sim 100) \times 10^9$

答案: B

60. 透析患者应用时，必须在进食的同时服用，否则无效的药物是

A: 促红细胞生成素

B: 铁剂

C: 磷结合剂

D: 维生素 D

答案: C

61. 常用于碱化尿液，促进毒性药物排泄的是

A: 麻黄碱

B: 磺胺醋酰

C: 苯巴比妥

D: 碳酸氢钠

答案: D

62. 粪外观所对应的疾病，阻塞性黄疸

A: 柏油便，黑色有光泽

B: 米泔水样

C: 白陶土便

D: 暗红果酱色

答案: C

63. 一般由葡萄糖与脂肪提供机体 NPC 的比例是

A: 150kcal: 1gN

B: NPC5: 5

C: 100kcal: 1gN

D: NPC7: 3

答案: D

64. 药品不良反应按照程度分为轻度、中度、重度三级。

A: 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无需治疗

B: 没有临床症状，无需治疗

C: 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害

D: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

答案: A

65. (2017 年真题) 配制青霉素输液的适宜溶媒是 ()

A: 50%葡萄糖注射液

B: 低分子右旋糖酐注射液

C: 0.9%氯化钠注射液

D: 复方氯化钠注射液

答案: C

66. 误服药物、服药过量以及滥用药物均可引起药物中毒。常见的致中毒药物包括西药、中药和农药。随着化学制药工业的不断发展，如果管理和解救措施跟不上，药物中毒的危害即将越来越严重。

A: 早期、适量、联合给药

B: 早期、足量、单次给药

C: 早期、足量、联合给药

D: 早期、足量、重复给药

答案: D

67. 治疗社区获得性肺炎时，由于我国的肺炎链球菌对其耐药率高，不单独使用的药物为

- A: 红霉素
- B: 青霉素
- C: 莫西沙星
- D: 头孢唑林

答案：A

68. （2015 年真题）使用前应用青霉素进行皮试的药物是（ ）。

- A: 阿莫西林胶囊
- B: 注射用头孢曲松钠
- C: 左氧氟沙星片
- D: 阿奇霉素片

答案：A

69. 起效较慢，需要 3 个月才可以改善由前列腺增生所导致的尿路梗阻，减少残余尿量的 5 α 还原酶抑制剂是

- A: 特拉唑嗪
- B: 氟伏沙明
- C: 非那雄胺
- D: 阿夫唑嗪

答案：C

70. 可迅速崩解和释放药物的制剂

- A: 泡腾片剂
- B: 滴丸剂
- C: 透皮贴剂
- D: 膜剂

答案：A

71. 药物过量、毒性反应、继发反应、后遗效应、致畸、致癌、致突变作用归属

- A: 药动学相互作用
- B: 药物制剂因素
- C: 药理作用
- D: 药物的使用

答案：C

72. 异环磷酰胺的主要毒副作用是（）

- A: 肺纤维化
- B: 心脏毒性
- C: 出血性膀胱炎
- D: 溶血性尿毒症

答案：C

73. （2019 年真题）患者，男，64 岁，因右足肿痛就诊。查体：右脚第一趾关节红肿，触痛明显。化验结果：血尿酸 $588.1 \mu\text{mol/L}$ 。诊断为急性痛风性关节炎。患者合并高血压、高胆固醇血症、冠心病，目前正服用氢氯噻嗪片 25mgqd、美托洛尔缓释 47.5mgqd、赖诺普利片 20mgqd、辛伐他汀片 10mgqd、阿司匹林肠溶片 100mgqd。

- A: 阿司匹林片（300mg）
- B: 贝诺酯片
- C: 双氯芬酸钠片
- D: 别嘌醇片

答案：C

74. 患者，男，67 岁，患带状疱疹，皮疹愈合后出现持续 1 个月左右疼痛，可给予的止痛药物是

- A: 加巴喷丁
- B: 吗啡
- C: 山莨菪碱
- D: 布洛芬

答案：A

75. 肝肾两种途径清除的药物在严重肝功能减退时血药浓度升高

- A: 一般无须调整剂量
- B: 尽可能避免使用
- C: 须谨慎使用，必要时减量给药
- D: 必须减量应用

答案：D

76. 用药后有可能出现球后视神经炎的抗结核药是

- A: 利福平
- B: 吡嗪酰胺
- C: 乙胺丁醇
- D: 链霉素

答案：C

77. 美国食品药品监督管理局 (FDA) 根据药品对胎儿的危害，将妊娠用药分为 A、B、C、D、X 五个级别头孢曲松属于药物妊娠毒性分级

- A: D 级
- B: C 级
- C: A 级
- D: B 级

答案：D

78. 癫痫持续状态的好发年龄段为（）

- A: 6 岁以内
- B: 55 岁以上
- C: 1 岁以内及 65 岁以上
- D: 65 岁以上

答案：C

79. 在夏季，用前宜其置入冰水或冰箱中 10~20 分钟；给药后 1~2 小时内尽量不排尿

- A: 阴道栓剂
- B: 膜剂
- C: 泡腾片
- D: 气雾剂

答案：A

80. 氟乙酰胺中毒最突出的表现是

- A: 腐蚀性口腔炎
- B: 抽搐
- C: 呕吐物有蒜臭味
- D: 口内有金属味

答案：B

81. （2017 年真题）患毒，27 岁，妊娠 20 周，出现发热体温最高达 38.5℃，体格检查：肾区叩痛，经相关实验室检查诊断为急性肾盂肾炎，宜选用的药物是（）

- A: 阿米卡星

- B: 甲硝唑
- C: 阿奇霉素
- D: 头孢噻肟钠

答案：D

82. 缺铁性贫血最早和最常见症状是

- A: 记忆力减退
- B: 头晕
- C: 乏力、困倦、活动耐力减退
- D: 食欲不振

答案：C

83. 药物相互作用使药物吸收增加的联合用药事例是

- A: 铁剂联用维生素
- B: 阿托品联用普萘洛尔
- C: 青蒿素联用乙胺嘧啶
- D: 硝苯地平联用普萘洛尔

答案：A

84. 解热且具有抑制血小板凝集作用、可能增加出血危险的是

- A: 吲哚美辛
- B: 贝诺酯
- C: 阿司匹林
- D: 布洛芬

答案：C

85. 以下有关肌酸激酶检查值升高的临床意义中，最正确的是

- A: 诊断痛风

- B: 诊断急慢性白血病
- C: 诊断心肌梗死
- D: 诊断恶性贫血

答案：C

86. 治疗幽门螺杆菌感染的一线方案，其典型组方中不包括的药物是

- A: 甲硝唑
- B: 西咪替丁
- C: 胶体果胶铋
- D: 克拉霉素

答案：B

87. 患者，男，64 岁，因“右足肿痛”就诊。查体：右足第一跖趾关节红肿、触痛明显。化验结果：血尿酸 $588.1 \mu\text{mol/L}$ 。诊断为“急性痛风性关节炎”。患者既往有高血压、高胆固醇血症、冠心病病史，目前正服用氢氯噻嗪片 25mgqd、美托洛尔缓释片 47.5mgqd、赖诺普利片 20mgqd、辛伐他汀片 10mgqd、阿司匹林肠溶片 100mgqd。

- A: 双氯芬酸钠片
- B: 阿司匹林片（300mg）
- C: 别嘌醇片
- D: 贝诺酯片

答案：A

88. 强烈刺激作用致胃肠黏膜腐蚀性损伤的是

- A: 氯化钠
- B: 氯化锌
- C: 磷化锌

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 磷化氢

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/947112011141010024>