

2024 年福建省芗城区《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题王牌题库（B 卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 急性缺血性脑卒中发作，应用溶栓药治疗时间窗是在发病后

- A: 24 小时内
- B: 8 小时内
- C: 12 小时内
- D: 3 小时内

答案：D

2. 与可待因合用，不仅加重便秘，还可增加麻痹性肠梗阻和尿潴留危险的是

- A: 硫酸镁
- B: 美沙酮
- C: 阿托品
- D: 哌替啶

答案：C

3. 出现流感样症候群，寒战、发热的药物是

- A: 利福平
- B: 对氨基水杨酸
- C: 链霉素
- D: 异烟肼

答案：A

4. 患者，男，63 岁，2 型糖尿病病史 20 年，现服用二甲双胍 0.5g，一日 3 次；阿卡波糖 0.1g，一日 3 次；吡格列酮 30mg，一日 1 次。既往高血压病史 5 年，冠心病病史 5 年，心功能 I 级轻度肾功能不全，长期服用贝那普利和阿司匹林。

- A: 肠道外用药宜静脉给药，不主张肌肉注射
- B: 静脉用药剂量为口服的 1 / 2 时即可达到同样疗效
- C: 静脉注射时宜用葡萄糖注射液稀释
- D: 应用前应询问药物过敏史，对磺胺药过敏者不宜使用

答案：C

5. 属于 III 类抗心律失常药

- A: 普萘洛尔
- B: 胺碘酮
- C: 奎尼丁
- D: 利多卡因

答案：B

6. 可与硝酸酯类药物发生相互作用的是

- A: 呋塞米
- B: 坎利酮
- C: 伐地那非
- D: 丙酸睾酮

答案：C

7. 袢利尿药中，最易引起耳毒性，且可发生永久性耳聋的药物是()

- A: 布美他尼
- B: 托拉塞米

C: 依他尼酸

D: 呋塞米

答案：C

8. 常在用药 1 周后出现刺激性干咳的药物是

A: 卡托普利

B: 氨氯地平

C: 哌唑嗪

D: 地高辛

答案：A

9. 属于二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体阻断剂的是

A: 奥扎格雷

B: 替罗非班

C: 阿司匹林

D: 氯吡格雷

答案：D

10. 胺碘酮抗心律失常的作用机制是()

A: 加快普肯耶纤维和窦房结的传导速度

B: 缩短心房和普肯耶纤维的动作电位时程、有效不应期

C: 阻滞心肌细胞的 Na

D: 提高窦房结和普肯耶纤维的自律性

答案：C

11. 可用于预防 HIV（人免疫缺陷病毒）感染者巨细胞病毒视网膜炎的药物是

A: 阿昔洛韦

- B: 更昔洛韦
- C: 金刚烷胺
- D: 恩替卡韦

答案: B

12. 主要作用于聚合态的微管，抑制微管解聚

- A: 氟尿嘧啶
- B: 高三尖杉酯碱
- C: 紫杉醇
- D: 顺铂

答案: C

13. 可用于洋地黄中毒导致的室上性心律失常的药物首选

- A: 奎尼丁
- B: 美西律
- C: 氟西汀
- D: 苯妥英钠

答案: D

14. 治疗金黄色葡萄球菌感染导致的骨髓炎首选

- A: 头孢克洛
- B: 克林霉素
- C: 青霉素
- D: 阿米卡星

答案: B

15. 常用于引产或催产，亦用于产后出血和子宫复原不全

- A: 缩宫素

B: 地诺前列酮

C: 普拉睾酮

D: 麦角新碱

答案: A

16. (2021 年真题) 患儿。女，14 岁。因出现尿频、尿急、尿痛症状 2 天就诊，诊断为急性膀胱炎，患儿既往有癫痫病史，宜选用的治疗药物是 ()。

A: 阿奇霉素

B: 呋喃妥因

C: 环丙沙星

D: 青霉素 G

答案: B

17. 以肠内营养乳剂 (TPF-D) 作为唯一营养来源的患者，推荐剂量为一日

A: 30ml/kg

B: 10ml/kg

C: 20ml/kg

D: 40ml/kg

答案: A

18. 治疗冠状动脉痉挛所致的变异型心绞痛最为有效的药物是 ()

A: 氨氯地平

B: 硝酸异山梨酯

C: 比索洛尔

D: 氯沙坦

答案: A

19. 用于高血压、冠心病、心绞痛的是

- A: 米非司酮
- B: 绒促性素
- C: 噻嘧啶
- D: 硝苯地平

答案：D

20. 哌唑嗪常见的不良反应是

- A: 首剂量低血压反应
- B: 降压效应减弱
- C: 口干、便秘、发热
- D: 钠水潴留

答案：A

21. 有促进骨骼致密作用，可用于绝经期妇女治疗骨质疏松的药物是

- A: 短效口服避孕药
- B: 雌激素
- C: 孕激素
- D: 长效避孕药

答案：B

22. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1 期）伴出血。13C 呼气试验：Hp（+）。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次 / 日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次 / 日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次 / 日；注射用蛇毒血凝酶 1KU，静脉注射，1 次 / 日；替米沙坦 40mg，口服，1 次 / 日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次 / 日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次 / 日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次 / 日。

- A: 硝苯地平缓释片
- B: 埃索美拉唑
- C: 克拉霉素
- D: 胶体果胶铋胶囊

答案：B

23. 疥疮及阴虱病可选用（）

- A: 阿达帕林
- B: 酮康唑
- C: 维 A 酸
- D: 林旦霜

答案：D

24. 头孢噻吩

- A: 用于非典型病原体感染
- B: 脑脊液中浓度较高，酶稳定性高，适用于严重脑膜感染
- C: 与庆大霉素合用于铜绿假单胞菌感染时不能混合静脉滴注
- D: 肾毒性较大

答案：D

25. 关于地芬诺酯的叙述，不正确的是()

- A: 长期应用可产生依赖性
- B: 可吸附肠内的细菌及有毒气体
- C: 用于急、慢性功能性腹泻
- D: 能提高肠张力，减少肠蠕动

答案：B

26.（2020 年真题）通过抑制 A 型单胺氧化酶，减少去甲肾上腺素、5-HT 及多巴胺的降解，增强去甲肾上腺素、5-HT 和多巴胺能神经功能，发挥抗抑郁作用的药物是

- A: 度洛西汀
- B: 吗氯贝胺
- C: 阿米替林
- D: 舍曲林

答案：B

27. 地高辛最适合用于()

- A: 心律失常
- B: 肺源性心脏病
- C: 急性心力衰竭
- D: 心力衰竭伴有快速心室率的心房颤动的心功能不全

答案：D

28. 服用他汀类药物需要监测肌毒性，该临床指标是

- A: 尿淀粉酶
- B: 肌酸激酶
- C: 乳酸脱氢酶
- D: 碱性磷酸酶

答案：B

29.（2021 年真题）患者，女，27 岁，孕 34 周。诊断为轻度便秘，宜选用的药物是（）

- A: 乳果糖

B: 普芦卡必利

C: 硫酸镁

D: 蓖麻油

答案：A

30. 是第一个 P2Y₁₂ 拮抗剂，可抑制血小板聚集的是()

A: 华法林

B: 尿激酶

C: 噻氯匹定

D: 肝素

答案：C

31. 肾上腺皮质功能不全采用

A: 糖皮质激素一般剂量长期疗法

B: 糖皮质激素大剂量冲击疗法

C: 抗结核病药与糖皮质激素合用

D: 糖皮质激素小剂量代替疗法

答案：D

32. 根据糖皮质激素分泌的昼夜节律，慢性病治疗如何给药对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制较轻

A: 上午 8 时左右

B: 晚餐前

C: 中午 12 时左右

D: 下午 4 时左右

答案：A

33. 下列不属于一线抗结核药的是

- A: 链霉素
- B: 乙硫异烟胺
- C: 利福平
- D: 吡嗪酰胺

答案：B

34. 氨茶碱的主要平喘机制为()

- A: 直接舒张支气管
- B: 抑制腺苷酸环化酶
- C: 激活鸟苷酸环化酶
- D: 抑制磷酸二酯酶

答案：D

35. 急性心肌梗死引起的急性室性心动过速可选用

- A: 美西律
- B: 利多卡因
- C: 硝苯地平
- D: 阿托品

答案：B

36. 茶碱浓度 $42 \mu\text{g/ml}$ 时会出现

- A: 心动过速、心律失常
- B: 为有效的治疗浓度
- C: 呼吸、心跳停止
- D: 恶心、呕吐、失眠

答案：C

37. 口服不可嚼碎，否则易引起严重口腔溃疡的助消化药物是

- A: 西咪替丁
- B: 氢氧化铝
- C: 乳酸菌素
- D: 胰酶

答案：D

38. 可用于防治泌尿系统结石的是

- A: 氯化钙
- B: 氯化钾
- C: 氯化钠
- D: 枸橼酸钾

答案：D

39. 用于治疗耐氯喹和耐多种药物虫株所致的恶性疟，也可用于治疗间日疟的药物是

- A: 双氢青蒿素
- B: 蒿甲醚
- C: 乙胺嘧啶
- D: 奎宁

答案：D

40. 地高辛的中毒血清浓度为()

- A: $>2\text{ng/ml}$
- B: $>50\text{ng/ml}$
- C: $>20\text{ng/ml}$
- D: $>5\text{ng/ml}$

答案：A

41. 多数 ACEI 的起效时间在 1 小时，作用时间可以维持

- A: 36 小时
- B: 12 小时
- C: 24 小时
- D: 6 小时

答案：C

42. 全身性红斑狼疮宜用

- A: 氢化可的松
- B: 泼尼松
- C: 地塞米松
- D: 倍他米松

答案：B

43. 干扰核酸生物合成的抗恶性肿瘤药是

- A: 多柔比星
- B: 5-氟尿嘧啶
- C: 环磷酰胺
- D: 吉非替尼

答案：B

44. 可引起肌痛、骨关节病损、跟腱炎症和跟腱断裂的药物是()

- A: 环丙沙星
- B: 灰黄霉素
- C: 克霉唑
- D: 咪康唑

答案：A

45. 长期大量使用可导致肝功能异常

- A: 四环素可的松
- B: 氯霉素
- C: 更昔洛韦
- D: 利巴韦林

答案：D

46. 使用痤疮治疗药物不会出现

- A: 中枢神经毒性
- B: 皮肤色素沉着
- C: 红斑
- D: 眼周局部刺激

答案：A

47. 可与甲硫咪唑发生药物相互作用的是

- A: 抗凝药
- B: 阿司匹林
- C: 头孢类抗生素
- D: 噻嗪类利尿剂

答案：A

48. （2018 年真题）不属于血管紧张素转换酶抑制剂（ACEI）类药物作用特点是（）

- A: ACEI 可引起反射性心率加快
- B: ACEI 禁用于双侧肾动脉狭窄者
- C: ACEI 对肾脏有保护作用
- D: ACEI 可防治高血压患者心肌细胞肥大

答案：A

49. (2017 年真题) 属于抗孕激素类药, 用于终止早孕的药物是 ()

- A: 黄体酮
- B: 左炔诺孕酮
- C: 甲地孕酮
- D: 米非司酮

答案: D

50. 患者, 男, 63 岁, 慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 患者。因近来夜间喘息加重就诊。对其因迷走神经张力过高所致的气道狭窄, 宜选用的药物是

- A: 白三烯调节剂
- B: 沙丁胺醇
- C: 异丙托溴铵
- D: 吸入型糖皮质激素

答案: C

51. 可作为心血管不良事件一级和二级预防的药物是 ()

- A: 对乙酰氨基酚
- B: 双氯芬酸
- C: 阿司匹林
- D: 塞来昔布

答案: C

52. 可以与雌激素受体结合, 但不具有雌激素对生殖系统的影响, 能增加雌激素的活性对骨代谢产生激动效应, 产生抗骨质疏松作用的药物是

- A: 雷洛昔芬

- B: 降钙素
- C: 骨化三醇
- D: 阿仑膦酸钠

答案：A

53. 用于先兆性流产和习惯性流产

- A: 米非司酮
- B: 地塞米松
- C: 雷洛昔分
- D: 黄体酮

答案：D

54. (2019 年真题) 某患儿因高烧就医，诊断为重症流感，医生对患儿进行治疗的同时，建议与患儿有密切接触的家属预防服用奥司他韦。

关于奥司他韦预防用药的说法，正确的是 ()

- A: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日两次，每次 75mg
- B: 应于密切接触流感患儿的 3 天以内预防服用，每日两次，每次 150mg
- C: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 150mg
- D: 应于密切接触流感患儿的 2 天以内预防服用，每日一次，每次 75mg

答案：D

55. 不属于抗代谢抗肿瘤药的是

- A: 阿糖胞苷
- B: 氟尿嘧啶
- C: 甲氨蝶呤
- D: 环磷酰胺

答案：D

56. (2021 年真题) 用于验光配镜屈光度检查前散瞳的药物是 ()

- A: 毛果芸香碱滴眼液
- B: 雷珠单抗注射液
- C: 硫酸阿托品眼用凝胶
- D: 聚乙二醇滴眼液

答案：C

57. 可使前者作用加强或延长的是

- A: 红霉素
- B: 氯丙嗪
- C: 他莫昔芬
- D: 维生素 C

答案：B

58. 可缩小皮脂腺，减轻上皮细胞分化 ()

- A: 维 A 酸
- B: 阿达帕林
- C: 异维 A 酸
- D: 过氧苯甲酰

答案：C

59. 幼儿甲状腺素不足易患

- A: 呆小病
- B: 单纯性甲状腺肿
- C: 侏儒症
- D: 黏液性水肿

答案：A

60. 沙库巴曲缬沙坦钠片说明书的部分内容节选如下,请结合问题作答。

- A: 从 ACEI 转换为沙库巴曲缬沙坦时,应停用 ACEI36 小时后方可转换
- B: 沙库巴曲缬沙坦不能与阿替洛尔、吲哚美辛或西咪替丁合用
- C: 轻、中度肾功能不全患者可使用沙库巴曲缬沙坦
- D: 轻、中度肝功能损害患者可使用沙库巴曲缬沙坦

答案：B

61. 口服治疗体癣,毛发癣,对深部真菌无效的药物是()

- A: 灰黄霉素
- B: 咪康唑
- C: 环丙沙星
- D: 克霉唑

答案：A

62. 选择性抑制 COX-2 的药物是

- A: 布洛芬
- B: 塞来昔布
- C: 吲哚美辛
- D: 对乙酰氨基酚

答案：B

63. 氯霉素与剂量和疗程无关的严重不良反应是()

- A: 二重感染
- B: 严重的再生障碍性贫血
- C: 可逆的性骨髓抑制

D: 灰婴综合征

答案: B

64. 外用无效，口服治疗体癣，毛发癣的药物是

A: 克霉唑

B: 灰黄霉素

C: 咪康唑

D: 制霉菌素

答案: B

65. 属于抗胆碱药的是()

A: 哌仑西平

B: 氢氧化铝

C: 奥美拉唑

D: 雷尼替丁

答案: A

66. (2018 年真题) 肝素过量所致出血的解救药物是 ()

A: 酚磺乙胺

B: 维生素 K

C: 鱼精蛋白

D: 蛇毒血凝酶

答案: C

67. 洛伐他汀的作用是()

A: 主要影响胆固醇合成

B: 主要影响胆固醇吸收

C: 影响脂蛋白合成、转运及分解

D: 主要影响甘油三酯合成

答案：A

68. 关于万古霉素，描述错误的是

A: 作用机制是阻碍细菌细胞壁的合成

B: 可用于对甲氧西林耐药的葡萄球菌引起的感染

C: 肾功能不全者无需调整剂量

D: 属于杀菌剂

答案：C

69. 四环素联用钙剂使

A: 增加麦角中毒的风险

B: 调整抗凝血药的剂量

C: 口服吸收减少

D: 肝毒性增加

答案：C

70. 雌激素替代疗法应在绝经后几年之内开始

A: 8

B: 4

C: 6

D: 2

答案：C

71. 抗菌药物联合用药的目的不包括

A: 减少耐药性的发生

B: 提高疗效

C: 扩大抗菌范围

D: 延长作用时间

答案：D

72. 不属于浓度依赖性抗菌药物的是

A: 达托霉素

B: 氟喹诺酮类

C: 氨基糖苷类

D: 阿奇霉素

答案：D

73. 有肾功能不全史的患者解热镇痛应慎用布洛芬，其主要原因是用药后可能发生

A: 重度肝损伤

B: 尿潴留和水肿

C: 过敏反应

D: 急性肾衰竭

答案：B

74. 美沙拉秦迟释制剂的释放具有 pH 依赖性，外层包衣溶解在回肠远端，此处需 pH

A: 小于或等于 4

B: 大于或等于 6

C: 在 4~5

D: 在 1~2

答案：B

75. 长期使用可引起维生素 B12 缺乏的药物是

A: 阿司匹林

B: 头孢哌酮

C: 华法林

D: 二甲双胍

答案：D

76. 雷尼替丁用于治疗消化性溃疡的机制是

A: 竞争性拮抗 H1 受体

B: 抑制胃壁细胞 H⁺, K⁺-ATP 酶

C: 直接中和胃酸

D: 竞争性拮抗 H2 受体

答案：D

77. 关于使用依折麦布的说法，错误的是

A: 成人剂量一次 10mg。一日 1 次

B: 可单独服用或与他汀类联合应用

C: 剂量超过 10mg / d 对降低 LDL 水平无增效作用

D: 需空腹服用

答案：D

78. 癫痫部分性发作首选 ()。

A: 奥卡西平

B: 氯巴占

C: 乙琥胺

D: 苯妥莫钠

答案：A

79. 氨甲环酸的作用机制是 ()

A: 促使毛细血管收缩

- B: 激活凝血因子
- C: 刺激血小板生成
- D: 对抗纤维蛋白溶解

答案：D

80. 属于胆固醇吸收抑制剂的调节血脂药是()

- A: 辛伐他汀
- B: 烟酸
- C: 非诺贝特
- D: 依折麦布

答案：D

81. (2019 年真题) 老年患者长期大剂量使用可引起骨折的药物是 ()

- A: 胶体果胶铋
- B: 复方碳酸钙
- C: 替普瑞酮
- D: 奥美拉唑

答案：D

82. (2016 年真题) 抗乙型肝炎病毒的药品是

- A: 奥司他韦
- B: 利巴韦林
- C: 伊曲康唑
- D: 拉米夫定

答案：D

83. (2015 年真题) 长期使用可使血钾水平升高的药品是 () 。

- A: 呋塞米

B: 氨苯蝶啶

C: 乙酰唑胺

D: 呋达帕胺

答案: B

84. 以下不属于呋塞米的不良反应的是

A: 胃肠道反应

B: 耳毒性

C: 高尿酸血症

D: 降低血糖

答案: D

85. 对淋病、梅毒可作为首选的是

A: 红霉素

B: 土霉素

C: 氯霉素

D: 青霉素

答案: D

86. 匹维溴铵在使用中应注意

A: 痉挛性麻痹与脑损伤的婴幼儿禁用

B: 对食管有刺激性，需整片吞服

C: 感染性腹泻早期无效，后期可辅助治疗

D: 糖尿病患者避免使用

答案: B

87. 治疗钙缺乏症()

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 依降钙素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/947113133050010024>