

2024 辽宁省东港市《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库大全附答案（ 培优 B 卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 妊娠糖尿病患者，为控制血糖，主张使用

A: 二甲双胍

B: 胰岛素

C: 格列苯脲

D: 瑞格列奈

答案：B

2. 属于胞嘧啶抗代谢类药物的是

A: 甲氨蝶呤

B: 长春瑞滨

C: 巯嘌呤

D: 吉西他滨

答案：D

3. 以下关于胰高血糖素样肽-1 受体激动剂使用的描述，错误的是

A: 口服需快速通过胃肠道吸收的药物在注射本品前至少 1 小时服用

B: 建议与 DPP-4 抑制剂联用

C: 不良反应主要发生于胃肠道

D: 存在发生胰腺炎的风险

答案：B

4. 关于孟鲁司特钠临床使用注意事项的说法，正确的

- A: 通过抑制磷酸二酯酶的活性而发挥作用
- B: 孟鲁司特钠使用后可能会导致嗜酸性粒细胞增多
- C: 孟鲁司特钠对阿司匹林诱发的哮喘无效
- D: 孟鲁司特钠起效快，适用于哮喘急性发作

答案：B

5. 可引起性欲减退的是

- A: 舍尼通
- B: 非那雄胺
- C: 多沙唑嗪
- D: 十一酸睾酮

答案：B

6. 主要阻滞电压依赖性的钠通道，属于二苯并氮

- A: 卡马西平
- B: 苯巴比妥
- C: 苯妥英钠
- D: 加巴喷丁

答案：A

7. 在痛风急性期，应禁用的抗痛风药

- A: 舒林酸
- B: 秋水仙碱
- C: 别嘌醇
- D: 布洛芬

答案：C

8. 易造成持久性低血糖症，老年糖尿病患者慎用的降血糖药是

- A: 胰岛素
- B: 甲苯磺丁脲
- C: 格列吡嗪
- D: 格列本脲

答案：D

9. (2018 年真题) 关于莫西沙星作用特点的说法, 错误的是 ()

- A: 莫西沙星可经验性用于社区获得性肺炎的治疗
- B: 莫西沙星抗菌谱广, 对常见革兰阴性及革兰阳性菌均具有良好抗菌活性
- C: 莫西沙星属于浓度依赖型抗菌药物
- D: 莫西沙星组织分布广泛, 但不能透过血脑屏障

答案：D

10. 抑制二氢叶酸还原酶的药物是 ()

- A: 磺胺嘧啶
- B: 克拉霉素
- C: 甲氧苄啶
- D: 庆大霉素

答案：C

11. 苯巴比妥与口服抗凝药合用 ()

- A: 子宫内膜突破性出血
- B: 代谢加速而导致意外怀孕
- C: 代谢加快而失效
- D: 抑制排酸作用

答案：C

12. 作用机制为直接改变破骨细胞的形态学，从而抑制其功能，首先阻止破骨细胞的前体细胞黏附于骨组织，进而对破骨细胞的数量和活性产生直接的影响，该药物是

- A: 降钙素
- B: 雷洛昔芬
- C: 骨化三醇
- D: 阿仑膦酸钠

答案：D

13. 风湿性心脏病重度二尖瓣狭窄宜

- A: 停用洋地黄
- B: 快速洋地黄化
- C: 常规剂量的洋地黄
- D: 不宜使用洋地黄

答案：D

14. 治疗高血压危象的药物是()

- A: 普萘洛尔
- B: 硝普钠
- C: 依那普利
- D: 可乐定

答案：B

15. 以下哪项不是雷洛昔芬的禁忌症

- A: 有子宫内膜癌症状和体征者
- B: 心力衰竭患者
- C: 肝肾功能不全者

D: 正在或既往患有静脉血栓栓塞性疾病者

答案: B

16. 属于治疗中枢性尿崩症用药的是

A: 甲巯咪唑

B: 醋酸去氨加压素

C: 左甲状腺素

D: 生长抑素

答案: B

17. (2021 年真题) 用于验光配镜屈光度检查前散瞳的药物是 ()

A: 硫酸阿托品眼用凝胶

B: 聚乙二醇滴眼液

C: 雷珠单抗注射液

D: 毛果芸香碱滴眼液

答案: A

18. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡(A1 期)伴出血。13C 呼气试验：Hp(+)。患者既往有高血压病史 8 年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。

医嘱：0.9%氯化钠注射液 100ml+注射用埃索美拉唑钠 40mg，静脉滴注，2 次 / 日；阿莫西林胶囊 1g，口服，2 次 / 日；克拉霉素缓释胶囊 0.5g，口服，2 次 / 日；注射用蛇毒血凝酶 1U，静脉滴注，1 次 / 日；替米沙坦 40mg，15 服，1 次 / 日；硝苯地平缓释片 30mg，口服，1 次 / 日；美托洛尔 12.5mg，口服，2 次 / 日；胶体果胶铋胶囊 100mg，口服，3 次 / 日。

A: 美托洛尔

B: 替米沙坦

C: 胶体果胶铋胶囊

D: 埃索美拉唑钠

答案: C

19. 下列选项中，属于四环素禁用的人群有()

A: 妊娠期妇女

B: 中、老年人

C: 月经期妇女

D: 精神病患者

答案: A

20. 易产生耐药性,极少单独用药,临床常与两性霉素 B 合用的抗真菌药物是

A: 特比萘芬

B: 氟康唑

C: 卡泊芬净

D: 氟胞嘧啶

答案: D

21. 属于水杨酸类解热镇痛药的是

A: 对氨基水杨酸钠

B: 阿糖腺苷

C: 阿司匹林

D: 布洛芬

答案: C

22. 治疗普通型奈瑟球菌脑膜炎是()

A: 柳氮磺吡啶

B: 复方磺胺甲噁唑

C: 磺胺嘧啶

D: 磺胺米隆

答案: C

23. 四环素的抗菌作用机制

A: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制移位酶的活性

B: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制肽酰基转移酶的活性

C: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制蛋白质的合成

D: 影响胞浆膜通透性

答案: C

24. 毛果芸香碱的作用特点不包括

A: 防止激光手术后的反应性眼压升高

B: 用于白内障人工晶状体植入手术中缩瞳

C: 减少房水生成

D: 术后以抵消睫状肌麻痹剂或散瞳药的作用

答案: C

25. (2015 年真题) 李女士来到药房咨询，主诉最近服用下列药品后体重有所增加，请药师确认可能增加体重的药品是 ()。

A: 阿司匹林

B: 辛伐他汀

C: 二甲双胍

D: 米氮平

答案: D

26. 嵌入 DNA 干扰转录 RNA 的抗恶性肿瘤药是

- A: 多柔比星
- B: 5-氟尿嘧啶
- C: 吉非替尼
- D: 环磷酰胺

答案：A

27. 患者男性，29 岁，阴茎头部出现下疳两个月就诊。有不洁性接触史。临床诊断为梅毒。立即给予青霉素注射治疗，十分钟后患者出现胸闷，全身瘙痒、面部发麻，查体：血压 85/60mmHg，脉率 110 次/分。

- A: 减少药物剂量
- B: 给予糖皮质激素
- C: 吸氧，给予普萘洛尔
- D: 给予肾上腺素

答案：D

28. 患者，女性，63 岁，诊断为支气管哮喘急性发作，使用布地奈德、沙丁胺醇吸入、茶碱治疗。

- A: 依诺沙星可抑制茶碱代谢
- B: 可使用头孢类口服剂型，与氨茶碱无明显药物相互作用
- C: 左氧氟沙星与茶碱相互作用较小
- D: 可使用大环内酯类药物如红霉素

答案：D

29. 治疗轻、中型糖尿病的是

- A: A 和 B 均无效
- B: 二甲双胍
- C: 胰岛素
- D: 磺酰脲类

答案：B

30. 通过抑制 Ca

A: 普萘洛尔

B: 硝苯地平

C: 硝酸甘油

D: 胍乙啶

答案：B

31. (2020 年真题) 可用于预防 HIV (人免疫缺陷病毒) 感染者巨细胞病毒视网膜炎的药物是

A: 金刚烷胺

B: 恩替卡韦

C: 更昔洛韦

D: 阿昔洛韦

答案：C

32. 室上性心动过速、颅脑损伤、颅内占位性病变、慢性阻塞性肺疾病患者禁用()。

A: 曲马多

B: 哌替啶

C: 吗啡

D: 芬太尼

答案：B

33. 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

A: 若出现低血糖反应，应立即饮用蔗糖水

B: 可能出现的不良反应有腹痛，腹泻，腹胀

C: 服药过程中适当补充维生素 B

D: 服药期间不要饮酒，以免引起低血糖

答案：A

34. 适用于各型高血压，对原发性或肾性高血压均有效的是

A: 卡托普利

B: 拉贝洛尔

C: 肼屈嗪

D: 氢氯噻嗪

答案：A

35. 舌下含服吸收迅速完全，血液透析清除率低的药物是()

A: 地尔硫

B: 普萘洛尔

C: 维拉帕米

D: 硝酸甘油

答案：D

36. 老年人对苯二氮革类药较为敏感，用药后可致平衡功能失调，觉醒后可发生步履蹒跚、思维迟钝等症状，在临床上被称为

A: “宿醉”现象

B: 老年期痴呆

C: 震颤麻痹综合征

D: 戒断综合征

答案：A

37. 抗瘤谱较广，恶性淋巴瘤疗效显著，还可治疗自身免疫性疾病的药物是()

- A: 丝裂霉素
- B: 奥沙利铂
- C: 塞替派
- D: 环磷酰胺

答案：D

38. 小剂量时有抑制血栓形成作用的是

- A: 塞来昔布
- B: 对乙酰氨基酚
- C: 阿司匹林
- D: 吲哚美辛

答案：C

39. 容易引起周围神经炎的抗结核药物的是

- A: 对氨基水杨酸
- B: 异烟肼
- C: 利福平
- D: 链霉素

答案：B

40. 对大多数肠杆菌科细菌和厌氧菌有活性，但对铜绿假单胞菌、不动杆菌及革兰阳性菌（尤其是肠球菌和耐青霉素肺炎球菌）的活性不及其他碳青霉烯类药物的是

- A: 厄他培南
- B: 西司他丁
- C: 美罗培南

D: 亚胺培南

答案：A

41. 对铜绿假单胞菌作用较强的头孢菌素是()

A: 头孢唑林

B: 头孢噻吩

C: 头孢哌酮

D: 头孢拉定

答案：C

42. 可用于治疗非何杰金(非霍奇金)淋巴瘤的单克隆抗体是()

A: 贝伐单抗

B: 利妥昔单抗

C: 西妥昔单抗

D: 曲妥珠单抗

答案：B

43. 属于长效避孕药的是

A: 米非司酮

B: 氯地孕酮

C: 左炔诺孕酮

D: 壬苯醇醚

答案：B

44. 可用于慢性活动性肝炎的治疗()

A: 复方氨基酸注射液(18AA)

B: 复方氨基酸注射液(3AA)

C: 赖氨酸

D: 精氨酸

答案：B

45. 阿托品禁用于

A: 青光眼

B: 遗尿症

C: 胆绞痛

D: 全身麻醉前给药

答案：A

46. 下列治疗恶性肿瘤的药物中，对骨髓造血功能几乎没有抑制作用的是

A: 长春碱

B: 泼尼松

C: 表柔比星

D: 顺铂

答案：B

47. (2017 年真题) 抑制细菌核酸合成 ()

A: 磺胺甲噁唑甲氧苄啶

B: 头孢吡肟

C: 头孢米诺

D: 利福喷丁

答案：D

48. 伊伐布雷定发挥作用特异性针对

A: 窦房结

B: 房室传导

C: 心房传导

D: 心室传导

答案: A

49. 对肝素的正确描述是

A: 可抑制血小板聚集

B: 可以口服给药

C: 仅在体内有抗凝作用

D: 直接抑制凝血因子的活化

答案: D

50. 作用于造血祖细胞，促进其增殖和分化，促进成熟细胞向外周血释放的药品是

A: 维生素 B12

B: 人血白蛋白

C: rhGM-CSF

D: 硫酸亚铁

答案: C

51. 重度阻滞 Na⁺通道的药物是

A: 普萘洛尔

B: 普罗帕酮

C: 利多卡因

D: 普鲁卡因胺

答案: B

52. 可用于治疗铜绿假单胞菌感染的药物是()

A: 头孢米诺

- B: 头孢他啶
- C: 头孢呋辛
- D: 头孢唑林

答案：B

53. 患者，男，24 岁，诊断为右睾丸非精原细胞瘤术后，治疗方案为依托泊苷+顺铂+博来霉素。

- A: 妊娠期妇女
- B: 慢性胃炎
- C: 心肝肾功能严重障碍者
- D: 骨髓功能抑制者

答案：B

54. 用于严重饥饿性酮症严重者的治疗方案是

- A: 可予 10%~25%葡萄糖注射液滴注，每日 100g 葡萄糖即可控制病情
- B: 一般采用 50%葡萄糖注射液 20~40ml，快速静脉注射
- C: 应用高渗透压的 25%-50%葡萄糖注射液滴注，常与 20%甘露醇注射液联合应用
- D: 一般可给予 10%~25%葡萄糖注射液静脉滴注，并同时补充体液

答案：A

55. 主要不良反应为踝部关节水肿，晨轻午重的药物是

- A: 氨氯地平
- B: 硝酸甘油
- C: 卡托普利
- D: 地高辛

答案：A

56. 下列属于 β 受体阻断剂的是

- A: 美托洛尔
- B: 阿利吉仑
- C: 螺内酯
- D: 卡托普利

答案：A

57. 卡马西平适用于

- A: 急慢性脑功能不全
- B: 原发性失眠
- C: 神经源性尿崩症
- D: 内分泌失调引起的失眠

答案：C

58. 长期大量与阿司匹林或其他 NSAID 合用时，可明显增加肾毒性的是

- A: 吲哚美辛
- B: 塞来昔布
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 阿司匹林

答案：C

59. 属于凝血因子 Xa 直接抑制剂的是

- A: 肝素
- B: 依诺肝素
- C: 华法林
- D: 利伐沙班

答案：D

60. 有关可乐定的叙述，错误的是

- A: 可乐定可用于治疗高血压危象
- B: 可乐定可用于治疗重度高血压
- C: 可乐定可用于治疗中度高血压
- D: 可乐定是中枢性降压药

答案：B

61. 下列哪种头孢菌素为口服剂型

- A: 头孢替安
- B: 头孢吡肟
- C: 头孢哌酮
- D: 头孢克洛

答案：D

62. 患者女，55 岁。晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院，查体：138 / 90mmHg，心率 120 次 / 分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

- A: 1 周
- B: 4 周
- C: 3 周
- D: 2 周

答案：D

63. 患者，男，5 岁，体重 25kg，有癫痫病史、青霉素过敏史。因急性胆囊炎合并腹腔感染住院治疗，体征和实验室检查，白细胞计数 $15.8 \times 10^9 / L$ ，体温 $39.5^{\circ}C$ ，肝、肾功能正常，医师处方美罗培南静脉滴注(说明书规定儿童剂量为一次 $20mg / kg$)。

- A: 左乙拉西坦
- B: 地西泮
- C: 乙琥胺
- D: 丙戊酸钠

答案：D

64. 影响毛细血管通透性的促凝血药是

- A: 鱼精蛋白
- B: 维生素 K
- C: 血凝酶
- D: 卡巴克络

答案：D

65. 脂溶性强，能透过血—脑屏障，可通过阻断 M1 受体产生镇静、失眠、意识混乱和认知障碍等不良反应，用于治疗膀胱过度活动症用药的是

- A: 托特罗定
- B: 索利那新
- C: 奥昔布宁
- D: 黄酮哌酯

答案：C

66. 目前治疗哮喘夜间发作和哮喘维持治疗的理想方案是：糖皮质激素联合应用

- A: 沙美特罗
- B: 沙丁胺醇
- C: 特布他林
- D: 氨茶碱

答案：A

67. 氟尿嘧啶、卡培他滨属于()

- A: DNA 多聚酶抑制剂
- B: 二氢叶酸还原酶抑制剂
- C: 胸腺核苷合成酶抑制剂
- D: 核苷酸还原酶抑制剂

答案：C

68. 口服索他洛尔作为抗心律失常药，其疗效和不良反应发生率均呈剂量依赖性，具有最佳获益风险比的用法是一天两次，一次

- A: 80mg
- B: 160mg
- C: 120mg
- D: 40mg

答案：C

69. 某病人服用溴己新，不会出现下列哪种不良反应

- A: 体位性低血压
- B: 腹泻
- C: 支气管痉挛
- D: 心动过速

答案：B

70. 长期大量服用维生素 D 会出现

- A: 严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活
- B: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

C: 疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

D: 视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

答案：B

71. 对 α 和 β 受体均有阻断作用的药物是

A: 拉贝洛尔

B: 酚妥拉明

C: 普萘洛尔

D: 去甲肾上腺素

答案：A

72. (2018 年真题) 不属于血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI) 类药物作用特点是 ()

A: ACEI 可引起反射性心率加快

B: ACEI 禁用于双侧肾动脉狭窄者

C: ACEI 对肾脏有保护作用

D: ACEI 可防治高血压患者心肌细胞肥大

答案：A

73. 用于抗乙肝病毒的药物是

A: 西多福韦

B: 阿昔洛韦

C: 扎那米韦

D: 拉米夫定

答案：D

74. 对磺胺类药物有严重过敏史的患者可选择的利尿剂是 ()

- A: 托拉塞米
- B: 布美他尼
- C: 呋塞米
- D: 依他尼酸

答案：D

75. 中度致吐性化疗药所引起恶心呕吐的治疗应选

- A: 5-HT₃ 受体阻断剂+口服地塞米松
- B: 5-HT₃ 受体阻断剂+口服地塞米松+阿瑞吡坦
- C: 每日化疗前，应用 5-HT₃ 受体阻断剂或口服地塞米松
- D: 奥美拉唑+口服地塞米松

答案：A

76. 烟酸缺乏时发生

- A: 糙皮病
- B: 成人佝偻病
- C: 脚气病
- D: 夜盲症

答案：A

77. 与其他抗真菌药无交叉耐药性的棘白霉素类抗真菌药是

- A: 卡泊芬净
- B: 阿糖胞苷
- C: 两性霉素
- D: 氟胞嘧啶

答案：A

78. 30 岁，农民，头昏乏力，粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白 60g/L。诊断：钩虫感染，缺铁性贫血。

- A: 驱钩虫
- B: 驱钩虫+口服铁剂
- C: 驱钩虫+注射右旋糖苷铁
- D: 输血+注射右旋糖苷铁

答案：B

79. 手术后出血和血友病辅助治疗宜选用

- A: 维生素 K
- B: 硫酸亚铁
- C: 鱼精蛋白
- D: 氨甲环酸

答案：D

80. 对 I 型和 II 型单纯疱疹病毒作用最强的是

- A: 奥司他韦
- B: 阿糖腺苷
- C: 阿昔洛韦
- D: 干扰素

答案：C

81. 为快速杀菌药的抗菌药是()

- A: 万古霉素和林可霉素
- B: 万古霉素和氯霉素
- C: 万古霉素和替考拉宁
- D: 氯霉素和替考拉宁

答案：C

82. (2020 年真题) 餐后 1~2 小时、睡前或胃部不适时服用的抗酸剂是

- A: 兰索拉唑
- B: 枸橼酸铋钾
- C: 铝碳酸镁
- D: 米索前列醇

答案: C

83. 下列常用于防止癌症化疗引起呕吐的糖皮质激素是

- A: 泼尼松
- B: 泼尼松龙
- C: 地塞米松
- D: 甲泼尼龙

答案: C

84. (2017 年真题) 主要降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇的调血脂药是 ()

- A: 瑞舒伐他汀
- B: 阿昔莫司
- C: 利血平
- D: 依折麦布

答案: A

85. 抑酸剂西咪替丁可引起的典型不良反应是

- A: 定向力障碍
- B: 血糖升高
- C: 血尿酸升高

专业《执业药师之西药学专业二》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 低镁血症

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/948022127042007022>