

产房知识模考试题及答案

1、胎头吸引器助产时负压应控制在（ ）

- A、200 mmHg以内
- B、300 mmHg以内
- C、100 mmHg以内
- D、400 mmHg以内
- E、500 mmHg以内

答案：B

2、何种项目才能称为科研成果()

- A、获得“科技成果鉴定证书”的项目
- B、未结题的项目
- C、已成功申报的项目
- D、任何结题的项目
- E、申报了科技成果鉴定的项目

答案：A

3、当患者对于出院后的适应感到信心缺乏时，下列护理措施何者不合适()

- A、让患者看到自己进步的情况
- B、强化患者角色
- C、给予鼓励、赞赏
- D、动员其家属给予鼓励、赞赏
- E、让患者了解自己目前所拥有的能力

答案：B

4、测量宫底高度时嘱孕妇排空膀胱后取什么体位()

- A、头低脚高位
- B、半坐卧位
- C、截石位
- D、平卧位
- E、侧卧位

答案：D

5、郭女士，37岁，左下腹肿块多年，如孕12周大小、囊形，排便后突感左下腹持续性疼痛，继而肿块稍有增大，拒按，考虑为（ ）

- A、囊肿内出血
- B、囊肿内感
- C、囊肿破裂路
- D、蒂扭转

E、恶性变

答案：D

6、观察危重症患者时，应首先观察（ ）

A、T、P、R、BP体温、脉搏、血压、呼吸

B、各种管道

C、意识状态的改变

D、有无脱水酸中毒

E、肢体活动情况

答案：A

7、臀位胎膜早破时首先（ ）

A、观察羊水性状

B、报告医生

C、可活动

D、听胎心

E、绝对卧床休息

答案：E

8、积极稳定的情绪是体现护士的（ ）

A、道德素质

B、专业素质

C、人文素质

D、文化素质

E、身体素质

答案：C

9、关于母乳喂养的评价，除下列哪项外均是正确的（ ）

A、哺乳姿势正确，母婴舒适

B、保证产妇合理营养、休息、精神愉快

C、喂哺方法正确，婴儿安全

D、喂哺时间、频率正确

E、母乳喂养宣传教育全面

答案：B

10、大量输入库存血后容易出现（ ）

A、碱中毒和低血钾

B、酸中毒和低血钾

C、碱中毒和高血钾

D、高血钠和低血钾

E、酸中毒和高血钾

答案：E

11、急性淋病的首选药物为()

A、链霉素

B、甲硝唑

C、磺胺

D、青霉素

E、庆大霉素

答案：D

12、下列哪些不可能是晚期产后出血的直接原因()

A、胎儿过小

B、子宫复旧不全

C、剖宫产伤口裂开

D、胎盘残留

E、蜕膜残留

答案：A

13、输血前准备中错误的是()

A、取回的血一般在4小时内输完

B、从血库取出的血如太冷，应放在温水中加温

C、血型鉴定及交叉配血试验

D、2人进行“三查八对”

E、从血库取出的血如太冷，可在室温下放置复温后再输注

答案：B

14、进行挤奶前不能喝的饮料是()

A、热开水 E 热奶茶

B、咖啡

C、热果汁

D、牛奶

答案：B

15、不孕伴有痛经的妇女常发生()

A、卵巢囊肿

B、多囊卵巢综合征

C、子宫内膜异位

D、子宫内膜结核

E、子宫肌瘤

答案：C

16、关于外阴尖锐湿疣，不恰当的是（ ）

- A、由 HPV 感染引起
- B、大小阴唇、会阴及肛周组织均为尖锐湿疣的好发部位
- C、治疗后容易复发
- D、即使反复发生也不会恶变
- E、有不洁的性生活史、多个性伴侣者最易感染

答案：D

17、根据病区清洁卫生要求，病房地面应 1 日（ ）

- A、3 扫 2 拖
- B、5 扫 1 拖
- C、3 扫 1 拖
- D、3 扫 3 拖
- E、5 扫 2 拖

答案：E

18、胎位异常的正确护理（ ）

- A、可以多次的进行收转胎头
- B、协助医生进行阴道检查
- C、做好剖宫产术前准备
- D、嘱产妇朝胎肢方向侧卧，有利胎儿头前转
- E、子宫口未开全，嘱产妇向下用力

答案：D

19、护理项目申报流程第一步应是（ ）

- A、填写申请书报送科教科
- B、科教科转发项目申报通知、指南及申报表格
- C、科教科、院学术委员会审查
- D、主管院领导审阅、加盖印

答案：B

20、女性患者，66 岁，外阴瘙痒久治不愈，局部见丘疹结节，临床诊断为外阴鳞状细胞癌 Ia 期，下列何项为最佳治疗方案（ ）

- A、放疗
- B、外阴广泛切除术
- C、外阴根治术及双侧度股沟深、浅淋巴结清扫术
- D、单侧外阴切除术
- E、放疗缩小病灶后再手术治疗

答案：B

21、应用宫内节育器的适应证是（ ）

- A、重度宫颈糜烂
- B、已婚健康妇女
- C、不规则的阴道流血
- D、子宫黏膜下肌瘤
- E、重度贫血

答案：A

22、大量输入库存血时应警惕（ ）

- A、低血钾
- B、碱中毒
- C、酸中毒
- D、高血钾
- E、高钙

答案：D

23、孕妇缺铁的主要原因是（ ）

- A、铁的需要量增加
- B、铁的吸收率降低
- C、铁的流失量增加
- D、铁的摄入量减少
- E、铁的消耗量增加

答案：A

24、诱发早产最常见的原因是（ ）

- A、子宫过度膨胀及胎盘因素
- B、子宫畸形
- C、下生殖道及泌尿道感染
- D、胎膜早破、绒毛膜羊膜炎
- E、妊娠合并症与并发症

答案：D

25、有关导尿管相关感染的护理正确的有（ ）

- A、长期留置导尿管者普通引流袋每周更换1次
- B、抗反流引流袋每周更换2次
- C、长期留置导尿管者需要进行膀胱冲洗
- D、翻身时注意勿扭曲、打折
- E、引流管道高于膀胱水平

答案：D

26、妇科病房-级护理患者平均比例为 60%以上的病区，护士与实际开放床位(收治患者数)之比为()

- A、 $\geq 2.0:1$
- B、 $\geq 0.5:1$
- C、 $\geq 0.6:1$
- D、 $\geq 1.0:1$
- E、 $\geq 0.4:1$

答案：C

27、孕产妇转院时不需要评估孕产妇的是()

- A、生命体征及病情
- B、转运途中可能出现的问题
- C、孕产妇的生活用品及护理用品是否准备好
- D、自理能力

答案：C

28、高泌乳素血症的最特征性表现是()

- A、溢乳
- B、头痛、眼花及视觉障碍
- C、性功能改变
- D、不育
- E、月经紊乱

答案：A

29、护理新技术、新业务开展工作流程的第一步是()

- A、制订方案
- B、确立主题
- C、性质界定及可行性论证
- D、人员培训
- E、仪器设备的准备

答案：C

30、母婴同室要求母亲和婴儿 1 天 24 小时在一一起， 因治疗、护理等分离的时间不超过()小时

- A、1 小时
- B、4 小时
- C、2 小时
- D、半小时

E、不能离开

答案：A

31、女性:40岁，体检发现子宫肌瘤，已行肌瘤剔除手术，术后病检示“子宫肉瘤”。最常见的子宫肉瘤类型是（ ）

A、淋巴管内间质肉瘤

B、恶性苗勒管混合瘤

C、高度恶性间质肉瘤

D、低度恶性间质肉瘤

E、平滑肌肉瘤

答案：E

32、对高危妊娠的管理错误的是（ ）

A、建档上报

B、实施系统规范管理、预约、跟踪服务

C、跟一般孕妇一样对待

D、做好高危诊室安全管理，包括人员、设备、流程

答案：C

33、下列哪项不是输液的不良反应（ ）

A、静脉炎

B、空气栓塞

C、发热反应

D、溶血反应

E、肺水肿

答案：D

34、会阴擦洗/冲洗顺序为（ ）

A、大腿内侧上1/3-阴阜-大阴唇-小阴唇-会阴-肛门周围，2遍

B、阴阜-大阴唇-小阴唇-大腿内侧上1/3-会阴肛门周围，2遍

C、小阴唇-大阴唇-阴阜-大腿内侧上1/3-肛门周围-会阴，2遍

D、大阴唇-小阴唇-阴阜-大腿内侧上1/3-会阴-肛门周围，2遍

E、小阴唇-大阴唇-阴阜-大腿内侧上1/3-会阴-肛门周围，2遍

答案：E

35、慢性宫颈炎最常用的治疗方法是（ ）

A、手术治疗

B、口服抗生素

C、药物治疗

D、物理治疗

E、肌肉注射抗生素

答案：D

36、新生儿生理性体重下降的正常指标是：出生后第1周内会有体重下降，这种体重下降不会超过出生体重的（ ）

A、6%

B、9%

C、8%

D、7%

E、10%

答案：E

37、配药前要检查的项目不包括（ ）

A、批号

B、用法

C、有效期

D、药品标签

E、剂量

答案：B

38、孕期体操的好处（ ）

A、帮助消化

B、锻炼肌肉韧性与弹力，为自然分娩做准备

C、训练呼吸

D、保持体形

答案：B

39、拟开展的新技术、新项目所需的医疗仪器、药品等须提供（ ）

A、《生产许可证》

B、《项目合格证》

C、《药品安全证》

D、《项目开发证》

答案：A

40、产房护士办公室属于（ ）

A、半限制区

B、可以自由进入

C、限制进入

D、限制区

E、非限制区

答案：A

41、产妇产后宫缩痛时应如何指导()

- A、大声喊叫
- B、用哌替啶
- C、用热水袋敷曲
- D、一直不喂母乳
- E、指导产妇及家属学会给子宫按摩

答案：E

42、子痫发作时，首要的护理措施是()

- A、保持呼吸道通畅
- B、左侧卧位
- C、监测生命体征
- D、保持绝对安静
- E、静脉滴注硫酸镁

答案：A

43、孕期营养脂肪含量占总能量的()

- A、10%~20%
- B、40%~50%
- C、20%~30%
- D、30%~40%

答案：C

44、绝经综合征的特征性表现是()

- A、焦虑易怒
- B、失眠
- C、头痛
- D、月经紊乱
- E、潮热

答案：E

45、人流术时患者突然出现恶心、呕吐、面色苍白、胸闷、大汗淋漓伴血压下降，首先考虑什么()

- A、空气栓塞
- B、疼痛
- C、失血性休克
- D、羊水栓塞
- E、人工流产综合征

E

46、孕妇最常见的肝炎()

- A、戊型肝炎
- B、乙型肝炎
- C、丁型肝炎
- D、丙型肝炎
- E、甲型肝炎

答案：B

47、母婴交接时，下列哪项不是评估的内容()

- A、分娩方式
- B、母婴基本情况
- C、有无内科产科合并症及并发症
- D、家属的配合程度
- E、婴儿性别

答案：D

48、交接班必须认真负责，接班者()着装整齐上班进行交接

- A、提前 5 分钟
- B、提前 10 分钟
- C、提前 15 分钟
- D、正点接班
- E、提前 30 分钟

答案：C

49、以下哪此患者应进行一级护理()

- A、婴幼儿
- B、器官移植、大面积烧伤
- C、严重创伤
- D、化疗
- E、高热、大出血

答案：E

50、发泡性药物渗漏后的局部临床表现为：初期为红、肿、热、痛等炎症症状，()天后开始剧痛，皮肤出现水疱，甚至溃疡等化学烧伤样改变

- A、10~15
- B、4~7
- C、1~3
- D、20

、7~14

答案：E

51、王女士，49岁，不规则阴道流血、流液半年。检查：子宫颈为菜花样组织，子宫体大小正常，活动差，考虑宫颈癌，为确诊应做哪项检查（）

- A、阴道镜检查
- B、子宫颈和颈管活体组织检查
- C、子宫颈刮片细胞学检查
- D、分段诊刮
- E、碘实验

答案：B

52、利凡诺用于引产的剂量一般不超过（）

- A、100 mg
- B、300 mg
- C、150 mg
- D、250 mg
- E、200 mg

答案：C

53、预防产后抑郁的关键是什么（）

- A、警惕有伤害行为，加强看护
- B、满足产妇的一切需求
- C、对产妇多加关心和爱护、做好心理护理
- D、使用抗抑郁药物治疗
- E、营造好的休息场所，母婴分开休息

答案：C

54、急性肾盂肾炎首选抗生素是（）

- A、青霉素
- B、红霉素
- C、土霉素
- D、羧苄西林
- E、四环素

答案：D

55、一般输液患者普通钢针拔针后需按压几分钟（）

- A、3分钟
- B、4分钟
- C、10分钟

、5 分钟

E、2 分钟

答案：D

56、护士指导孕妇监测胎动。下列哪项宣传教育内容不要()

A、每天早、中、晚自行计数胎动各 1 小时，3 小时胎动之和乘以 4 得到 12 小时的胎动计数

B、胎动<10 次/12 小时为胎动减少，是胎儿缺氧的重要表现

C、临床常见胎动消失 12 小时后胎心消失，应予警惕

D、胎动过顿或胎动减少均为胎儿缺氧征象

E、每天监测胎动可预测胎儿安危

答案：C

57、如遇到急危重患者，应()

A、立即报告管床医生

B、立即报告护士长

C、立即通知二线医生，必要时通知三线医生，并报当班护士长

D、立即通知值班医生

E、立即报告护理部、医务部

答案：C

58、四步触诊双手放于先露两侧核对入盆程度，以下哪项不是检查目的()

A、胎产式

B、羊水情况

C、胎先露部是否衔接

D、子宫大小

E、胎先露

答案：B

59、关于诊刮术，下列说法正确的是()

A、用宫颈钳固定子宫颈，无须用探针探测子宫底深度

B、若需分段诊刮应先刮子宫腔，再刮子宫颈内膜

C、刮匙由内向外沿子宫腔四壁、子宫底及两侧有次序地将内膜刮出

D、根据检验项目留取标本，刮出的子宫内膜全部固定于 95%乙醇中，送病理检查

E、刮宫时，应反复刮取，尽量彻底刮净内膜，避免取材过少

答案：C

60、接班时发现的问题由交班者负责，交班后的问题由谁负责()

A、医生和护士

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/948046021026007014>