

2023-24 年广东省湘桥区《执业药师之西药学专业二》考试王牌题库带答案解析

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2020 年真题）可引起心脏 Q-T 间期延长的药物是

- A: 头孢呋辛
- B: 左氧氟沙星
- C: 磺胺甲噁唑
- D: 克林霉素

答案：B

2. 以下属于胰高糖素样肽-1 受体激动剂的是

- A: 吡格列酮
- B: 利拉鲁肽
- C: 瑞格列奈
- D: 二甲双胍

答案：B

3. 糖皮质激素临床用于治疗()

- A: 血小板减少症
- B: 肺结核
- C: 低血压
- D: 胃溃疡

答案：A

4. 防止急性血栓形成的首选药物是

- A: 维生素 K1
- B: 香豆素类
- C: 肝素
- D: 维生素 B12

答案：C

5. 促胃肠动力药是()

- A: 肾上腺素
- B: 熊去氧胆酸
- C: 甲氧氯普胺
- D: 阿托品

答案：C

6. 属于血管紧张素 II 受体阻断剂的是

- A: 普萘洛尔
- B: 硝苯地平
- C: 氯沙坦
- D: 卡托普利

答案：C

7. 治疗立克次体感染选用

- A: 庆大霉素
- B: 红霉素
- C: 磺胺嘧啶
- D: 多西环素

答案：D

8. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌Ⅱ级，同侧腋下淋巴结 1/18，免疫组化：ER（-），PR（-），Her（+）。肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。下列关于多柔比星的说法中错误的是

- A: 典型不良反应是骨髓抑制和心脏毒性
- B: 对增殖和非增殖细胞均有杀伤作用
- C: 曾用过表柔比星的患者可更换多柔比星
- D: 属于蒽环类抗肿瘤药物

答案：C

9. 阻断白三烯受体，起效缓慢，作用较弱，仅适用于轻、中度哮喘和哮喘稳定控制的药物是（）

- A: 茶碱
- B: 沙美特罗
- C: 孟鲁司特
- D: 氟替卡松

答案：C

10. 多柔比星与可能致肝功损害的药物配伍使用，可能（）

- A: 导致坏死性结肠炎
- B: 增加心脏毒性
- C: 易产生沉淀
- D: 增加肝毒性

答案：D

11. （2020 年真题）关于肝素和低分子肝素作用特点的说法，错误的是

- A: 肝素与低分子肝素相比，起效快失效也快
- B: 皮下给药，低分子肝素的生物利用度接近 100%

C: 低分子肝素抗凝作用维持时间较长，可以一日 1 次或 2 次给药

D: 肝素与低分子肝素均可使用硫酸鱼精蛋白迅速逆转抗凝作用

答案：D

12. 袢利尿药可增强强心苷对心脏的毒性，这是因为袢利尿药可以造成

A: 低钠血症

B: 低镁血症

C: 低血压

D: 低钾血症

答案：D

13. 西沙必利的典型不良反应是

A: 嗜睡、倦怠等锥体外系反应

B: 恶心、呕吐

C: Q-T 间期延长

D: 肝肾功能损害

答案：C

14. 下述保肝药物中可导致低钾血症的是

A: 复方甘草酸苷

B: 门冬氨酸鸟氨酸

C: 多烯磷脂酰胆碱

D: 还原型谷胱甘肽

答案：A

15. 治疗可能引起中枢神经系统毒性，包括精神状态改变、肌阵挛和癫痫发作，故不应用于治疗脑膜炎的是

A: 亚胺培南

- B: 西司他丁
- C: 厄他培南
- D: 美罗培南

答案：A

16. 干扰敏感菌有丝分裂，对深部真菌无效的药物是

- A: 灰黄霉素
- B: 氟胞嘧啶
- C: 两性霉素 B
- D: 伏立康唑

答案：A

17. 长期、单一应用 β

- A: 耐药性
- B: 暂时性低血糖
- C: 支气管痉挛
- D: 头痛

答案：A

18. 对羟甲基戊二酰辅酶 A (HMC-CoA) 还原酶抑制作用最强的是

- A: 洛伐他汀
- B: 普伐他汀
- C: 阿托伐他汀
- D: 辛伐他汀

答案：C

19. 长期大量服用维生素 E 会出现

- A: 视物模糊、乳腺肿大、类流感样综合征、胃痉挛

B: 低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重下降、肝脏肿大、肾脏损害、骨硬化

C: 头痛、眼花、烦躁、心律失常、妇女经血不止

D: 颅内压增高、夜尿增多、毛发干枯或脱落、皮肤干燥或瘙痒、体重减轻

答案：A

20. 与西地那非合同，可导致严重低血压的药品是()。

A: 硝酸甘油

B: 甲睾酮

C: 丙酸睾酮

D: 非那雄胺

答案：A

21. 易引起低血钾的利尿药是

A: 山梨醇

B: 氨苯蝶啶

C: 阿米洛利

D: 氢氯噻嗪

答案：D

22. 下列哪项是避免奥沙利铂的剂量依赖性神经系统毒性，避免出现咽喉痉挛等严重后果的措施

A: 禁食热饮热水

B: 禁食冷饮冷水、接触凉物

C: 用生理盐水做溶剂

D: 禁止接触塑料制品

答案：B

23. 其缓释混悬液制剂应空腹服用的是

- A: 氨曲南
- B: 克拉霉素
- C: 阿奇霉素
- D: 红霉素

答案：C

24. 属于白三烯受体阻断剂的是

- A: 孟鲁司特
- B: 奥关拉唑
- C: 乙酰半胱氨酸
- D: 右美沙芬

答案：A

25. (2019 年真题) 育龄女性在无防护的性生活或避孕失败 72 小时内，宜使用的口服紧急避孕药物是 ()

- A: 左炔诺孕酮 (1
- B: 十一酸睾酮 (40mg)
- C: 复方醋酸环内孕酮 (35 μ g/2mg)
- D: 炔雌醇去氧孕烯 (30 μ g/150 μ g)

答案：A

26. 蛋白结合率较高 (>70%) 的头孢菌素类是

- A: 头孢噻肟
- B: 头孢曲松
- C: 头孢吡肟
- D: 头孢呋辛

答案：B

27. 胰岛素依赖型重症糖尿病需

- A: 吡格列酮
- B: 阿卡波糖
- C: 西格列汀
- D: 胰岛素皮下注射

答案：D

28. 对铜绿假单胞菌有较强作用的药物是

- A: 氯唑西林
- B: 阿莫西林
- C: 美西林
- D: 哌拉西林

答案：D

29. 可导致视神经炎，治疗期间应监测眼部视力的抗结核药是

- A: 乙胺丁醇
- B: 利福平
- C: 利福喷丁
- D: 吡嗪酰胺

答案：A

30. 用于治疗射血分数低的慢性心力衰竭

- A: 阿托品
- B: 沙库巴曲缬沙坦
- C: 阿利吉仑
- D: 胺碘酮

答案：B

31. (2015 年真题) 属于多巴胺 D2 受体阻断剂的是 () 。

- A: 法莫替丁
- B: 多潘立酮
- C: 氯苯那敏
- D: 奥美拉唑

答案：B

32. 主要降低血中胆固醇且具有首过效应的是

- A: 普萘洛尔
- B: 氯贝丁酯
- C: 洛伐他汀
- D: 苯扎贝特

答案：C

33. 下列哪种氨基酸与螺内酯合用时可导致血钾升高

- A: 精氨酸
- B: 赖氨酸
- C: 谷氨酸
- D: 门冬氨酸

答案：A

34. 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：
二甲双胍片口服 500mg，bid；阿卡波糖片口服 50mg，tid。

- A: 可能出现的不良反应有腹痛，腹泻，腹胀
- B: 现有方案不存在低血糖的风险
- C: 用药期间应定期检查空腹血糖、尿糖、尿酮体及肝、肾功能

D: 服药期间不要饮酒，以免引起低血糖

答案：B

35. 可用于治疗伤寒的药物是

A: 氟喹诺酮类

B: 四环素类

C: 青霉素类

D: 氨基糖苷类

答案：A

36. 茶碱浓度 15-20ug/ml 时可出现

A: 为有效的治疗浓度

B: 心动过速、心律失常

C: 呼吸、心跳停止

D: 恶心、呕吐、失眠

答案：D

37. 下述不属于抗病毒药物禁忌证的是()

A: 相应药物过敏者禁用

B: 妊娠期妇女禁用利巴韦林

C: 糖尿病、高血压患者禁用

D: 严重中性粒细胞减少者禁用更昔洛韦

答案：C

38. 下列哪种药物能抑制尿酸生成的是

A: 秋水仙碱

B: 呋塞米

C: 丙磺舒

D: 别嘌醇

答案: D

39. 葡萄球菌感染的角膜炎可选用

A: 多黏菌素 B 滴眼液

B: 夫西地酸滴眼剂

C: 金霉素眼膏

D: 1% 泼尼松滴眼液

答案: B

40. (2018 年真题) 属于贝丁酸类的调节血脂药是 ()

A: 依折麦布

B: 辛伐他汀

C: 烟酸

D: 非诺贝特

答案: D

41. 6~12 岁儿童甲状腺功能减退症，左甲状腺素每日完全替代剂量为

A: $4 \mu\text{g} / \text{kg}$

B: $25 \mu\text{g}$

C: $5 \mu\text{g} / \text{kg}$

D: $6 \mu\text{g} / \text{kg}$

答案: A

42. 临床上最常用的强心苷类正性肌力药是 ()

A: 地高辛

B: 依那普利

C: 多巴酚丁胺

D: 米力农

答案: A

43. 患者，女，67 岁，入院后行左侧髋关节置换术，术前 12 小时皮下注射低分子肝素预防深静脉血栓。术后患者情况稳定，继续使用低分子肝素，住院第 7 天出院。

A: 能刺激脂蛋白脂肪酶的释放，加速血液循环中脂蛋白的清除

B: 通过增强抗凝血酶Ⅲ（AT-III）的活性，抑制凝血因子Ⅱa 和 Xa 发挥抗凝作用

C: 能使凝血级联的丝氨酸蛋白酶失活

D: 体外试验具有直接的抗凝活性，可抑制体外凝血过程

答案: B

44. 下述不属于抗血小板类药物的是

A: 磷酸二酯酶抑制剂

B: 血栓素 A₂（TXA₂）抑制剂

C: 二磷酸腺苷 P₂Y₁₂ 受体激动剂

D: 非特异性纤溶酶原激活剂

答案: D

45. 稳定型和不稳定型心绞痛都可选用

A: 硝苯地平

B: 普萘洛尔

C: 维拉帕米

D: 地尔硫

答案: C

46. 临床常用，起效最快的硝酸酯类药物是

- A: 硝酸甘油
- B: 5-单硝酸异山梨酯
- C: 硝酸异山梨西旨
- D: 戊四硝酸

答案：A

47. 具有强大的抗凝血因子XA 功能及微弱的抗凝血酶作用,可用于预防深静脉血栓形成的药物是()

- A: 阿加曲班
- B: 那屈肝素钙
- C: 华法林
- D: 尿激酶

答案：B

48. 氯吡格雷应避免与奥美拉唑联合应用,因为两者竞争共同的肝药酶,该肝药酶是()。

- A: CYP2D6
- B: CYP286
- C: CYP2C19
- D: CYP2E1

答案：C

49. 患者,女,55岁,临床诊断为2型糖尿病。目前药物治疗方案如下:二甲双胍片口服500mg, bid; 阿卡波糖片口服50mg, tid。

- A: 餐后半小时
- B: 餐前2小时
- C: 餐前1分钟
- D: 餐后1小时

答案：C

50. 具有成瘾性的中枢性镇咳药是()。

- A: 右美沙芬
- B: 可待因
- C: 苯丙哌林
- D: 氯化铵

答案：B

51. 抑制叶酸合成的抗癌药物是

- A: 甲氨蝶呤
- B: 环磷酰胺
- C: 阿糖胞苷
- D: 顺铂

答案：A

52. 有明显肾毒性的药物是

- A: 庆大霉素
- B: 诺氟沙星
- C: 青霉素
- D: 四环素

答案：A

53. 作用于微管的抗肿瘤药物是

- A: 顺铂
- B: 依托泊苷
- C: 来曲唑
- D: 紫杉醇

答案：D

54. 与 α_1 受体阻断药无相互作用的药物是()

- A: 西咪替丁
- B: 第三代头孢菌素
- C: 卡马西平
- D: 地尔硫

答案：B

55. 患者，女，62 岁。有高血压病史 14 年，伴变异型心绞痛，最近频繁发生阵发性室上性心动过速，宜选用()

- A: 普萘洛尔
- B: 硝苯地平
- C: 尼莫地平
- D: 维拉帕米

答案：D

56. 下列哪个药物没有散瞳作用

- A: 托吡卡胺
- B: 毛果芸香碱
- C: 去氧肾上腺素
- D: 硫酸阿托品

答案：B

57. (2015 年真题) 患者，男，56 岁。有高血压病史 4 年。体检：血压 156/96mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利片控制血压。该患者用药过程中可能发生的典型不良反应是()。

- A: 水肿

- B: 干咳
- C: 低血糖
- D: 光过敏

答案：B

58. 通过激动胰高血糖素样肽-1 受体降低血糖的药物

- A: 胰岛素皮下注射
- B: 艾塞那肽
- C: 二甲双胍
- D: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

答案：B

59. 特布他林属于

- A: β 肾上腺素受体激动剂
- B: 白三烯调节剂
- C: M 胆碱受体阻断剂
- D: 黄嘌呤类药物

答案：A

60. 氟尿嘧啶、卡培他滨属于()

- A: 核苷酸还原酶抑制剂
- B: 二氢叶酸还原酶抑制剂
- C: DNA 多聚酶抑制剂
- D: 胸腺核苷合成酶抑制剂

答案：D

61. 抑制 DNA 多聚酶

- A: 甲氨蝶呤

- B: 羟基脲
- C: 氟尿嘧啶
- D: 阿糖胞苷

答案：D

62. 与链激酶、尿激酶联用溶栓治疗，可增加疗效，且不显著增加严重出血发生率的是

- A: 华法林
- B: 肝素
- C: 低分子肝素
- D: 阿司匹林

答案：D

63. 需要皮下注射的糖尿病治疗药物是

- A: 那格列奈
- B: 阿卡波糖
- C: 二甲双胍
- D: 艾塞那肽

答案：D

64. 以下药物的镇咳作用从弱到强排列正确的是

- A: 喷托维林、右美沙芬、苯丙哌林
- B: 喷托维林、苯丙哌林、可待因
- C: 可待因、吗啡、右美沙芬
- D: 苯丙哌林、可待因、吗啡

答案：A

65. 典型不良反应为恶心、呕吐、肾毒性和耳毒性，骨髓功能抑制相对较轻的是()

- A: 奥沙利铂
- B: 亚叶酸钙
- C: 卡铂
- D: 顺铂

答案: D

66. 维 A 酸软膏治疗痤疮时，合理的用法是

- A: 一日一次，晨起使用
- B: 一日一次，睡前使用
- C: 一日二次，早、晚使用
- D: 一日一次，固定时间使用

答案: B

67. 可使人体对维生素 B

- A: 异烟肼
- B: 丙磺舒
- C: 糖皮质激素
- D: 雌激素

答案: B

68. 可能引起持续性干咳的抗高血压药是

- A: 氨氯地平
- B: 阿利克仑（阿利吉仑）
- C: 阿托普利
- D: 硝普钠

答案: C

69. (2016 年真题) 没有镇静和“宿醉”现象，不属于巴比妥类和苯二氮类的镇静催眠药是

- A: 阿普唑仑
- B: 地西泮
- C: 异戊巴比妥
- D: 佐匹克隆

答案：D

70. 以下关于去羟肌苷使用的叙述，错误的是

- A: 注意外周神经病变，待神经中毒症状消退后患者仍能耐受减量的本品治疗
- B: 同时服用含镁和铝的抗酸药物会加重不良反应
- C: 酮康唑和伊曲康唑需至少在服用本品前两小时服用
- D: 用药过量无已知的解毒药，但可以通过腹膜透析排出

答案：D

71. 下列药物不属于大环内酯类的是

- A: 大观霉素
- B: 泰利霉素
- C: 罗红霉素
- D: 阿奇霉素

答案：A

72. 铋剂连续服用不得超过 2 个月，是因为长期服用可导致()

- A: 舌苔变黑
- B: 肝功能损害
- C: 神经毒性

D: 大便呈黑色

答案: C

73. 肺栓塞静脉溶栓更有效的是()

A: 磺达肝癸钠

B: 华法林

C: 尿激酶

D: 肝素

答案: C

74. 焦虑型、夜间醒来次数较多者

A: 氯美扎酮

B: 谷维素

C: 夸西泮

D: 氟西泮

答案: D

75. 可单独或联合用于以胆固醇升高为主的患者，特别适合作为不能耐受他汀治疗者的替代，用于原发性高胆固醇血症、纯合子家族性高胆固醇血症、纯合子谷甾醇血症的是

A: 依折麦布

B: 烟酸

C: 非诺贝特

D: 阿昔莫司

答案: A

76. (2018 年真题) 主要用于青光眼急性发作短期控制的药物是()

A: 依他尼酸

B: 布美他尼

C: 乙酰唑胺

D: 依托塞米

答案: C

77. (2019 年真题) 患者，男，67 岁，既往有癫痫病史。因感染性脑膜炎入院治疗，在脑脊液标本的病原学结果回报之前，可经验性选用的抗菌药物是 ()

A: 卡泊芬净

B: 亚胺培南西司他丁

C: 头孢曲松

D: 米诺环素

答案: C

78. 以下药物中，不属于散瞳类药物的是

A: 复方托吡卡胺

B: 卡波姆

C: 去氧肾上腺素

D: 阿托品

答案: B

79. (2019 年真题) 关于氢氯噻嗪临床应用的说法，错误的是 ()

A: 老年患者服药后易发生低血压及肾功能损害

B: 与磺胺类药物存在交叉过敏反应

C: 服药期间应关注有无肌痉挛、耳鸣、听力障碍等症状

D: 对血糖和尿酸无影响，可长期服用

答案: D

80. 抑制碳酸酐酶的药物是

- A: 氨苯蝶啶
- B: 氢氯噻嗪
- C: 乙酰唑胺
- D: 呋塞米

答案：C

81. 口服铁剂最常见的不良反应是

- A: 坏死性胃肠炎
- B: 血性腹泻
- C: 便秘
- D: 胃肠道反应

答案：D

82. 患者，女，56岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，初诊医师建议首先改变生活方式（控制饮食，增强运动）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀片治疗。

- A: BUN
- B: Hcy
- C: CK
- D: Cr

答案：C

83. （2019年真题）服用阿司匹林可增加患者消化道黏膜损伤和胃溃疡的风险，为降低此风险，应采取的措施是（）

- A: 阿司匹林不应与其他抗血小板药物合用
- B: 应长期合用质子泵抑制剂
- C: 不推荐65岁以上老年患者使用阿司匹林进行冠心病二级预防

D: 使用阿司匹林前宜先根治幽门螺杆菌感染

答案: D

84. 需慎用司坦唑醇的是()

A: 代谢性酸中毒患者

B: 高血压患者

C: 低血压患者

D: 肝、肾病患者

答案: D

85. 羟甲唑啉滴鼻剂使用期间，可能发生的不良反应是

A: 心率加快

B: 血压下降

C: 鼻衄

D: 流量

答案: A

86. 糖皮质激素隔日疗法用于()

A: 变态反应性疾病

B: 肾病综合征

C: 抑制器官移植急性排斥危象

D: 湿疹

答案: B

87. 治疗侵袭性曲霉菌病首选()

A: 氟胞嘧啶

B: 氟康唑

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 灰黄霉素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/948071121051007022>