

主治医师（全科医学）-流行病学方法(A1/A2 型题 2)

1、有关抽样误差的叙述，不正确的是

- A. 抽样误差是由随机抽样而造成的
- B. 抽样误差的存在是不可避免的
- C. 抽样误差可通过科学地调查研究设计加以控制
- D. 抽样误差可应用统计学方法加以估计
- E. 抽样误差最常用的指标是标准差

2、现况调查又称为

- A. 前瞻性调查
- B. 回顾性调查
- C. 描述性调查
- D. 横断面调查
- E. 纵断面调查

3、病例对照研究又可称为

- A. 横断面调查
- B. 前瞻性研究
- C. 临床试验
- D. 回顾性研究
- E. 社区试验

4、病例对照研究的病例应确定为

- A. 病人
- B. 患某特定疾病的病人
- C. 暴露于某因素下的人
- D. 随访跟踪的病人
- E. 以上都不是

5、病例对照研究的资料是

- A. 以前的资料
- B. 现在调查的资料
- C. 跟踪随访的资料
- D. 医院现有病人的病历
- E. 以上都不是

6、匹配因素所占的比例，在病例组和对照组中是一致的，这种匹配是

- A. 个体匹配
- B. 群体匹配
- C. 频数匹配
- D. 标准匹配
- E. 匹配过度

7、研究罕见病最经济快捷的途径是采用

- A. 现况研究
- B. 病例对照研究
- C. 队列研究
- D. 实验研究
- E. 社区实验

8、在病例对照研究中，哪种资料提供的信息较为准确可靠

- A. 以往病例
- B. 新发病例
- C. 现患病例
- D. 死亡病例
- E. 医院提供的病例

9、观察方向由果及因的是

- A. 现况调查
- B. 病例对照研究
- C. 队列研究
- D. 实验研究
- E. 以上都不是

10、病例对照研究中哪一项是不正确的

- A. 着重在因果关系分析
- B. 可计算发病率
- C. 可计算比值
- D. 可能产生偏差
- E. 对照组要求不患所研究疾病或病因相似疾病

11、疾病轮状模型的轮轴是

- A. 环境
- B. 遗传因子
- C. 宿主
- D. 特异性致病微生物
- E. 传染物

12、确定某因素与疾病可能存在因果关系时，哪种说法是不正确的

- A. 因素与疾病的发生呈量效关系
- B. 发病因素在前，疾病发生在后
- C. 所有病人的分布与疾病的分布符合
- D. 致病因素的分布与疾病的分布符合
- E. 除去此因素则该病的患病危险减小

13、在病因学上，轮状模型与三角模型相比，主要的不同点是

- A. 强调病因、宿主、环境三者的动态平衡
- B. 更强调环境的作用
- C. 更强调遗传因子的作用
- D. 强调病因为独立的成分
- E. 强调疾病是多因素综合作用的结果

14、在病因推断中，反映关联强度的指标为

- A. 人群归因危险度
- B. 相对危险度
- C. 归因危险度
- D. 特异危险度
- E. 以上都不是

15、关于暴发，哪种说法是不正确的

- A. 在特定人群短时间内发生多例同一种疾病叫暴发
- B. 暴发的疾病可以是传染病，也可以是非传染病
- C. 暴发有集中同时的暴发，也有持续、蔓延的暴发
- D. 暴发常由于许多人接触同一致病因子而引起的
- E. 暴发时病例发病日期不同是该病的传染期不同所致

16、进行暴发调查时的首要工作是

- A. 确定可能的传播方式

- B. 形成假设并检验假设
- C. 核实诊断
- D. 采取预防措施
- E. 总结报告

17、表示疾病流行强度的术语包括

- A. 季节性、周期性、流行、大流行
- B. 流行、暴发、季节性、散发
- C. 散发、暴发、流行、大流行
- D. 季节性、流行、暴发、长期变动
- E. 暴发、流行、大流行、长期变动

18、病例对照研究中最常见的偏倚有

- A. 回忆偏性
- B. 选择偏性
- C. 调查员偏性
- D. 混杂偏性
- E. 测量偏性

19、以下哪一项是病例对照研究的优点

- A. 是从因到果的研究
- B. 适用于探索性病因研究

- C. 可计算疾病的发病率
- D. 不需调查对象的回忆就可获得暴露资料
- E. 只能进行一种病因的研究

20、比值比主要应用于

- A. 生态学研究
- B. 横断面研究
- C. 队列研究
- D. 实验研究
- E. 病例对照研究

21、临床试验最常用、最根本的方法是

- A. 随机对照试验
- B. 配对试验
- C. 交叉试验
- D. 序贯试验
- E. 以上都不是

22、哪一项不是临床试验评价疗效常用指标

- A. 治愈
- B. 好转
- C. 无效

D. 存活

E. 保护

23、随访主要用于

A. 现况调查

B. 前瞻性研究

C. 回顾性研究

D. 临床试验

E. 社区试验

24、反映病因与疾病关联强度的最好指标是

A. 潜伏期

B. 总人口的疾病发病率

C. 致病因子的流行率

D. 特异危险度

E. 相对危险度

25、相对危险度是

A. 暴露组的疾病危险性与非暴露组的疾病危险性之比

B. 暴露组的疾病危险性与非暴露组的疾病危险性之差

C. 病例组有某因素的比例与对照组有该因素的比例之比

D. 病例组有某因素的比例与对照组有该因素的比例之差

E. 反映某一人群由于某种暴露因素而增加的发病率

26、设立对照时，给与对照组与实验组外形相同的无任何作用的物质(如淀粉)，这种对照方法称为

A. 标准疗法对照

B. 配对对照

C. 潜在对照

D. 安慰剂对照

E. 实验对照

27、在流行病学实验中为防止偏倚常采用盲法，如果研究者、研究对象、负责资料收集和分析的人员都不了解情况，则这种盲法称为

A. 单盲

B. 双盲

C. 三盲

D. 全盲

E. 非盲

28、流行病学实验的基本特征不包括

A. 是前瞻性研究

B. 不能确证因素与疾病之间的因果关系

C. 必须施加一种或多种干预措施

D. 分组必须采取严格的随机分配原则

E. 必须有平行的实验组和对照组

29、实验效应是指

A. 实验取得的预期效果

B. 实验组产生的预期效应

C. 处理因素在受试对象身上产生的预期效应

D. 实验最后取得的结果

E. 以上都不是

30、流行病学是一门

A. 理论学和方法学

B. 理论学和应用学

C. 观察学

D. 实验学科

E. 方法学和应用学

31、流行病学研究的起点是

A. 群体

B. 分布

C. 对比

D. 社区医学

E. 预防为主

32、发病率按不同特征分别计算称为

A. 罹患率

B. 发病专率

C. 患病率

D. 特征率

E. 以上都不是

33、下面对病例对照研究叙述不正确的是

A. 可用于病因的探讨

B. 不能计算发病率

C. 研究的资料是以往的

D. 适用于研究人群中暴露比例较低的因素

E. 省钱、省力、省时间且较易组织实施

34、在设计时采用哪种方法可适当地控制病例对照研究中的混杂偏倚

A. 增加对照组人数

B. 增加病例组人数

C. 科学设计

D. 限制和配比

E. 多因素分析

35、偏倚又称为

A. 系统误差

B. 随机抽样误差

C. 随机测量误差

D. 偶然误差

E. 标准误

36、流行病学中属描述性研究的是

A. 现况调查

B. 病例对照研究

C. 队列研究

D. 临床试验

E. 社区试验

37、流行病学研究中由果到因的研究方法是

A. 现况调查

B. 队列研究

C. 现场试验

D. 病例对照研究

E. 社区试验

38、属分析性研究方法的是

- A. 现况调查及病例对照研究
- B. 现况调查及队列研究
- C. 现况调查及试验研究
- D. 病例对照研究及队列研究
- E. 队列研究及试验研究

39、属于实验性研究是

- A. 现况调查
- B. 病例对照研究
- C. 队列研究
- D. 临床试验
- E. 生态学研究

40、要对某种药物或治疗方法的效果进行检验和评价，常采用

- A. 临床试验
- B. 现场试验
- C. 社区试验
- D. 动物实验
- E. 类实验

41、社区试验中哪一项不正确

- A. 试验现场人口比较稳定
- B. 选择最近曾进行过有关的预防接种者为试验人群
- C. 对照人群选择应注意可比性
- D. 试验期限不宜过长
- E. 根据以往发病率等资料来估计试验样本含量的大小

42、对临床试验研究的叙述，不正确的是

- A. 要在控制条件下设置对照组
- B. 可深入验证病因假设
- C. 可评价干预措施效果
- D. 以群体生活单位进行干预
- E. 研究对象分组必须采取随机原则

43、现场干预试验必须具备哪些基本要素

- A. 试验对象、干预措施、试验效应
- B. 试验对象、干预措施、试验对照
- C. 试验对照、试验对象、试验效应
- D. 试验对象、随机分组、试验效应
- E. 随机化、盲法、对照

44、在社区干预试验中，实验组与对照组人群的不同之处在于

- A. 目标人群不同
- B. 调查方式不同
- C. 观察指标不同
- D. 干预措施不同
- E. 分析方法不同

45、以下哪项是社区干预试验的优点

- A. 省时、省钱、省力、可进行罕见病的研究
- B. 可计算相对危险度和归因危险度
- C. 可平衡和控制两组的混杂因素，提高两者的可比性
- D. 能够早发现、早诊断、早治疗病人
- E. 易于控制失访偏倚，实验结果易推论至全人群

46、流行病学研究中的偏倚一般分为三类，它们是

- A. 选择偏倚、无应答偏倚、混杂偏倚
- B. 信息偏倚、无应答偏倚、报告偏倚
- C. 选择偏倚、信息偏倚、混杂偏倚
- D. 测量偏倚、报告偏倚、无应答偏倚
- E. 混杂偏倚、报告偏倚、测量偏倚

47、流行病学实验的研究对象是

- A. 患某病的病人

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/955120111340011330>