2024河北省井陉县《执业药师之西药学专业二》考试题库【培优】

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.一般来讲，复方己酸羟孕酮注射液的注射时间与剂量是

A：第一次于月经来潮第5日注射1支

B：第二次及以后于月经来潮后10～12日每月注射1支

C：第一次于月经来潮后10～12日注射2支

D：第二次及以后于月经来潮第5日每月注射1支

答案：B

2.可使双膦酸盐的吸收下降，服用双膦酸盐后2小时内避免食用的是

A：高钙食品

B：萘普生

C：抗血管生成药

D：沙利度胺

答案：A

3.用于充血性心力衰竭，肝硬化，抗利尿激素分泌过多证，为急、慢性肾衰竭（肌酐清除率＜30ml/min）时首选的药物是

A：呋塞米

B：乙酰唑胺

C：螺内酯

D：阿米洛利

答案：A

4.长期服用糖皮质激素不会产生下列哪种副作用()

A：高血钾

B：溃疡或出血穿孔

C：满月脸

D：肾上腺皮质萎缩

答案：A

5.（2015年真题）使用螺内酯的心力衰竭患者，不宜选用的药品是（）。

A：硫酸镁

B：果糖

C：氯化钙

D：氯化钾

答案：D

6.糖皮质激素的抗中毒性休克作用是

A：提高中枢神经系统的兴奋性

B：抑制巨噬细胞中一氧化氮合成酶

C：抑制巨噬细胞对抗原的吞噬处理

D：提高机体对细菌内毒素的耐受力

答案：D

7.（2015年真题）属于雌激素受体阻断剂的抗肿瘤药是（）。

A：炔雌醇

B：他莫昔芬

C：阿那曲唑

D：丙酸睾酮

答案：B

8.临床最常用的强心苷类正性肌力药是

A：米力农

B：依那普利

C：多巴酚丁胺

D：地高辛

答案：D

9.骨髓抑制较严重的是

A：奥沙利铂

B：卡铂

C：顺铂

D：亚叶酸钙

答案：B

10.（2019年真题）患者，女，52岁，因“闭经1年，潮热、情绪波动、严重失眠半年”就诊，临床诊断为“更年期综合征”。拟给予的药物治疗方案为：戊酸雌二醇片，每日1次，每次1mg，醋酸甲羟孕酮片，每日1次，每次2mg。

A：突破性出血

B：白带增多

C：乳房触痛或增大

D：体重增加

答案：A

11.氯丙嗪常见的不良反应

A：过敏反应

B：锥体外系反应

C：细胞缺氧、酸中毒、休克

D：恶心、腹痛、腹泻、食欲减退

答案：B

12.糖尿病合并轻中度肾功能不全者可选用()

A：格列齐特

B：格列喹酮

C：格列吡嗪

D：胰岛素

答案：B

13.乙胺丁醇的抗结核杆菌作用原理是

A：抑制 RNA 多聚酶

B：抑制蛋白质合成

C：抑制分枝菌酸合成

D：与锌离子络合、影响戊糖代谢

答案：D

14.12 岁以下儿童、有活动性消化性溃疡及中度或严重肝损伤禁用的非甾体抗炎药是

A：塞来昔布

B：尼美舒利

C：布洛芬

D：双氯芬酸

答案：B

15.（2020 年真题）关于聚乙二醇 4000 治疗便秘的说法，错误的是

A：疗程不宜过长

B：作用机制为刺激肠道分泌，增加粪便含水量以软化粪便

C：适用人群为成人及 8 岁以上儿童

D：肠梗阻患者禁用

答案：B

16.阻碍 DNA 合成的药物是

A：氟尿嘧啶

B：紫杉醇

C：高三尖杉酯碱

D：顺铂

答案：A

17.不宜应用喹诺酮类药物的人群是

A：老年人

B：溃疡病患者

C：婴幼儿

D：肝病患者

答案：C

18.可改善心肌缺血症状，但高磷血症患者禁用的药物是

A：门冬氨酸钾镁注射液

B：二磷酸果糖注射液

C：葡萄糖注射液

D：乳酸钠注射液收售，

答案：B

19.对丙咪嗪过敏的患者禁用

A：氨已烯酸

B: 卡马西平
C: 丙戊酸钠
D: 苯妥英钠
答案：B

20.（2020年真题）患者，男，66岁。BMI24kg/m2，高血压病史15年，冠心病史3年，目前规律服用阿司匹林、贝那普利、氨氯地平、美托洛尔、阿托伐他汀、螺内酯、呋塞米、单硝酸异山梨酯治疗。患者饮酒饱餐后出现胸闷，心前区疼痛，自服1片硝酸甘油不能缓解，来急诊科就诊。查体:血压163/83mmHg，心率80次1分。临床诊断为:(1)心绞痛急性发作;(2)心功能不全、心功能III级;(3)高血压病3级;(4)高脂血症。
A: 阿托伐他汀
B: 氨氯地平
C: 呋塞米
D: 贝那普利
答案：C

21.患者，女，54岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌Ⅱ级，同侧腋下淋巴结1／18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+)。肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。
A: 腰椎间盘突出
B: 骨髓功能抑制
C: 严重心脏病
D: 妊娠及哺乳期妇女
答案：A

22.主要不良反应为踝部关节水肿，晨轻午重的药物是

A：地高辛

B：硝酸甘油

C：卡托普利

D：氨氯地平

答案：D

23.易通过血脑屏障的抗真菌药物是

A：咪康唑

B：氟康唑

C：酮康唑

D：克霉唑

答案：B

24.有关阿莫西林特点的说法正确的是

A：对耐药金葡菌有效

B：广谱青霉素，对革兰阴性菌也有效

C：口服吸收差，生物利用度小

D：耐酸、耐酶

答案：B

25.（2016 年真题）属于延长动作电位时程的抗心律失常药是

A：硝酸甘油

B：美托洛尔

C：利多卡因

D：索他洛尔

答案：D

26.氨基苷类抗生素的抗菌机制是

A：影响叶酸代谢

B：抑制细菌细胞壁的合成

C：抑制蛋白质合成的全过程

D：影响胞浆膜的通透性

答案：C

27.大剂量静脉给药时，可能出现可逆性黄疸的抗生素是()

A：利奈唑胺

B：小檗碱

C：磷霉素

D：夫西地酸

答案：D

28.对多种氨基糖苷类钝化酶稳定的药物是

A：妥布霉素

B：庆大霉素

C：链霉素

D：奈替米星

答案：D

29.引起女性男性化、男性乳房胀痛的是

A：多沙唑嗪

B：舍尼通

C：非那雄胺

D：十一酸睾酮

答案：D

30.a肾上腺素受体分布占优势的效应器是

A: 骨骼肌血管

B: 冠状血管

C: 肾血管

D: 皮肤黏膜血管

答案：D

31.属于短效胰岛素或短效胰島素类似物的是()

A: 甘精胰岛素

B: 低精蛋白锌胰島素

C: 地特胰岛素

D: 普通胰岛素

答案：D

32.与核糖体30S亚基结合，阻止氨基酰tR-NA进入A位的抗菌药是

A: 青霉素

B: 万古霉素

C: 四环素

D: 氯霉素

答案：C

33.奎宁或氯喹日剂量超过1g或连续长时间应用，可见耳鸣，头痛、视力与听力减退等，停药后常可恢复，临床称谓

A: 金鸡纳反应

B: 神经毒性反应

C: 赫氏反应

D: 双硫仑样反应

答案：A

34.（2019 年真题）有些药品的不良反应源于药物制剂的辅料，紫杉醇注射液中可能引起过敏反应的辅料是（）

A: 乙醇

B: 聚氯乙烯

C: 聚乙烯醇蓖麻油

D: 邻苯二甲酸二辛酯

答案：C

35.具有缩小皮脂腺，抑制皮脂腺活性，减少皮脂分泌的药物()

A: 阿达帕林

B: 异维 A 酸

C: 壬二酸

D: 维 A 酸

答案：B

36.紧急降低眼压首选的药物是()

A: 碳酸酐酶抑制剂

B: 拟 M 胆碱药

C: 20%甘露醇

D: β 受体阻滞药

答案：C

37.在痛风急性期，应禁用的抗痛风药是

A: 别嘌醇

B: 秋水仙碱

C: 舒林酸

D: 布洛芬

答案：A

38.硫脲类的严重不良反应是

A：药疹、瘙痒

B：关节痛

C：甲状腺肿大

D：粒细胞缺乏症

答案：D

39.可用于慢性活动性肝炎的治疗()

A：赖氨酸

B：复方氨基酸注射液(18AA)

C：复方氨基酸注射液(3AA)

D：精氨酸

答案：C

40.放射性碘

A：对甲状腺激素代谢无作用，仅能改善甲状腺功能亢进症的症状

B：使甲状腺腺泡上皮萎缩、减少分泌

C：使甲状腺组织退化、血管减少、腺体缩小变韧

D：抑制甲状腺过氧化物酶，从而抑制甲状腺激素的生物合成

答案：B

41.长春碱使细胞有丝分裂停止于

A：M期

B：G1期

C：G0期

D：S期

答案：A

42.以下哪种心律失常禁用强心苷

A：心房扑动

B：室性心动过速

C：室上性心动过速

D：心房颤动

答案：B

43.属于第一代抗精神病药物的是

A：奥氮平

B：氯丙嗪

C：利培酮

D：氯氮平

答案：B

44.下列关于吉非替尼的描述，错误的是

A：与传统化疗药存在交叉耐药

B：常见典型不良反应是皮肤毒性、腹泻

C：用于治疗经含有铂类或多西他赛治疗失败的晚期非小细胞肺癌患者

D：用药期间应监测肝肾功能

答案：A

45.下列保肝药中属于必需磷脂类的是

A：复方甘草酸苷

B：多烯磷脂酰胆碱

C：甘草酸二铵

D：联苯双酯

答案：B

46.长期大量服用维生素E会出现

A：严重神经感觉异常，进行性步态不稳至足麻木、手不灵活

B：视力模糊、乳腺增大、腹泻、头晕、流感样症状等

C：低热、烦躁哭闹、惊厥、厌食、体重减轻、骨骼硬化症

D：疲劳、软弱、全身不适、毛发干枯或脱落、皮肤干燥瘙痒、食欲减退、贫血、眼球突出等中毒现象

答案：B

47.作用机制是抗代谢的是

A：吉非替尼

B：紫杉醇

C：巯嘌呤

D：枸橼酸他莫昔芬

答案：C

48.新生儿和早产儿使用可能会出现致命性的“喘息综合征”的药物是

A：甘草酸二铵注射剂

B：硫普罗宁注射剂

C：双环醇

D：多烯磷脂酰胆碱注射剂

答案：D

49.治疗钩虫病宜选用

A：甲硝唑

B：氯喹

C：吡喹酮

D: 甲苯咪唑

答案：D

50.抗菌谱较广，还可用于治疗自身免疫性疾病

A: 环磷酰胺

B: 阿霉素

C: 丝裂霉素

D: 放线菌素D

答案：A

51.主要作用于有丝分裂M期，干扰微管蛋白合成的药物是

A: 氟尿嘧啶

B: 高三尖杉酯碱

C: 顺铂

D: 多柔比星

答案：B

52.属于 α-葡萄糖甘酶抑制剂的是

A: 阿卡波糖

B: 罗格列酮

C: 二甲双胍

D: 西格列汀

答案：A

53.以下属于第三代头孢菌素的是

A: 头孢羟氨苄

B: 头孢噻吩

C: 头孢克洛

D: 头孢噻肟

答案：D

54.镇静作用明显的H

A: 苯海拉明

B: 组胺

C: 西咪替丁

D: 阿司咪唑

答案：A

55.氯霉素抗菌谱广，而最主要的不良反应是()

A: 对造血系统的毒性

B: 对肝脏严重损害

C: 二重感染

D: 胃肠道反应

答案：A

56.（2021年真题）患儿。女，14岁。因出现尿频、尿急、尿痛症状2天就诊，诊断为急性膀胱炎，患儿既往有癫痫病史，宜选用的治疗药物是（）。

A: 青霉素G

B: 呋喃妥因

C: 阿奇霉素

D: 环丙沙星

答案：B

57.临床常用的巨幼红细胞性贫血治疗药物是

A: 肝素

B：维生素K

C：香豆素类

D：维生素B12

答案：D

58.肾上腺糖皮质激素类药物的共同药理作用不包括

A：抗炎

B：抗休克

C：免疫抑制

D：抗病毒

答案：D

59.（2019年真题）患者，女，孕8周，诊断为“甲状腺功能减退症”，给予左甲状腺素钠片治疗。对该患者的用药指导，错误的是（）

A：左甲状腺素钠极少通过胎盘，治疗剂量下对胎儿无不良影响

B：应于早餐后将一日剂量左甲状腺素钠片一次性用温水送服

C：孕期甲减可能对胎儿造成不良影响，服药期间应监测甲功

D：服用左甲状腺素钠片期间如出现心悸、多汗或体重下降，应及时就诊

答案：B

60.患者女，55岁。晨练时突发窦性心动过速，症状持续不缓解，紧急入院，查体：138/90mmHg，心率120次/分，眼压高，医嘱普萘洛尔治疗。

A：4天

B：6天

C：8天

D：2天

答案：A

61.格列齐特是

A：磺酰脲类

B：长效类胰岛素

C：α-葡萄糖苷酶抑制剂

D：中效类胰岛素

答案：A

62.物质代谢过程中催化"一碳单位"转移反应的辅酶组成成分是

A：维生素B

B：维生素

C：叶酸

D：维生素A

答案：C

63.与促皮质激素合用，能促进尿钾排泄，降低钾盐疗效的是

A：氯化钾

B：氯化钙

C：枸橼酸钾

D：氯化钠

答案：A

64.以上药物镇咳作用最强的是

A：喷托维林

B：吗啡

C：右美沙芬

D：可待因

答案：B

65.患者，男，68 岁。发热伴咳嗽 1 周，表情淡漠、气急。近 2 天全身散在出血点及淤斑，血压 60/40mmHg，血红蛋白 120g/L，白细胞 12×10

A: 鱼精蛋白

B: 维生素 C

C: 低分子量肝素

D: 维生素 K

答案：A

66.静脉滴注过量可消除噻嗪类利尿剂的利尿和降压作用的是

A: 氯化钾

B: 枸橼酸钾

C: 氯化钠

D: 氯化钙

答案：C

67.易发生持续干咳不良反应的药品是

A: 氢氯噻嗪

B: 福辛普利

C: 硝酸甘油

D: 硝苯地平

答案：B

68.下列不属于一线抗结核药的是

A: 乙硫异烟胺

B: 吡嗪酰胺

C：利福平

D：链霉素

答案：A

69.（2017年真题）属于抗孕激素类药,用于终止早孕的药物是（）

A：甲地孕酮

B：左炔诺孕酮

C：米非司酮

D：黄体酮

答案：C

70.患者，女，68岁。近期有急性心肌梗死病史。目前正在服用阿司匹林、氯吡格雷、普伐他汀和美托洛尔。近日因偶尔出现胃灼热不适感而就医，该患者应避免使用的药物是

A：法莫替丁

B：雷贝拉唑

C：奥美拉唑

D：雷尼替丁德

答案：C

71.用于单纯饮食控制及体育锻炼治疗无效的2型糖尿病患者宜首选

A：格列喹酮

B：二甲双胍

C：低精蛋白锌胰岛素

D：普通胰岛素

答案：B

72.林可霉素类抗菌药物无抗菌作用的是

A：厌氧菌
B：革兰阳性球菌
C：肺炎支原体
D：肺炎链球菌
答案：C

73.对钩虫皮下组织的超微结构破坏严重，导致细胞核消失或破坏、线粒体消失，对其肠管中心层线粒体等结构均有破坏，产生驱虫作用的药物是
A：葡萄糖酸锑钠
B：伯氨喹
C：氯硝柳胺
D：三苯双脒
答案：D

74.利尿作用较弱，具有排钠留钾作用，可作用与慢性心力衰竭治疗的利尿剂是
A：螺内酯
B：氢氯噻嗪
C：乙酰唑胺
D：呋塞米
答案：A

75.（2017年真题）可用于吗啡中毒解救的药物是（）
A：纳洛酮
B：氟马西尼
C：苯甲酸钠咖啡因
D：阿托品

答案：A

76.阿卡波糖降血糖作用的机制是

A：提高靶细胞对胰岛素的敏感性

B：拮抗胰岛高血糖素的作用

C：竞争性抑制 α-葡萄糖苷酶，减少碳水化合物的水解

D：增强胰岛素的作用

答案：C

77.成人使用美罗培南一日剂量不得超过

A：4g

B：6g

C：3g

D：5g

答案：B

78.2岁以下儿童腹泻，禁用的药品是

A：盐酸洛哌丁胺胶囊

B：地衣芽孢杆菌胶囊

C：双歧三联活菌胶囊

D：双八面体蒙脱石散

答案：A

79.（2017年真题）减少钠离子内流而使神经细胞膜稳定,属于乙内酰脲类抗癫药的是（）

A：苯妥英钠

B：苯巴比妥

C：加巴喷丁

D：卡马西平

答案：A

80.监测他汀类药所致肌毒性的临床指标是()。

A：乳酸脱氢酶

B：碱性磷酸酶

C：尿淀粉酶

D：肌酸激酶

答案：D

81.患者，诊断为感染性心内膜炎，血液细菌培养为草绿色链球菌，拟用青霉素G和下列其中一药合用，应选

A：阿莫西林

B：庆大霉素

C：红霉素

D：奈替米星

答案：B

82.（2016年真题）属于胆固醇吸收抑制剂的是

A：阿昔莫司

B：依折麦布

C：阿托伐他汀

D：非诺贝特

答案：B

83.注射液含苯甲醇，新生儿和早产儿禁用的药物是

A：多烯磷脂酰胆碱

B：甘草酸二铵

C: 雷尼替丁

D: 甲氧氯普胺

答案：A

84.氯霉素抗菌谱广，而典型严重的不良反应是

A: 胃肠道反应

B: 对肝脏严重损害

C: 对造血系统的毒性

D: 二重感染

答案：C

85.大剂量应用下列哪种维生素时，可使尿胆原呈假阳性

A: 维生素B1

B: 维生素C

C: 维生素B2

D: 维生素E

答案：A

86.（2015年真题）通过改变虫体肌细胞膜的离子通透性发挥驱虫作用，适用于儿童，常见制剂为宝塔糖的药品是（）。

A: 哌嗪

B: 氯喹

C: 噻嘧啶

D: 青蒿素

答案：A

87.不能阻滞钠通道的抗心律失常药物是()

A: 普罗帕酮

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/955320330114012033