学习及考试资料整理汇编

——备考冲刺篇——

（考点或配套习题突击训练专用）

影像预防学考试测试题含答案

1. 戊二醛-酚溶液使用的稀释度是

A. 1:32**(正确答案)**

B. 1:16

C. 1:8

D. 1:4

E 1:2

2. 理想的牙刷刷毛应具有的特点是

A. 易吸水变软**(正确答案)**

B. 刷毛端有孔

C. 具有适当弹性

D. 防霉

E. 直径与长度成比例

3. 不属于窝沟封闭适应证的是

A. 对侧同名牙有患龋倾向

B. 对侧同名牙有龋

C. 已充填完好的牙**(正确答案)**

D. 牙面窝沟可疑龋

E. 牙面窝沟较深

4. 牙周病一级预防的确切内容是

A. 义齿修复，防止功能丧失

B. 早发现、早治疗，减少牙周病的严重程度

C. 药物与牙周手术治愈牙周病损

D. 控制牙菌斑，减轻牙龈出血

E. 健康教育、定期保健、保持牙周健康**(正确答案)**

5. 主要作用是凝集致龋菌，减少菌斑形成，解脱已黏附菌斑，防止口腔 pH 下降的物质是

A. 茶多酚

B. 红花

C. 甲壳素类**(正确答案)**

D. 氯己定

E 酶类

6 主要与获得性膜黏蛋白中富脯酸结合，阻止细菌附着的

A 五倍子**(正确答案)**

B. 茶多酚

C. 氯己定

D. 甲壳素类

E. 酶类

7. 牙周疾病流行的因素不包括

A. 吸烟

B. 口腔卫生状况

C. 长期服用避孕药

D. 饮酒**(正确答案)**

E. 牙菌斑

8. 健康调查的工作步骤不包括

A. 整理资料

B. 收集资料

C. 统计资料

D. 分析资料

E. 汇报结果**(正确答案)**

9. 影响牙周疾病流行的最主要因素是

A. 教育程度

B. 吸烟与饮酒

C. 年龄和性别

D. 口腔卫生状况**(正确答案)**

E. 城乡差异

10. 以往牙周疾病流行病学资料少的重要原因是

A. 缺乏明确的标准和指数**(正确答案)**

B. 牙周资料的可比性差

C. 牙周疾病流行病学研究少

D. 牙周资料的可靠性差

E. 缺乏牙周资料的收集和整理

11 口腔分级预防的概念正确的是

A. 二级预防又称病因预防

B. 三级预防包含一级预防、二级预防

C、二级预防是指防止牙丧失(恢复口腔功能)

D. X 线辅助检查属于二级预防**(正确答案)**

E、早期充填属于一级预防

12 饮水加氟是在哪个个国家最先提出并实施的

A 美国**(正确答案)**

B 中国

C 英国

D 瑞典

E 澳大利亚

13. 目前市场大多数含氟牙膏的氟浓度一般为

A. 500-600mg/kg

B. 100-200mg/kg

C1000-1100mg/kg**(正确答案)**

D. 2000-2100mg/kg

E 3000-3100 mg/kg

14. 口腔健康调查方法不包括

A. 普查

B. 随机调查**(正确答案)**

C 预调查

D. 抽样调查

E 捷径调查

15、氟化泡沫用量与氟化凝胶用量的比是

A. 1:2

B. 1:1

C. 1:4**(正确答案)**

D. 1:8

E 1:10

16. 流行病学调查资料在分析时一般不用

A. 标准差

B 中位数**(正确答案)**

C. 平均数

D. 标准误

E 可信间

17. 如果儿童 6 岁前生活在高区，其受氟牙症影响最严重的牙可能是

A. 第二恒磨牙

B. 第一恒磨牙

C. 前牙

D. 尖牙

E 前磨牙**(正确答案)**

18. 下列材料中可直接用于深龋垫底的是

A. 磷酸锌粘固剂

B. 氧化锌-丁香酚粘固剂**(正确答案)**

C. 复合树脂

D，玻璃离子粘固剂

E 银合金

19, Kappa 值可靠度优的范围是

A. 0. 51-0. 6

B0. 4-0. 5

C0. 61-0. 8**(正确答案)**

D. 0. 51-0. 7

E 0.71-0.8

20 目前世界病分布的特点可能与之有关的因素是

A.生活水平和饮食习惯**(正确答案)**

B 糖的摄入量和频率

C 化物防措施

D.口腔预防保健措施

E 口腔科医师的数量

21.口腔流行病学研究方法不包括

A 病历资料分析

B 描述性研究

C 横断面调查

D.现况调查

E 计机统计**(正确答案)**

22.简化口腔卫生指数检查

A.事口牙

B.全口牙

C.前牙侧

D.6 颗指数牙**(正确答案)**

E 后牙舌侧

23.利用基因工程技术构建的疫苗免疫动物，获得特异性的抗体是

A.多肽抗体

B，单克隆和多克隆抗体

C.基因重组免疫**(正确答案)**

D.核酸疫苗

E 转基因抗体

24.将特定编码蛋白的外源基因直接导入动物细胞内，诱导宿主对目的基因表达的蛋白产生免疫反应，达到防龋作用的疫苗是

A.多肽抗体

B.单克隆和多克隆抗体

C. 基因重组免疫

D. 核酸疫苗**(正确答案)**

E. 转基因抗体

25. 氟化物可能中毒剂量(PTD)是

A. 4 mg/kg

B. 3mg/kg

C. 5 mg/kg**(正确答案)**

D. 6mg/kg

E 8mg/kg

26. 急性性氟中毒的主要症状不包括

A. 呕吐

B. 恶心

C. 头痛**(正确答案)**

D. 腹泻

E 肌肉痉挛

27. 在氟的防机制中，氟能抑制下列何种酶的作用

A. 果糖基转移酶

B. 葡糖基转移酶

C. 碳水化合物酶

D. 烯醇酶**(正确答案)**

E 磷酸酯酶

28. 第二恒磨牙窝沟封闭的适宜年龄是

A7~9 岁

B. 6~7 岁

C. 9~11 岁

D. 11~13 岁**(正确答案)**

E. 13~15 岁

29. 下面哪项不属于控制菌斑的药物的特点

A 不受口腔和菌斑中其他成分的影响

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/956122042220010110