专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年广西壮族自治区长洲区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背200题真题题库带答案（能力提升）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.服用华法林、利福平可呈现

A: 白陶土便

B: 黄色

C: 红至黑色

D: 橘红至红色

答案：D

2.具有临床耐受性良好、无戒断效应特点的治疗失眠症药物为（）

A: 阿戈美拉汀

B: 低剂量的多塞平

C: 小剂量米氮平

D: 艾司唑仑

答案：B

3.患者，男52岁，身高168cm，体重85kg，痛风病史6年。近日因多饮、多尿就诊。实验室检查空腹血糖7.8mmol/L(正常值:3.9～6.1mmol/L)，餐后血糖148mmo/L(正常值:<7.8mmol/L)，血尿酸580μmol/L(正常值:男性180～440μmol/L)，血ldlc3.7mmo/L(正常值:2.1~3.1mmo/L)肌酐清除率100ml/min。颈动脉彩超提示:动脉粥样硬化有混合性脂质斑块。临床诊断2型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症.

A: 格列齐特

B: 二甲双胍

C: 阿卡波糖

D: 甘精胰岛素

答案：C

4.归属专业学术机构网站的是

A: www.googl

B: www.ashp.org

C: www.cmt.tom.cn

D: www.merck.com

答案：B

5.治疗药源性疾病的方法如下，最先采用的是

A: 停用致病药物

B: 调整治疗方案

C: 对症治疗

D: 拮抗致病药物

答案：A

6.属于过敏介质阻释剂的是

A: 曲尼司特

B: 氨茶碱

C: 孟鲁司特

D: 多索茶碱

答案：A

7.（2015年真题）患者，男，50岁，血压170/95mmHg，伴有双侧肾动脉狭窄，单药治疗控制血压效果不佳，宜选用的联合用药方案是（）。

A: 利尿剂+AR

B: α 受体阻滞剂+ACEI

C: 利尿剂+CCB

D: β 受体阻滞剂+ARB

答案：C

8.解救毒物引起严重腹泻者（）

A: 禁止洗胃

B: 不能导泻

C: 不能催吐

D: 不能用强利尿剂

答案：B

9.患者，女，18岁，近半年来食欲亢进，多汗，体重明显减轻，伴有乏力、心悸。就诊查体见双手震颤，心率104次/分。化验结果：血清促甲状腺激素（TSH）<0.1mU/L，FT3、FT4明显升高，肝、肾功能基本正常，白细胞计数正常。诊断为甲状腺功能亢进症。首选的治疗方案是

A: 碘化钾治疗，定期复查

B: 甲状腺全切除手术

C: 注意休息与补充营养，使用甲巯咪唑治疗

D: 选用放射性131Ⅰ治疗

答案：C

10.关于口服避孕药的使用，下列说法不正确的是（）

A：口服避孕药引起的类早孕反应，一般不需特殊处理，坚持服药数个周期后可自然消失

B：口服避孕药引起的不规则阴道出血，如流血偏多者，每晚在服用避孕药同时加服雌激素直至停药

C：应用复方短效口服避孕药者，停药后即可妊娠

D：口服避孕药中的雌激素可使HDL-C降低

答案：D

11.应在清晨服用，可迅速在肠道发挥作用的盐类泻药是

A：沙丁醇胺

B：维生素B1

C：噻氯匹定

D：硫酸镁

答案：D

12.治疗急性腹泻可选用()

A：阿苯达唑

B：莫沙必利

C：聚乙醇4000

D：双八面体蒙脱石散

答案：D

13.患者,男,59岁,高血压病史5年,因头痛伴有恶心、呕吐就诊,MRI检查结果显示蛛网膜下腔出血。为防治脑血管痉挛,早期宜选用的药物()

A：缬沙坦

B：硝苯地平

C：尼莫地平

D: 氨氯地平

答案：C

14.并不存在风险，目前不需采取措施；评判为

A: 驳倒

B: 确认

C: 待验证

D: 验证

答案：A

15.引起药源性肾病的药物,新霉素具有

A: 前列腺素合成障碍

B: 肾间质纤维化

C: 肾小管阻塞

D: 直接肾毒性

答案：D

16.影响核酸合成的药物是

A: 培美曲塞

B: 顺铂

C: 放线菌

D: 依托泊苷

答案：A

17.小檗碱、盐酸地芬酯、八面体蒙脱石用于细菌性腹泻，应评判为

A: 无适应证用药

B: 联合用药不适宜

C: 过度治疗用药

D: 有禁忌证用药

答案：B

18.融合抑制剂（）

A: NRTIs

B: PIs

C: NNRTIs

D: FIs

答案：D

19.阿昔洛韦可导致

A: 肾间质纤维化

B: 阻塞肾小管、肾小球

C: 肾小管坏死

D: 前列腺素合成障碍

答案：B

20.（2017年真题）治疗肠道蛔虫病可选用（）

A: 莫沙必利

B: 聚乙醇4000

C: 双八面体蒙脱石散

D: 阿苯达唑

答案：D

21.粪外观所对应的疾病,阿米巴痢疾

A: 米泔水样

B: 白陶土便

C: 柏油便，黑色有光泽

D: 暗红果酱色

答案：D

22.下列是5位患者血常规检查的结果，其中白细胞计数异常的是

A: 成人静脉血13.0×109/L

B: 6个月～2岁婴儿11.0×109/L

C: 成人静脉血4.3×109/L

D: 成人末梢血8.0×109/L

答案：A

23.相互作用使不良反应减少的联合用药是

A: 阿托品联用氯磷定

B: 普萘洛尔联用美西律

C: 阿托品联用吗啡

D: 苄丝肼联用左旋多巴

答案：C

24.归属公共网络资源的是

A: www.merck.com

B: www.googl

C: www.ashp.org

D: www.cmt.com.cn

答案：B

25.实施"用药列表"，能有效地

A: 健康生活方式的教育

B: 转变疾病预防和保健观念

C: 识别及管理多重用药

D: 提高用药顺应性

答案：C

26.应用多黏菌素、磺胺类、顺铂可能引起

A: 尿沉渣白细胞

B: 尿沉渣管型

C: 尿沉渣结晶

D: 尿沉渣尿酸盐

答案：B

27.可用于氟乙酰胺中毒的药物是

A: 维生素K1

B: 碘解磷定

C: 亚硝酸钠

D: 乙酰胺

答案：D

28.有幻觉副作用，不宜与右美沙芬合用的药物是

A: 美金刚

B: 铝碳酸镁

C: 多奈哌齐

D: 匹伐他汀

答案：A

29.过敏性肠炎可出现()。

A: 脓状便

B: 脓血便

C: 鲜血便

D: 稀糊便

答案：A

30.在葡萄糖注射液中极易裂解的是

A: 红霉素

B: 苯妥英钠

C: 青霉素

D: 氯化钾

答案：C

31.以延长患者生命时间为指标开展的药物经济学评价方法属于()

A: 成本-效果分析

B: 成本-效益分析

C: 最小成本分析

D: 成本-效用分析

答案：A

32.以下ADR因果关系评定为"肯定"的依据中，不正确的是

A: 用药及反应发生时间顺序合理

B: 有文献资料佐证

C: 停药后反应停止

D: 原患多种疾病混杂因素可能干扰

答案：D

33.(治疗骨质疏松药的应用注意事项)，妊娠期使用过量可导致胎儿畸形、甲状旁腺功能抑制而使新生儿长期低血钙抽搐，应慎用的是

A: 氟制剂

B: 甲状旁腺激素

C：维生素

D：钙制剂

答案：C

34.对于绝经综合征患者，可根据患者的病情或用药需求，采用不同的药物制剂或给药方式进行绝经激素治疗（MHT）

A：雌二醇/雌二醇-地屈孕酮片

B：17β 一雌二醇

C：雌二醇一屈螺酮片

D：戊酸雌二醇/雌二醇-醋酸环丙孕酮片

答案：A

35.（2018年真题）患者,男58岁,高血压病史5年,吸烟史40年，日均40支,6小时前出现左侧肢体无力,并逐渐加重,不能站立,家属发现其说话迟钝含混,右侧嘴唇变浅,意识清楚,到某院急诊BP190/120mmHg，血常规基本正常,行头部MRI检查后,诊断为急性脑梗死。

A：甘露醇注射液250mlq6hiv

B：尼莫地平注射液20mgqdiv

C：呋塞米片200mgqdpo

D：胞二磷胆碱注射液200mgqdiv

答案：A

36.二甲双胍用于非糖尿病患者的减肥

A：盲目联合用药

B：非适应证用药

C：过度治疗用药

D：超适应证用药

答案：D

37.应嘱咐患者避免冷饮冷食，避免暴露于低温或接触冰冷物体以防药物不良反应加重的是

A：奥沙利铂

B：顺铂

C：卡培他滨

D：卡铂

答案：A

38.容易氧化的药物是

A：牛痘菌苗

B：胃蛋白酶

C：阿扑吗啡

D：青霉素类

答案：C

39.合并三度房室传导阻滞的高血压患者不宜选用

A：哌唑嗪

B：维拉帕米

C：多沙唑嗪

D：卡托普利

答案：B

40.选择性地作用于骨性关节、有直接抗炎作用的处方药是

A：阿司匹林

B：塞来昔布

C：硫酸氨基葡萄糖

D：可待因

答案：C

41.（2016年真题）患者，女，64岁，患2型糖尿病，高脂血症，给予二甲双胍肠溶片0.5gtidpo，瑞格列奈片1mgtidpo，阿托伐他汀钙片20mgqdpo等药物治疗。

A: 停用瑞格列奈片和阿托伐他汀钙片

B: 停用阿托伐他汀钙片

C: 停用瑞格列奈片

D: 停用二甲双胍肠溶片

答案：B

42.患者，男，67岁，患带状疱疹，皮疹愈合后出现持续1个月左右疼痛，可给予的止痛药物是

A: 加巴喷丁

B: 吗啡

C: 布洛芬

D: 山莨菪碱

答案：A

43.对A组β溶血性链球菌有抗菌活性，但由于抗菌谱广，且过度使用可能延迟结核病的诊断，增加结核分枝杆菌对该类药物的耐药性，不建议用于常规治疗的药物是

A: 克林霉素

B: 阿莫西林

C: 阿奇霉素

D: 莫西沙星

答案：D

44.可待因属于兴奋剂中的

A：精神刺激剂

B：麻醉药品

C：利尿剂

D：β 受体阻断剂

答案：B

45.提示"噻托溴铵粉吸入剂所附胶囊需放到吸入装置内刺破吸入，不能直接吞服"，是针对

A：药品贮存

B：特殊装置药品

C：药品有效期

D：特殊剂型用法

答案：B

46.对皮脂腺分泌过多所致的寻常型痤疮首选

A：0.1%阿达帕林凝胶

B：红霉素-过氧苯甲酰凝胶

C：0.03%维A酸乳膏剂

D：10%过氧苯甲酰凝胶

答案：D

47.肺结核的临床表现是

A：多为轻咳或干咳，偶见少量薄白痰，并伴有背痛、发热、头痛、咽喉痛

B：可有低热或高热，清瘦、轻咳、盗汗，有黄绿色痰

C：多发生于儿童，为阵发性剧烈痉挛性咳嗽伴有鸡鸣样吸气吼声，病程可达2～3个月

D: 有慢性咳嗽，伴有大量脓痰及反复咯血

答案：B

48.以下所述"处方调配规范四查"中，不正确的是

A: 查处方

B: 查配伍禁忌

C: 查药品

D: 查适应证

答案：D

49.患者，女，62岁，患有2型糖尿病，平时未规律监测血糖。今日来院复诊，欲了解近3个月内的血糖总体控制情况，应检测的指标是

A: 尿胆红素

B: 餐后2小时血糖

C: 糖化血红蛋白

D: 空腹血糖

答案：C

50.癫痫的药物治疗适用于各型癫痫的药物

A: 卡马西平

B: 苯妥英钠

C: 丙戊酸钠

D: 拉莫三嗪

答案：C

51.患者,女,25岁,临床诊断为癫痫,给予丙戊酸钠200mgtid治疗。关于患者用药教育的说法错误的是（）

A: 发作次数增多时应及时复诊

B: 应于每日三餐前服用药物

C: 必要时监测血药浓度

D: 不要随意增减剂量

答案：B

52.酮康唑、氟康唑、伊曲康唑可导致

A: 药源性肾损害

B: 药源性神经损害

C: 药源性血损害

D: 药源性肝损害

答案：D

53.容易通过被动扩散透过胎盘屏障的物特点是()

A: 分子量大、弱碱性

B: 弱酸性蛋白结合率低、半衰期长

C: 脂溶性高，分子量小

D: 蛋白结合率高,具有手性、分布容积大

答案：C

54.利尿药吲达帕胺引起的主要不良反应是

A: 低钾血症

B: 多毛症

C: 水肿

D: 高钾血症

答案：A

55.下列药品中，归属妊娠毒性药物A级的是

A: 美托洛尔

B: 青霉素

C: 环丙沙星

D: 氯化钾

答案：D

56.患者男,34岁因糖尿病酮症酸中毒入院,需静脉给予胰岛素或胰岛素类似物,应选用的药物是（）

A: 精蛋白锌胰岛素

B: 普通胰岛素

C: 门冬胰岛素

D: 低精蛋白锌胰岛素

答案：B

57.临终关怀是对于预期寿命少于几个月的慢病终末期患者的一项特殊疗护项目（）

A: 6

B: 5

C: 10

D: 12

答案：A

58.医师用药咨询的内容是

A: 抗菌药物的合理使用

B: 栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法

C: 减肥、补钙、补充营养素

D: 不宜选用氯化钠注射液溶解的药品

答案：A

59.乙型肝炎病毒表面抗体为

A：为一种保护性抗体，表明人体具有一定免疫力的指标

B：不能抑制HBV的增殖，可反映肝细胞受到HBV侵害后的一项指标

C：不能抑制HBV的增殖，出现在HBsAg转阴之后，证明人体对HBsAg有一定的免疫清除率的指标

D：乙型肝炎病毒感染早期血清中出现的一种特异性血清标记物

答案：A

60.需密闭，控制温度，保存中不能受潮的药品

A：胰酶片

B：利福平片

C：脂肪乳

D：低精蛋白胰岛素注射剂

答案：A

61.《中国药学文摘》属于

A：二级信息源

B：原始信息源

C：三级信息源

D：一级信息源

答案：A

62.妊娠早期是胚胎器官和脏器的分化时期，最易受外来药物的影响引起胎儿畸形。胎儿形成期，器官形成过程已经大体完成并继续发育，某些药物可导致胎儿发育异常。

A：氯霉素

B：青霉素

C：华法林

D: 磺胺药

答案：C

63.使用解热镇痛药用于解热，症状未缓解应及时就诊或向医师咨询，一般不超过

A: 3日

B: 2日

C: 1日

D: 4日

答案：A

64.以下毒物中，误服中毒、须用碳酸氢钠溶液洗胃的是

A: 瘦肉精

B: 苯二氮

C: 苯丙胺

D: 有机磷杀虫药

答案：D

65.“将药物治疗的成本与所产生的效益归化为以货币为单位的数字，用以评估药物治疗方案的经济性”是指查看材料

A: 最小成本分析方法

B: 成本一效益分析方法

C: 最大效果分析方法

D: 成本一效用分析方法

答案：B

66.影响伊曲康唑药效的PK/PD参数是

A: AUC0～24/MIC

B: %T>MI

C: Cmax / MIC

D: Cmax

答案：A

67.可与吸入性糖皮质激素合用的长效M胆碱受体阻断剂是

A: 异丙托溴铵

B: 噻托溴铵

C: 孟鲁司特

D: 沙美特罗

答案：B

68.肾功能不全患者宜选用的药物是

A: 经肝肠循环消除的药物

B: 经肝肾双途径消除的药物

C: 肾毒性小、经肝代谢的药物

D: 肝毒性小、经肾代谢的药物

答案：C

69.临床实践验证，一些毒物有相应的特效拮抗剂。因此，在进行排除毒物的同时，应积极使用特效拮抗剂。

A: 二巯丁二钠

B: 依地酸钙钠

C: 二巯丙醇

D: 青霉胺

答案：C

70.淋巴细胞正常参考区间是

A：0～0.01

B：0.03～0.08

C：0.20～0.40

D：0.01～0.05

答案：C

71.患者，男，66岁，身高170cm，体重85kg，以“头晕、胸闷、乏力1周”为主诉入院治疗。空腹血糖11.2mmol／L，餐后血糖16.5mmol／L。诊断结果：2型糖尿病。既往有磺胺类药过敏史，一直服用硝苯地平控释片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片控制高血压和冠心病。医师处方：二甲双胍0.5gbid、消渴丸10丸（规格30g／120丸）bid、罗格列酮4mgqd治疗。

A：高血脂

B：高血压

C：肝功能异常

D：腹胀

答案：C

72.吩噻嗪类抗精神病药中毒时若癫痫发作应给予

A：有机硫类

B：间羟胺

C：阿托品

D：地西泮

答案：D

73.（2019年真题）患者向药师咨询，停用口服避孕药后多久可备孕。下列答复中，正确的是

A：长效避孕药停药后即可备孕

B: 复方短效口服避孕药停药6个月后方可备孕
C: 复方短效口服避孕药停药后即可备孕
D: 复方短效口服避孕药停药3个月后方可备孕
答案：C

74.控制癫痫持续状态应入院后首选（）
A: 肌肉注射地西泮
B: 静脉注射地西泮
C: 口服硫酸镁
D: 静脉注射丙戊酸钠
答案：B

75.多数抗过敏药物慎用于（）
A: 胃溃疡患者
B: 慢性鼻炎患者
C: 前列腺增生老年患者
D: 高脂血症患者
答案：C

76.抗抑郁药物的合理使用适合治疗伴有焦虑症的抑郁患者的药物是
A: 帕罗西汀
B: 氟伏沙明
C: 阿米替林
D: 丙米嗪
答案：A

77.成人末梢血白细胞(WBC)计数正常参考区间是
A: (15.0～20.0)×

B: (4.0～10.0)×10

C: 180～220g/L

D: 170～200g/L

答案：B

78.下列情况不宜选用的抗高血压药，直立性低血压不宜选用

A: 哌唑嗪

B: ACEI

C: 利尿药

D: 非二氢吡啶类钙拮抗剂

答案：A

79.治疗口腔溃疡时，贴敷于溃疡处，每处1片，一日不得超过3片的药物是()

A: 地塞米松粘贴片

B: 甲硝唑口腔粘贴片

C: 冰硼咽喉散

D: 西地碘含片

答案：A

80.布桂嗪属于

A: 抗组胺药

B: 利尿剂

C: 镇痛药

D: 血管扩张药

答案：C

81.以下药物肾毒性从大到小依次为

A: 新霉素>庆大霉素>阿米卡星>妥布霉素>奈替米星>链霉素

B: 新霉素>庆大霉素>妥布霉素>阿米卡星>奈替米星>链霉素

C: 新霉素>奈替米星>阿米卡星>庆大霉素>妥布霉素>链霉素

D: 新霉素>阿米卡星>庆大霉素>妥布霉素>奈替米星>链霉素

答案：D

82.(透析患者常用药物)服用何种药物可以减轻透析患者出现骨和关节的疼痛或头痛

A: 对乙酰氨基酚

B: 乳果糖

C: 阿法骨化醇

D: 铁剂

答案：A

83.配制10%葡萄糖注射液500ml，现用50%和50A两种浓度葡萄糖注射液混合配制，分别需要

A: 85ml和415ml

B: 72ml和428ml

C: 56ml和444ml

D: 94ml和406ml

答案：C

84.属于润滑性泻药的是

A: 乳果糖

B: 开塞露

C: 番泻叶

D: 硫酸镁

答案：B

85.患儿，女，5岁，误服香豆素类杀鼠药。可选用的解救药物是

A: 纳洛酮

B: 维生素K

C: 二巯丙醇

D: 亚甲蓝

答案：B

86.药物相互作用是双向的，既可能产生对患者有益的结果，使疗效协同或毒性降低；也可能产生对患者有害的结果，使疗效降低和毒性增强，有时会带来严重后果，甚至危及生命。

A: 山莨菪碱联用哌替啶

B: 阿托品联用吗啡

C: 阿托品联用普萘洛尔

D: 铁剂联用维生素

答案：A

87.下列抗感冒药中，归属于处方药的是

A: 含伪麻黄碱的复方制剂

B: 奥司他韦片

C: 含金刚烷胺的复方制剂

D: 对乙酰氨基酚片

答案：B

88.环磷酰胺

A: 出血性膀胱炎

B: 溶血性尿毒症

C：心脏毒性

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/956135004101011030