

2024 江苏省江都区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题王牌题库有答案解析

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 患者，男，67 岁，慢性咳喘 20 余年，现因哮喘急性发作就诊，首选的药物是（）

- A: 氨茶碱片
- B: 异丙托溴铵气雾剂
- C: 沙丁胺醇气雾剂
- D: 二羟丙茶碱片

答案：C

2. 由护士双人核对监测

- A: 患者执行医嘱差错
- B: 护士执行医嘱差错
- C: 药师调配处方差错
- D: 医师处方差错

答案：B

3. 属于 B 级高危药品的是

- A: 血液透析液
- B: 全胃肠外营养液
- C: 5%葡萄糖注射液
- D: 50%葡萄糖注射液

答案：B

4. 易风化的药物是()。

- A: 青霉素
- B: 胃蛋白酶
- C: 硝酸甘油
- D: 硫酸镁

答案: D

5. 脑出血

- A: 4~5 周
- B: 2~4 周
- C: 1~2 周
- D: 2~3 周

答案: B

6. 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160 / 105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol / L（正常参考范围 <7.8mmol / L），三酰甘油 1.52mmol / L（正常参考范围 0.56~1.70mmol / L），总胆固醇 6.26mmol / L（正常参考范围 <5.2mmol / L），低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol / L（正常参考范围 2.1~3.1mmol / L），高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol / L（正常参考范围 1.20~1.65mmol / L），血肌酐 50 μ mol / L（正常参考范围 45~84 μ mol / L），蛋白尿（++）。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

- A: 控制体重
- B: 适当运动
- C: 不必限盐
- D: 减少脂肪摄入

答案: C

7. 某女性，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发喘憋。体检：端坐体位，BP190/110mmHg，R30 次/分，HR108 次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

- A: 肺结核？
- B: 急性左心衰竭？
- C: 肺动脉栓塞？
- D: 支气管哮喘？

答案：B

8. 体操运动员使用后，可减慢心率、减少心肌耗氧量，消除比赛前紧张心理，因此被列入兴奋剂管理的药物是

- A: 阿替洛尔
- B: 依那普利
- C: 利血平
- D: 氢氯噻嗪

答案：A

9. 患者，男，26 岁，因“咳嗽伴间断发热 1 周”入院，查体：T38.9℃，P90 次/分，R21 次/分，BP110/70mmHg，血常规：白细胞 $16.9 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 84.6%；胸部 CT 示右下肺炎症。诊断为“右侧肺炎”。

- A: 推荐应用大剂量万古霉素来维持其血药浓度在 15~20mg/L 并且长疗程的患者
- B: 肝功能不全者
- C: 老年人
- D: 肾功能不全者

答案：B

10. 患者，女性，32 岁，咳嗽、有脓性痰，痰液色黄或黄白相间，右侧胸痛，吸气时明显。体检：体型胖，神志清，急性病容，无口唇发绀，呼吸急促，体温 39.3° C，心率 100 次/分，肺部可闻及湿性啰音，WBC $14\times 10^9/L$ ，对青霉素类药物过敏。临床诊断为社区获得性肺炎。

- A: 红霉素
- B: 链霉素
- C: 布地奈德
- D: 左氧氟沙星

答案：D

11. 提示"噻托溴铵粉吸入剂所附胶囊需放到吸入装置内刺破吸入，不能直接吞服"，是针对

- A: 特殊装置药品
- B: 药品有效期
- C: 药品贮存
- D: 特殊剂型用法

答案：A

12. 新生儿服用氯霉素，因其在体内蓄积导致灰婴综合征，引起药源性疾病的因素主要为

- A: 年龄因素
- B: 基础疾病因素
- C: 遗传因素
- D: 性别因素

答案：A

13. 主要用于伴有血清 PSA 水平过高、前列腺体积增大的前列腺增生症患者的治疗药物是

- A: 坦索罗辛
- B: 非那雄胺
- C: 米多君
- D: 奥昔布宁

答案：B

14. 我国 CAP 的常见病原体不包括

- A: 肺炎衣原体
- B: 铜绿假单胞菌
- C: 流感嗜血杆菌
- D: 金黄色葡萄球菌

答案：B

15. 一般来讲，细菌药敏试验的报告不包括

- A: 涂片、培养鉴定
- B: 临床治疗方案
- C: 药敏试验（细菌名称、药物通用名、试验方法以及敏感结果判定）
- D: 临床信息（送检科室、临床诊断、标本类型等）

答案：B

16. （2016 年真题）患者，男，46 岁，因心绞痛伴房颤，给予维拉帕米治疗。维拉帕米的禁忌症是（）。

- A: 冠心病
- B: 心力衰竭
- C: 双侧肾动脉狭窄
- D: 痛风

答案：B

17. 患者，女，77 岁，53kg，既往糖尿病病史 10 年，因“反复尿路感染 4 个月，加重 3 天”来院就诊。4 个月前，患者无明显诱因出现排尿疼痛，间断低热，体温波动在 37.2℃～37.5℃之间，自服左氧氟沙星片 0.29bid 治疗 5 天后好转停药。其间多次反复发作，自服左氧氟沙星片好转。3 天前，患者再次出现尿路刺激症状，自行口服左氧氟沙星 0.29bid 治疗后无明显好转。门诊查尿常规示：白细胞（+++），白细胞计数 463.2 / g1，细菌计数 1262.1 / μl。查体：T37.9℃P86 次 / 分 R21 次 / 分 BP132 / 77mmHg，心、肺听诊无异常，腹平软，无压痛及反跳痛，左肾区叩击痛（+），双下肢无水肿。辅助检查：血常规：白细胞计数 12.35×10⁹ / L、中性粒细胞百分比 86.5%，CRP69.5mg / L。血生化：AST15U / L，ALT11U / L，ALB43.29 / L，Scr669mol / L。尿培养及药敏试验结果：大肠埃希菌（ESBLs+），细菌计数>10⁵cfu / ml；对左氧氟沙星耐药，对哌拉西林一他唑巴坦、亚胺培南敏感。

A: CTP 评分

B: HAS—BLED 评分

C: CAT 评分

D: 计算肌酐清除率

答案：D

18. 三环类抗抑郁药中毒解救和治疗时，不宜使用的是

A: 吐根糖浆

B: 毒扁豆碱

C: 普鲁卡因胺

D: 高锰酸钾溶液

答案：B

19. 对于绝经综合征患者，可根据患者的病情或用药需求，采用不同的药物制剂或给药方式进行绝经激素治疗（MHT）

- A: 17β 一雌二醇
- B: 雌二醇 / 雌二醇-地屈孕酮片
- C: 雌二醇一屈螺酮片
- D: 戊酸雌二醇 / 雌二醇-醋酸环丙孕酮片

答案：B

20. 糖尿病合并肾病者首选

- A: 格列喹酮
- B: 阿卡波糖
- C: 二甲双胍
- D: 比格列酮

答案：A

21. 患儿，女，4岁半，身高 110cm，体重 15KG，一天前发热（39℃），咽喉痛，无咳嗽、吐血，家长主诉在家中应用退烧药治疗，发病左右出现腹泻，约 2~5 次大便，量少，黄色粘液便，呕吐一次。体格检查：T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分。咽微充血，出现轻脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃，实验室检查：WBC： 5×10

- A: 分泌性腹泻
- B: 感染性腹泻
- C: 消化不良性腹泻
- D: 动力性腹泻

答案：B

22. 毒物种类很多，中毒方式各异，虽然有的毒物中毒尚无特效的解毒药，但救治原则基本相同。

- A: 异戊巴比妥
- B: 苯巴比妥
- C: 巴比妥
- D: 硫喷妥钠

答案：A

23. 万络（罗非昔布）撤市是发现大剂量服用万络者患心肌梗死和心脏猝死的危险增加了 3 倍；此例体现了药物警戒的作用包括

- A: 发现与规避假、劣药流入市场
- B: 发现药品说明书问题
- C: 药品上市前风险评估
- D: 药品上市后风险评估

答案：D

24. 患者平日佩戴隐形眼镜，使用抗结核药后，可导致患者隐形眼镜染色的药物是

- A: 乙胺丁醇
- B: 利福平
- C: 异烟肼
- D: 吡嗪酰胺

答案：B

25. 非霍奇金淋巴瘤的 CHOP 方案中不包括的治疗药物是

- A: 阿霉素
- B: 长春新碱
- C: 利妥昔单抗

D: 环磷酰胺

答案：C

26. 抑制磷酸二酯酶，增加细胞内 cAMP 含量，缓解慢性心衰症状的是

A: 氨力农

B: 多巴酚丁胺

C: 硝普钠

D: 地高辛

答案：A

27. 当创伤应激严重时，由葡萄糖与脂肪提供 NPC 的比例是

A: 100kcal: 1gN

B: NPC5: 5

C: NPC7: 3

D: 150kcal: 1gN

答案：B

28. 下列药物属于改善眼部调节功能的是

A: 羧甲基纤维素钠滴眼液

B: 七叶洋地黄双苷滴眼液

C: 玻璃酸钠滴眼液

D: 山莨菪碱滴眼药

答案：B

29. 下列临床试验分期中，上市后药品临床评价阶段属于

A: IIa 期临床试验

B: III期临床试验

C: IV期临床试验

D: I 期临床试验

答案: C

30. 患儿，男，3 岁半，身高 95cm，体重 16kg 一天前开始发热，20h 左右出现腹泻，约 3h 一次大便，量少，黄色黏液便，呕吐 1 次。检查结果：体温 38.8℃，脉搏 118 次/分，呼吸 28 次/分，出现轻微脱水症状，白细胞计数 $18.5 \times 10^9/L$ （参考值 $4.0 \times 10^9/L$ - $10.0 \times 10^9/L$ ），粪便镜检可见红、白细胞。

A: 若症状不能改善，可及时加用诺氟沙星

B: 若患者腹泻加重，可口服补液盐进行补液

C: 应避免高脂肪、高糖饮食

D: 每次腹泻后均要少量多次喝水，直至腹泻停止

答案: A

31. 不能耐受胃肠反应的贫血患者，铁剂适宜服用的时间为

A: 两餐间

B: 餐前

C: 餐后

D: 睡前

答案: C

32. 下述“关于肺结核的治疗原则”中，不正确的是

A: 减少结核菌的传播

B: 整个治疗方案分为 3 个阶段

C: 防止耐药菌产生

D: 整个治疗方案分为强化期和巩固期两个阶段

答案: B

33. 关于他汀类和贝特类的联合使用，下列说法正确的是

- A: 早晨服用贝特类、而晚上服用他汀类
- B: 晚间服用
- C: 早晚分别服用
- D: 早晨服用

答案：A

34. 长期精神紧张性头痛，推荐应用的药物是

- A: 罗通定
- B: 谷维素
- C: 阿司匹林
- D: 地西泮

答案：D

35. 关于治疗药物监测的论述，错误的是

- A: 所有的治疗药物都必须进行监测
- B: 是临床药学服务的重要内容之一
- C: 治疗药物监测可以实现给药个体化
- D: 治疗药物监测的常用英文缩写是“TDM”

答案：A

36. 治疗发热成人服对乙酰氨基酚，每隔 4~6 小时重复用药 1 次；1 日用量不得超过

- A: 2.5g
- B: 2.0g
- C: 4.5g
- D: 3.0g

答案：B

37. 下列“给药时间是依据生物钟规律而设定”的事例中，最正确的是

- A: 餐前服用阿莫西林
- B: 清晨服用硫酸镁
- C: 餐前服用格列本脲
- D: 清晨服用帕罗西汀

答案：D

38. 常见药源性疾病有药源性胃肠道疾病、肝脏疾病、肾脏疾病、血液疾病、神经系疾病、高血压病。

- A: 阿洛司琼
- B: 阿米替林
- C: 呋塞米
- D: 利血平

答案：B

39. 用于紧急避孕的药物是（）

- A: 甲睾酮
- B: 黄体酮
- C: 罗格列酮
- D: 左炔诺孕酮

答案：D

40. 就乙肝血清免疫学检查而言，判别“大三阳”区别于“小三阳”的主要检查项目结果是

- A: 抗-HBe(+)
- B: HBsAg(+)
- C: HBeAg(+)

D: 抗-HBs(+)

答案：C

41. 长期应用苯二氮

A: 后遗效应

B: 毒性反应

C: 首剂效应

D: 戒断症状

答案：D

42. 导致血糖异常、糖尿病的是

A: 己烯雌酚

B: 阿托伐他汀

C: 加替沙星

D: 罗非昔布

答案：C

43. 适宜于睡前服用的药物是

A: 沙丁胺醇

B: 西咪替丁

C: 氢化可的松

D: 舒林酸

答案：A

44. 抗真菌药

A: 嗜酸性粒细胞减少

B: 血红蛋白量增多

C: 中性粒细胞减少

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 血小板减少

答案：C

45. 前记

A: 药品名称、剂型、规格、数量、用法用量

B: 医师签名、药品金额

C: 临床诊断、费别

D: 主要实验室数据

答案：C

46. 不可震荡的是

A: 乙醚

B: 重组人促红素

C: 甘露醇注射剂

D: 降钙鼻喷雾剂

答案：B

47. 合剂的规范书写是

A: Dos

B: Mist

C: Dil

D: Liq

答案：B

48. 对服用抗蠕虫药后出现腹痛或口吐蛔虫的严重感染患者，应加服

A: 噻嘧啶

B: 甲苯咪唑

C: 枸橼酸哌嗪

D: 伊维菌素

答案：A

49. 可引起血小板减少症的抗肿瘤药物是

A: 阿昔洛韦

B: 甲氨蝶呤

C: 利巴韦林

D: 阿洛司琼

答案：B

50. 长期大量应用容易导致体重明显增加的是

A: 盐酸异丙嗪

B: 酮替芬

C: 氯雷他定

D: 色甘酸钠

答案：B

51. 患者，男，42 岁，胃癌根治术后，病理为胃窦低分化腺癌，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇+顺铂+氟尿嘧啶。

A: 晚期顽固性卵巢癌

B: 皮脂腺囊肿

C: 非精原细胞性生殖细胞癌

D: 晚期顽固性膀胱癌

答案：B

52. 患者，女，49 岁，近日因发热、咳嗽、咳黄痰就诊，临床诊断为下呼吸道细菌性感染，处方如下：

A: 左氧氟沙星片

B: 阿司匹林泡腾片

C: 氨溴索片

D: 维生素 C 片

答案：B

53. 很多药物存在血液系统影响，会造成某些血细胞增多或减少头孢拉定主要会造成

A: 中性粒细胞减少

B: 嗜酸性粒细胞减少

C: 嗜碱性粒细胞增多

D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：D

54. 有良好的促动力作用，无心脏不良反应的是

A: 莫沙必利

B: 西沙必利

C: 碳酸氢钠

D: 奥美拉唑

答案：A

55. 用于治疗苯二氮类药物中毒的特殊解毒剂是（）

A: 乙酰胺

B: 纳洛酮

C: 氟马西尼

D: 二巯丁二钠

答案：C

56. 依据"处方"的含义及其重要意义，属于处方的医疗文书是

- A: 药品出库单
- B: 病区用药医嘱单
- C: 临床诊断书
- D: 病区领药单

答案：B

57. 粪外观所对应的疾病,上消化道出血(>50ml)

- A: 柏油便, 黑色有光泽
- B: 暗红果酱色
- C: 白陶土便
- D: 米泔水样

答案：A

58. 用药剂量相同,妊娠期的血药浓度低于非妊娠期,是由于

- A: 血容量增加使血浆清蛋白浓度降低
- B: 妊娠晚期血流动力学发生改变较多
- C: 胃肠活动程度减弱,使吸收减慢
- D: 妊娠期药物分布容积明显增加

答案：D

59. (2015 年真题) 氨基糖苷类药物引起的典型药源性疾病是 ()。

- A: 胃肠类疾病
- B: 血液系统疾病
- C: 肝病
- D: 神经系统疾病

答案：D

60. II 度烫伤的临床表现为

- A: 局限性蚕豆或指甲大小的紫红色肿块，边缘鲜红，中央青紫
- B: 红斑性，皮肤变红，并有火辣辣的刺痛感
- C: 全层皮肤甚至肌肉或骨头坏死，皮肤变色，最后呈黑色
- D: 水疱性，患处产生水疱

答案：D

61. (2015 年真题) 患者，男，64 岁，身高 174cm，体重 92kg。既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，临床处方，阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

- A: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、单硝酸异山梨酯注射液
- B: 特拉唑嗪片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片
- C: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、辛伐他汀片
- D: 特拉唑嗪片、氨氯地平片、阿司匹林肠溶片

答案：A

62. 下列方法中不属于制定和调整给药方案基本方法的是

- A: CTP 评分
- B: PK/PD 参数法
- C: 稳态一点法
- D: 一点法和重复一点法

答案：A

63. 关于新型抗凝药物，下列说法不正确的是

- A: 达比加群酯直接作用于凝血酶(主要是 IIa 因子)
- B: 需监测 INR
- C: 可特异性阻断凝血瀑布中的某关键环节
- D: 与食物和药物相互作用小

答案：B

64. 抗血小板药

A: 氯吡格雷

B: 肝素

C: 利伐沙班

D: 华法林

答案：A

65. (2018 年真题) 由带状疱疹所致的严重后遗神经痛, 应选的药物是
()

A: 羟考酮缓释片

B: 芬太尼透皮贴剂

C: 对乙酰氨基酚片

D: 卡马西平片

答案：D

66. 属于抗胆碱药的是

A: 普拉克索

B: 恩托卡朋

C: 苯海索

D: 司来吉兰

答案：C

67. (体内贮铁量与血浆铁的运转率的关系), 铁缺乏时铁剂的吸收率可达

A: 20%~40%

B: 20%~60%

C: 10%~20%

D: 15%~20%

答案: B

68. 青霉素常采用的剂量单位是

A: IU

B: g

C: μg

D: mg

答案: A

69. 医师咨询"他汀类药物合用伊曲康唑或环丙沙星等", 属于

A: 新药信息

B: 药物相互作用

C: 禁忌证

D: 给药途径

答案: B

70. 氢氯噻嗪与地高辛同服出现心律失常的机制是

A: 敏感化作用

B: 减少不良反应

C: 竞争性拮抗作用

D: 协同作用

答案: A

71. (用药导致的血常规异常)阿司匹林

A: 中性粒细胞减少

B: 血红蛋白量增多

C: 嗜酸性粒细胞减少

D: 血小板减少

答案: D

72. 儿科用药中，对新生儿或婴儿最常用的给药途径是

A: 静脉滴注

B: 口服给药

C: 肌肉注射

D: 静脉注射

答案: A

73. 用于解救苯二氮草类药物中毒的特殊解毒剂是

A: 氟马西尼

B: 亚甲蓝

C: 纳洛酮

D: 乙酰半胱氨酸

答案: A

74. (2019 年真题) 患者，男，50 岁，临床诊断为焦虑症，给予氟西汀 20mgqd 治疗。对该患者用药教育的说法错误的是

A: 不能突然停止服用氟西汀

B: 氟西汀应于睡前服用

C: 不得随意自行调整氟西汀剂量

D: 服用氟西汀期间不能饮酒

答案: B

75. 米索前列醇所致的主要不良反应是

A: 皮炎

- B: 腹痛
- C: 神经毒性
- D: 性功能减退

答案：B

76. 患者用药咨询的内容是

- A: 抗菌药物的合理使用
- B: 减肥、补钙、补充营养素
- C: 栓剂、滴眼剂和气雾剂等外用剂型的正确使用方法
- D: 一种药品有多种适应证或用药剂量范围较大

答案：C

77. 选择药物的首要标准是药物治疗的

- A: 方便性？
- B: 有效性？
- C: 经济性？
- D: 安全性？

答案：B

78. 可发生抗惊厥药物过敏综合征等严重不良反应的抗癫痫药是

- A: 苯妥英钠
- B: 丙戊酸钠
- C: 卡马西平
- D: 拉莫三嗪

答案：C

79. 下列药物中，属于溶栓药物的为

- A: 血凝酶

B: 利伐沙班

C: 阿替普酶

D: 华法林

答案: C

80. 干眼症可选用 ()

A: 七叶洋地黄双苷滴眼液

B: 氧氟沙星滴眼液

C: 色甘酸钠滴眼液

D: 玻璃酸钠滴眼液

答案: D

81. 长期服用可引起干咳的药物是

A: 氯沙坦

B: 苯丙哌林

C: 右美沙芬

D: 卡托普利

答案: D

82. 钙通道阻滞剂

A: 依那普利

B: 缬沙坦

C: 氢氯噻嗪

D: 氨氯地平

答案: D

83. 脂溶性维生素吸收减少，是由于

A: 脂肪组织随年龄增长而增加，血浆白蛋白浓度降低

- B: 肝药酶活性的个体化差异影响大于年龄的增长
- C: 胆汁分泌缺乏
- D: 肾功能随年龄增长而减退

答案：C

84. 连续规律用药 2 日以上方能充分发挥作用的药品是

- A: β 受体拮抗剂
- B: 短效 β
- C: 非甾体抗炎药
- D: 吸入型糖皮质激素

答案：D

85. 可能导致癫痫发作的药物是

- A: 利血平
- B: 氟哌啶醇
- C: 麻黄碱
- D: 白消安

答案：C

86. 某男性患者，57 岁，既往高血压病史 10 年，与儿子吵架后突然起病，言语不清，左侧肢体无力，意识不清。查体：BP220 / 120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激(+)，左侧肢体不活动，左侧巴彬斯基征阳性。

- A: 脑血栓形成
- B: 短暂性脑缺血发作
- C: 脑出血
- D: 缺血性脑卒中

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/956243005054011030>