

2024 年广西壮族自治区《执业药师之西药学专业二》考试大全带答案（黄金题型）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 与长春新碱合用可增强神经系统及血液系统毒性

- A: 铂类
- B: 替尼泊苷
- C: 异烟肼
- D: 非格司亭

答案：C

2. 静脉滴注促皮质素 20~25 单位使肾上腺皮质达到最大兴奋，需维持静脉滴注

- A: 7~12 分钟
- B: 8 小时
- C: 4 小时
- D: 10~25 分钟

答案：B

3. 使用铁制品煎煮酸性食物

- A: 细胞缺氧、酸中毒、休克
- B: 锥体外系反应
- C: 过敏反应
- D: 恶心、腹痛、腹泻、食欲减退

答案：A

4. 有性激素样副作用的是()

- A: 氨苯蝶啶
- B: 氢氯噻嗪
- C: 呋塞米
- D: 螺内酯

答案: D

5. 糖皮质激素的药理作用不包括

- A: 抗病毒
- B: 免疫抑制
- C: 抗炎
- D: 抗休克

答案: A

6. 下述不属于抗血小板类药物的是

- A: 非特异性纤溶酶原激活剂
- B: 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体激动剂
- C: 血栓素 A₂ (TXA₂) 抑制剂
- D: 磷酸二酯酶抑制剂

答案: A

7. 主要作用是抗革兰阴性杆菌的半合成青霉素是

- A: 替卡西林
- B: 哌拉西林
- C: 替莫西林
- D: 阿莫西林

答案: C

8. (2015 年真题) 可与吸入性糖皮质激素合用的长效 β_2 受体激动剂是 ()。

- A: 噻托溴铵
- B: 沙美特罗
- C: 孟鲁司特
- D: 多索茶碱

答案: B

9. 患者, 男, 67 岁, 为葡萄糖-6 磷酸脱氢酶缺乏症患者, 如果使用复方磺胺甲噁唑, 可能引发的药源性疾病是

- A: 肌肉震颤
- B: 抗生素相关性腹泻
- C: 红人综合征
- D: 急性溶血性贫血

答案: D

10. 可引起肺毒性的抗肿瘤抗生素是

- A: 博来霉素
- B: 卡莫司汀
- C: 环磷酰胺
- D: 丝裂霉素

答案: A

11. 防止耐药现象的发生, 持续用药须有 12h 以上间歇期

- A: 氨氯地平
- B: 哌唑嗪
- C: 依那普利
- D: 硝酸甘油

答案：D

12. 下述药物中长期使用易产生耐受性的是()

- A: β
- B: 磷酸二酯酶抑制剂
- C: M 受体拮抗剂
- D: 白三烯受体阻断药

答案：A

13. 与神经-肌肉阻滞剂合用，可加重神经-肌肉阻滞作用的是

- A: 头孢氨苄
- B: 阿米卡星
- C: 克拉霉素
- D: 阿莫西林

答案：B

14. 替比夫定的作用靶点是

- A: HIV-1 反转录酶
- B: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶
- C: 脱氧核糖核酸聚合酶
- D: 神经氨酸酶

答案：C

15. (2021 年真题) 通过直接抑制凝血因子 Xa 而发挥作用的抗凝血药物 ()

- A: 华法林
- B: 依诺肝素
- C: 氯吡格雷

D: 利伐沙班

答案: D

16. 用于治疗骨质疏松的药物是

A: 依替膦酸二钠

B: 糖皮质激素

C: 甲状腺素

D: 胰岛素

答案: A

17. (2017 年真题) 属于 DPP-4 抑制剂的药物是 ()

A: 伏格列波糖

B: 利拉鲁肽

C: 那格列奈

D: 阿格列汀

答案: D

18. 可引起出血性膀胱炎的抗肿瘤药物是

A: 氟尿嘧啶

B: 多柔比星

C: 环磷酰胺

D: 甲氨蝶呤

答案: C

19. 氯霉素的抗菌作用机制

A: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制移位酶的活性

B: 与核糖体 50S 亚基结合，抑制肽酰基转移酶的活性

C: 与核糖体 30S 亚基结合，抑制蛋白质的合成

D: 影响胞浆膜通透性

答案：B

20. 可使维生素 B

A: 异烟肼

B: 糖皮质激素

C: 雌激素

D: 丙磺舒

答案：C

21. 应用高剂量的 β_2 受体激动剂可导致的严重典型不良反应是

A: 低钙血症

B: 高钙血症

C: 低镁血症

D: 低钾血症

答案：D

22. 治疗期间避免使用含磨砂剂的化妆品的药物()

A: 异维 A 酸

B: 壬二酸

C: 阿达帕林

D: 维 A 酸

答案：D

23. 口服难吸收，用于治疗溃疡性结肠炎的药物是

A: 磺胺甲

B: 磺胺米隆

C: 柳氮磺吡啶

D: 磺胺嘧啶

答案: C

24. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次/日。

A: 功能性消化不良

B: 化疗所致的恶心、呕吐

C: 胃食管反流病

D: 糖尿病胃轻瘫

答案: B

25. 克拉霉素与环孢素合用()

A: 不良反应叠加

B: 后者血药浓度升高，不良反应增加

C: 药理作用拮抗

D: 后者血药浓度下降，药效降低

答案: B

26. 丙硫氧嘧啶最严重的不良反应是

A: 粒细胞缺乏症

B: 关节痛

C: 胃肠道反应

D: 头痛

答案: A

27. (2016 年真题) 属于钠通道阻滞剂的抗心律失常药是

- A: 利多卡因
- B: 索他洛尔
- C: 硝酸甘油
- D: 美托洛尔

答案: A

28. 巴比妥类急性中毒时，导致死亡的主要原因是

- A: 心搏骤停
- B: 肾损害
- C: 呼吸循环衰竭
- D: 肝损害

答案: C

29. 关于青霉素不良反应的说法不正确的是

- A: 可发生过敏性休克、荨麻疹、血管神经性水肿等
- B: 局部刺激症状如注射部位疼痛、硬结较常发生
- C: 可引起接触性皮炎、血清病样反应等
- D: 有明显的肾毒性和耳毒性

答案: D

30. 噻嗪类利尿药中，属于水溶性的药物是()

- A: 氯噻嗪
- B: 氢氯噻嗪
- C: 氢氟噻嗪
- D: 苄噻嗪

答案: A

31. 患者，男，52 岁，BMI28kg/m²，既往有动脉粥样硬化性心血管病、高尿酸血症、痛风病，患者诉昨晚 8 点起右大脚趾关节处疼痛难忍宜使用的药物是

- A: 别嘌醇
- B: 碳酸氢钠
- C: 秋水仙碱
- D: 非布司他

答案：C

32. 阻碍 DNA 合成的药物是

- A: 紫杉醇
- B: 顺铂
- C: 氟尿嘧啶
- D: 高三尖杉酯碱

答案：C

33. 抗高血压药对预防脑卒中的强度依次为()

- A: ACEI>钙通道阻滞药(CCB)> β 受体阻断药>利尿药>ARB
- B: ACEI>钙通道阻滞药(CCB)>ARB>利尿药> β 受体阻断药
- C: 钙通道阻滞药(CCB)>ACEI>利尿药> β 受体阻断药>ARB
- D: 钙通道阻滞药(CCB)>利尿药>ACEI>ARB> β 受体阻断药

答案：D

34. (2016 年真题) 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

- A: 餐前半小时
- B: 餐时
- C: 餐后半小时

D: 餐后 1 小时

答案: B

35. 用于合胞病毒引起的肺炎和支气管肺炎的抗病毒药是

A: 利巴韦林

B: 拉米夫定

C: 更昔洛韦

D: 碘苷

答案: A

36. 引起睫状肌麻痹，适用于青少年屈光检查，尤其适用于 5 岁以下儿童的药物是

A: 阿托品

B: 奥布卡因

C: 羟苄唑

D: 20%甘露醇

答案: A

37. 可缩小皮脂腺，减轻上皮细胞分化()

A: 异维 A 酸

B: 阿达帕林

C: 维 A 酸

D: 过氧苯甲酰

答案: A

38. 患者，女，55 岁，临床诊断为 2 型糖尿病。目前药物治疗方案如下：
二甲双胍片口服 500mg，bid；阿卡波糖片口服 50mg，tid。

A: 用药期间应定期检查空腹血糖、尿糖、尿酮体及肝、肾功能

B: 现有方案不存在低血糖的风险

C: 可能出现的不良反应有腹痛，腹泻，腹胀

D: 服药期间不要饮酒，以免引起低血糖

答案：B

39. 患者女,32 岁,孕 2 周既往有癫痫病史长期服用卡马西平治疗为防止引起新生儿出血,该患者妊娠晚期应当补充的维生素是()

A: 叶酸

B: 维生素 D

C: 维生素 K

D: 维生素 B12

答案：C

40. 布地奈德的作用特点是

A: 不宜长期、单一、过量使用，不宜用于重度哮喘患者，对小于 18 个月的婴幼儿和大多数儿童有效

B: 适用于轻度持续型（2 级以上）哮喘的长期治疗

C: 10 μ g/ml 为有效治疗浓度，15-20 μ g/ml 以上会出现毒性反应

D: 舒张支气管作用弱且慢，适用于夜间哮喘和痰多的患儿

答案：B

41. 福莫特罗的平喘作用维持时间是

A: 3~5 分钟

B: 10~12 小时

C: 10~20 分钟

D: 4~6 小时

答案：B

42. 容易引起周围神经炎的抗结核药物是

- A: 利福平
- B: 异烟肼
- C: 链霉素
- D: 乙胺丁醇

答案：B

43. 异丙托溴铵属于

- A: 黄嘌呤类药物
- B: β 肾上腺素受体激动剂
- C: 白三烯调节剂
- D: M 胆碱受体阻断剂

答案：D

44. 不良反应为刺激性干咳的药物是()

- A: 依那普利
- B: 哌唑嗪
- C: 硝酸甘油
- D: 氨氯地平

答案：A

45. 高血压伴变异型心绞痛宜选用

- A: 硝苯地平
- B: 利血平
- C: 普萘洛尔
- D: 尼莫地平

答案：A

46. 患者，女，41 岁，因进食不洁食物后发生腹泻，伴有恶心、呕吐及下腹痛，大便每日 6~8 次，为糊状或稀水状，伴有黏液。血常规检查提示：白细胞计数、中性粒细胞百分比明显升高。粪常规：白细胞 8~10/HP，红细胞 3~5/HP。诊断：急性腹泻。医嘱：复方地芬诺酯片，2 片，口服，3 次/日；诺氟沙星胶囊，300mg，口服，2 次/日。

- A: 肾功能
- B: 肝功能
- C: 尿量
- D: 电解质

答案：D

47. 易使牙齿变黑的是

- A: 硫酸亚铁缓释片
- B: 硫酸亚铁糖浆
- C: 琥珀酸亚铁胶囊
- D: 硫酸亚铁片

答案：B

48. 与其他抗结核病药联合应用的是

- A: 庆大霉素
- B: 奈替米星
- C: 妥布霉素
- D: 链霉素

答案：D

49. 能治疗强心苷中毒引起的窦性心动过缓的是

- A: 阿托品
- B: 利血平

C: 哌替啶

D: 苯妥英钠

答案: A

50. 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的调节血脂药是()

A: 非诺贝特

B: 辛伐他汀

C: 依折麦布

D: 烟酸

答案: B

51. 伴有痛风的水肿病人，不宜选用下列哪种药物利尿

A: 氨苯蝶啶

B: 阿米洛利

C: 乙酰唑胺

D: 氢氯噻嗪

答案: D

52. 临床常用的巨幼红细胞性贫血治疗药物是

A: 维生素 B12

B: 香豆素类

C: 肝素

D: 维生素 K

答案: A

53. 多烯磷脂酰胆碱作为保护肝细胞药的作用机制是

- A: 作为细胞膜的重要组分，特异性地与肝细胞膜结合，促进肝细胞膜再生，协调磷脂和细胞膜功能，降低脂肪浸润，增强细胞膜的防御能力，起到稳定、保护、修复细胞膜的作用
- B: 通过各种机制发挥抗炎作用，有类似激素的作用
- C: 促进胆汁分泌，减轻胆汁淤滞
- D: 降低血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）水平

答案：A

54. 关于应对顺铂所致肾毒性的措施，下列说法错误的是()

- A: 定期检测电解质、肾功能，同时观察 24 小时尿量及尿颜色
- B: 使用时应充分水化，并及时给予利尿剂
- C: 必要时给予碳酸氢钠碱化尿液和别嘌醇
- D: 肾功能不全者可以使用

答案：D

55. 适应证为仅用于治疗失眠的药物是

- A: 地西泮
- B: 氟西汀
- C: 卡马西平
- D: 佐匹克隆

答案：D

56. 以下通过增加组织与肝脏对胰岛素的敏感性而降糖的是()

- A: 吡格列酮
- B: 二甲双胍
- C: 瑞格列奈
- D: 利拉鲁肽

答案：A

57. 异烟肼联用氢氧化铝使

- A: 吸收减少
- B: 月经不规则
- C: 肝毒性增加
- D: 疗效减弱

答案：A

58. 可用于减轻季节性过敏性鼻炎相关症状的药物是

- A: M 受体阻断剂
- B: β 受体激动剂
- C: 磷酸二酯酶抑制剂
- D: 白三烯受体阻断剂

答案：D

59. 可与小剂量糖皮质激素合用，能降低排异反应及感染的发生率，提高存活率的是()

- A: 甲泼尼龙
- B: 环孢素
- C: 硫唑嘌呤
- D: 环磷酰胺

答案：B

60. 用于预防绝经期妇女骨质疏松的治疗药()

- A: 地塞米松
- B: 黄体酮
- C: 米非司酮
- D: 雷洛昔分

答案：D

61. 新生儿服用可发生低凝血酶原血症及出血的药物是

- A: 卡马西平
- B: 苯巴比妥
- C: 唑吡坦
- D: 地西泮

答案：B

62. 连续使用应间隔 4 小时以上()

- A: 羟甲唑啉
- B: 赛洛唑啉
- C: 酚甘油滴耳液
- D: 麻黄碱

答案：A

63. 偏头痛，三叉神经痛选用

- A: 多奈哌齐
- B: 佐匹克隆
- C: 丙戊酸钠
- D: 布桂嗪

答案：D

64. 可加速硝基咪唑类药物清除，使血药浓度下降的是

- A: 奥硝唑+乙醇
- B: 甲硝唑+乙醇
- C: 替硝唑+苯巴比妥
- D: 替硝唑+华法林

答案：C

65. 可加速毒物排泄的药物是

- A: 呋塞米
- B: 乙酰唑胺
- C: 氨苯蝶啶
- D: 氢氯噻嗪

答案：A

66. 属于治疗固醇性胆囊结石的是

- A: 胶体果胶铋
- B: 多潘立酮
- C: 山莨菪碱
- D: 熊去氧胆酸

答案：D

67. (2018 年真题) 属于 β_2 受体激动剂的平喘药是 ()

- A: 沙美特罗
- B: 茶碱
- C: 噻托溴铵
- D: 孟鲁司特

答案：A

68. 患者，女，54 岁，诊断为右侧乳腺浸润性导管癌术后，病理示：右乳浸润性导管癌 II 级，同侧腋下淋巴结 1 / 18，免疫组化：ER(-)，PR(-)，Her(+). 肝肾功能正常。化疗方案为环磷酰胺+多柔比星+多西他赛。

- A: 腰椎间盘突出

- B: 严重心脏病
- C: 妊娠及哺乳期妇女
- D: 骨髓功能抑制

答案：A

69. 对于急性红斑、水疱可选择的剂型不包括

- A: 粉剂
- B: 乳膏剂
- C: 油剂
- D: 洗剂

答案：B

70. 促进大脑对磷脂和氨基酸的利用，增加蛋白质合成，改善脑缺氧和脑损伤的是

- A: 多奈哌齐
- B: 吡拉西坦
- C: 银杏叶提取物
- D: 胞磷胆碱钠

答案：B

71. 对爆发性或严重的组织胞浆菌感染首选的药物是

- A: 氟胞嘧啶
- B: 灰黄霉素
- C: 两性霉素 B
- D: 伏立康唑

答案：C

72. 患者，女，12 岁，身高 140cm，体重 32kg，因"脊柱侧弯"入院。入院后完善相关检查，拟行"脊柱侧弯截骨矫形檀骨融合内固定术"。既往有头孢类过敏史。

- A: 依替米星
- B: 阿奇霉素
- C: 克林霉素
- D: 左氧氟沙星

答案：C

73. 治疗滴虫性阴道炎适宜使用的药物是（）

- A: 苄星青霉素
- B: 庆大霉素
- C: 呋喃妥因
- D: 甲硝唑

答案：D

74. 服用异烟肼进行抗结核治疗的患者，为预防周围神经炎，应补充的维生素是（）

- A: 维生素 B6
- B: 维生素 A
- C: 维生素
- D: 维生素 B2

答案：A

75. 立克次体感染首选

- A: 氯霉素
- B: 头孢菌素
- C: 多黏菌素

D: 四环素

答案：D

76. 属于非麻醉性镇痛药的是

A: 吗啡

B: 可待因

C: 美沙酮

D: 布洛芬

答案：D

77. 人体内缺乏维生素 E 时会导致()

A: 佝偻病

B: 夜盲症

C: 脚气病

D: 不孕症

答案：D

78. 可使双膦酸盐的吸收下降，服用双膦酸盐后 2 小时内避免食用的是

A: 萘普生

B: 抗血管生成药

C: 高钙食品

D: 沙利度胺

答案：C

79. 可用于肝硬化腹水以及加速某些毒物排泄的药物是

A: 托拉塞米

B: 乙酰唑胺

C: 氨苯蝶啶

D: 氢氯噻嗪

答案: A

80. 治疗 MRSA 感染首选药物是

A: 万古霉素

B: 林可霉素

C: 红霉素

D: 克林霉素

答案: A

81. 关于维生素的使用，正确的是

A: 维生素 C 以空腹服用为宜

B: 长期服用维生素 C 应随访监测暗适应试验

C: 肌肉注射维生素 B1 需做皮肤敏感试验，静脉注射不需要

D: 大量应用维生素 E 可致血清胆固醇及三酰甘油降低

答案: A

82. 应用华法林时，为掌握好剂量，应测定

A: 凝血时间

B: 出血时间

C: 部分凝血活酶时间

D: 凝血酶原时间

答案: D

83. 替尼泊苷作为常见抗恶性肿瘤药物，首选用于治疗

A: 恶性淋巴瘤

B: 纤维瘤

C: 慢性淋巴细胞白血病

D: 脑瘤

答案：D

84. 属于 CYP2C9 的诱导剂，可以减少氟伐他汀的生物利用度 50% 的是

A: 利福平

B: 地高辛

C: 红霉素

D: 烟酸

答案：A

85. 全身用药可以用于伤寒、副伤寒的酰胺醇类药物是()

A: 复方磺胺甲噁唑

B: 氯霉素

C: 呋喃妥因

D: 左氧氟沙星

答案：B

86. 属于第二代喹诺酮类药物的是

A: 吡哌酸

B: 诺氟沙星

C: 莫西沙星

D: 萘啶酸

答案：A

87. 多数 ACEI 的起效时间在 1 小时，作用时间可以维持

A: 24 小时

B: 6 小时

专业《执业药师之西药学专业二》考试题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 12 小时

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/957126154052010024>