

2024 年辽宁省《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题完整版（突破训练）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 静脉滴注时间应控制在 2h 以上的药物是

- A: 青霉素
- B: 两性霉素 B
- C: 万古霉素
- D: 培氟沙星

答案：C

2. 对严重药品滥用和用药失误的处方，处置的方式是

- A: 应拒绝调配，并按有关规定报告
- B: 拒绝调配
- C: 准予调配
- D: 经改正并签字确认后，方可调配

答案：A

3. 血常规是最常用的医学检查指标，血常规异常可提示人们罹患某些疾患贫血患者常出现的血常规检查异常是

- A: 嗜酸性粒细胞增多
- B: 血红蛋白减少
- C: 中性粒细胞增多
- D: 血小板计数增多

答案：B

4. 1 个半衰期给药 1 次；如需要立即达到稳态，可首剂加倍针对

- A: 半衰期小于 30 分钟
- B: 半衰期大于 24 小时
- C: 半衰期 8~24 小时
- D: 半衰期大于 30 小时

答案：C

5. 尤以铅中毒疗效好的解毒剂是

- A: 二巯丁二钠
- B: 二巯丙醇
- C: 青霉胺
- D: 依地酸钙钠

答案：D

6. 具有肝毒性和性功能障碍不良反应，与其他药物同服时容易影响后者的血药浓度，不应成为该类药物首选的是

- A: 埃索美拉唑
- B: 西咪替丁
- C: 莫沙必利
- D: 硫糖铝

答案：B

7. 患混合型高脂血症，治疗时可与 ω -3 脂肪酸制剂联合应用的调脂药是

- A: 辛伐他汀
- B: 依折麦布
- C: 烟酸类

D: 氯贝丁酯

答案：A

8. 肺结核最常见的传播方式为（）

A: 垂直传播

B: 飞沫传播

C: 血液传播

D: 消化道

答案：B

9. 拓扑异构酶抑制剂

A: 放线菌

B: 依托泊苷

C: 培美曲塞

D: 顺铂

答案：B

10. 脂溶性最高，作用快而短的是

A: 戊巴比妥

B: 硫喷妥

C: 苯巴比妥

D: 巴比妥

答案：B

11. 为减少和预防差错的发生，逐一核对药品与处方的相符性，检查药品剂型、规格、剂量、数量、包装，并签字属于（）。

A: 发药环节

B: 调配处方环节

C: 药品储存环节

D: 接待投诉环节

答案: A

12. 用于治疗角化皲裂型足癣的是口服

A: 伊曲康唑

B: 抗生素

C: 特比萘芬

D: 抗真菌药

答案: D

13. 针对严重单纯急性酒精中毒同时出现烦躁不安症状的患者，下列救治措施中错误的是（）

A: 静脉注射纳洛酮 0.4mg 和吗啡 20mg

B: 静脉注射 50%葡萄糖注射液 100ml 和胰岛素 20U

C: 静脉滴注维生素 C 注射液 1g

D: 肌肉注射维生素 B1、维生素 B6 和烟酸各 100mg

答案: A

14. 口服或静滴 β 受体阻断剂用于解救

A: 异烟肼中毒

B: 瘦肉精中毒

C: 麦角胺中毒

D: 亚硝酸盐中毒

答案: B

15. 以下中毒后药物拮抗的叙述中，属于物理性拮抗的是

A: 二巯丙醇解救汞中毒

- B: 药用炭吸附
- C: 弱碱中和强酸
- D: 依地酸钙钠解救铅中毒

答案：B

16. 治疗急性腹泻可选用()

- A: 双八面体蒙脱石散
- B: 阿苯达唑
- C: 莫沙必利
- D: 聚乙醇 4000

答案：A

17. 1U 维生素 A 相当于

- A: $0.3\ \mu\text{g}$ 维生素 A
- B: $0.03\ \mu\text{g}$ 维生素 A
- C: $30\ \mu\text{g}$ 维生素 A
- D: $3\ \mu\text{g}$ 维生素 A

答案：A

18. 中成药血脂康中含有的化学成分是

- A: 依折麦布
- B: 辛伐他汀
- C: 洛伐他汀
- D: 阿托伐他汀

答案：C

19. 适宜于餐中给药的药物是

- A: 二甲双胍

B: 复方铝酸铋

C: 缬沙坦

D: 法莫替丁

答案: A

20. (2015 年真题) 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg，一天前开始发热 (39.1℃)，咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，约 2~3h 一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐 1 次。体格检查，T38.8℃，P118 次/分，R28 次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9/L$ (参考值 $4.0 \times 10^9 \sim 10.0 \times 10^9$)，粪便镜检可见红、白细胞。

A: 若症状不能改善，可及时加用诺氟沙星

B: 每次腹泻后均要少量多次喂水，直至腹泻停止

C: 应给予少量、多次、清淡饮食

D: 若患儿腹泻加重，可口服自制补液盐进行补液

答案: A

21. 适应证

A: 这次拿的“×××” (商品名) 是我以前一直服用的“格列齐特”吗

B: 中午忘吃药了怎么办

C: 这种药能报销吗

D: 这药能治我这种病吗

答案: D

22. (2018 年真题) 患者, 男, 59 岁, 高血压病史 5 年, 因头痛伴有恶心、呕吐就诊, MRI 检查结果显示蛛网膜下腔出血。为防治脑血管痉挛, 早期宜选用的药物 ()

- A: 缬沙坦
- B: 氨氯地平
- C: 硝苯地平
- D: 尼莫地平

答案: D

23. 沿静脉出现迂回线状色素沉着

- A: 博来霉素
- B: 氟尿嘧啶
- C: 柔红霉素
- D: 白消胺

答案: B

24. 下列关于巨幼细胞性贫血的说法, 错误的是

- A: 恶性贫血者需要终生维持治疗
- B: 可静脉滴注维生素 B₁₂ 100~500 μ g
- C: 全胃切除的巨幼细胞性贫血患者需要终生维持治疗
- D: 老年素食者和酗酒者为高危人群

答案: B

25. 引起急性细菌性扁桃体炎最常见的致病菌是

- A: 大肠埃希菌
- B: 金黄色葡萄球菌
- C: A 组 β 溶血性链球菌 (化脓性链球菌)
- D: 肺炎链球菌

答案：C

26. 可引起血清尿素氮降低的是

- A: 急性胰腺炎
- B: 中毒性肝炎
- C: 胃溃疡
- D: 慢性肾炎

答案：B

27. 并不存在风险，目前不需采取措施；评判为

- A: 待验证
- B: 确认
- C: 驳倒
- D: 验证

答案：C

28. 患者，男，53 岁。因心前区疼痛 6 年，加重伴呼吸困难 10 小时入院。入院前 6 年感心前区疼痛，痛系膨胀性或压迫感，多于劳累、饭后发作，每次持续 3~5min，休息后减轻。入院检查：体温 37.8℃，心率 130 次/分，血压 80/40mmHg。呼吸急促，颈静脉稍充盈，双肺底部可闻有湿鸣音，心界向左扩大，心音弱，入院诊断为冠心病。

- A: 阿司匹林是常用药，主要不良反应为胃肠道出血或阿司匹林过敏
- B: 发作时可含服作用较快的硝酸酯制剂，首次服用硝酸甘油时，应注意可能发生直立性低血压
- C: 他汀类药物能有效降低 TC 和 LDLC，其主要不良反应是头痛、面色潮红、心率反射性加快和低血压等
- D: 稳定性心绞痛患者，合并高血压、糖尿病、心力衰竭的患者可选用卡托普利、依那普利等药物

答案：C

29. 可引起尿液碱度增高的疾病是

- A: 糖尿病
- B: 呼吸性酸中毒
- C: 代谢性碱中毒
- D: 痛风

答案：C

30. 急诊处方印刷用纸为

- A: 淡红色
- B: 白色
- C: 淡绿色
- D: 淡黄色

答案：D

31. 庆大霉素可引起

- A: 听神经障碍
- B: 再生障碍性贫血
- C: 癫痫发作
- D: 锥体外系反应

答案：A

32. 药物警戒信号通过评价后，将事前检出的信号归类，提示并不存在风险，目前不需采取措施的信号属于

- A: 部分确认的信号
- B: 尚不确定的信号
- C: 确认的信号

D: 驳倒的信号

答案：D

33. 处置蛇类咬伤的重要措施是防止毒液的扩散和吸收，最先实施的应急措施是

A: 抽吸伤口内的毒液

B: 在伤口上做多个"十"字小切口

C: 用器械取出残留的毒蛇牙

D: 用绳索、布带将伤口的近心端的 5cm 处捆住

答案：D

34. 可使乳儿出现易激惹、尖叫、惊厥等神经系统症状哺乳期妇女不宜选用的药物是（）

A: 氯霉素

B: 链霉素

C: 依那普利

D: 左炔诺孕酮

答案：D

35. 患儿，女，4 岁半，身高 110cm，体重 15kg。1 天前开始发热，体温 39.1℃，咽部稍痛，无咳嗽、无吐泻。家长在家选用退热药对症治疗。发热 20h 左右出现腹泻，每间隔 2~3 小时排 1 次大便，量少，黄色黏液便，呕吐 1 次。体格检查：T38.8℃，P118 次 / 分，咽部微充血，出现轻微脱水症状；双肺呼吸音清，腹平软，肝、脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC $18.5 \times 10^9 / L$ ，粪便镜检可见红、白细胞。

A: 药用炭

B: 小檗碱

C: 鞣酸蛋白

D: 洛哌丁胺

答案: D

36. 下列口腔溃疡治疗药物可降低毛细血管的通透性，减少炎症的渗出的是

A: 地塞米松黏贴片

B: 维生素 C

C: 冰硼散

D: 甲硝唑含漱剂

答案: A

37. (2015 年真题) 可作为根除幽门螺旋杆菌感染一线治疗方案的是 ()。

A: 埃索美拉唑 20mgbid+克拉霉素 500mgqd+阿莫西林 0.5gtid

B: 埃索美拉唑 20mgbid+克拉霉素 500mgbid+阿莫西林 1.0gtid+枸橼酸铋钾 0.6gtid

C: 埃索美拉唑 20mgbid+克拉霉素 500mg tid+枸橼酸铋钾 0.6gtid

D: 埃索美拉唑 20mgqd+阿莫西林 1.0gqd+枸橼酸铋钾 0.6gqd

答案: B

38. 患者女，64 岁，10 天来夜间咳嗽，痰多，诊断为急性支气管炎，除了抗感染治疗外，在选服右美沙芬时应加用的药品是

A: 可待因

B: 氨茶碱

C: 洛贝林

D: 氨溴索

答案: D

39. 曲唑酮的作用机制为（）

- A: 抑制 5-HT 受体拮抗和再摄取
- B: 抑制 NE 再摄取
- C: 抑制 5-HT 和 NE 的再摄取
- D: 抑制单胺氧化酶

答案：A

40. 相互作用使药物吸收增加的联合用药是

- A: 铁剂联用维生素
- B: 硝苯地平联用普萘洛尔
- C: 阿托品联用吗啡
- D: 阿托品联用普萘洛尔

答案：A

41. 服药期间饮酒可致药效增强、引发风险的药物是

- A: 维生素
- B: 格列本脲
- C: 维生素
- D: 泼尼松

答案：B

42. 某患者，女性，28 岁，近半年出现面色苍白、头晕、乏力，近日头晕加重，并出现心慌、气短，到医院就诊，血常规检查示 Hb<90g / L。

- A: 溶血性贫血
- B: 巨幼细胞性贫血
- C: 白血病
- D: 缺铁性贫血

答案：D

43. 与左旋多巴合用，可提高疗效的药物是

- A: 苄丝肼
- B: 叶酸
- C: 奥美拉唑
- D: 克拉维酸钾

答案：A

44. 饮酒可导致患者对该药的耐受性降低的是

- A: 卡马西平
- B: 利血平
- C: 维生素 B1、维生素 B2
- D: 苯妥英钠

答案：A

45. 三环类抗抑郁药中毒的临床表现是（）

- A: 明显的锥体外系症状
- B: 谵妄、躁狂、幻觉
- C: 肌肉震颤、抽搐
- D: 心血管毒性

答案：D

46. （2018 年真题）患者，男，38 岁，因腹部受寒胃痉挛疼痛，应选用的药物是（）

- A: 布洛芬
- B: 卡马西平
- C: 山莨菪碱

D: 麦角胺咖啡因

答案：C

47. 泡腾片的使用正确的是

A: 100~150ml 凉开/温水中浸泡

B: 150~200ml 冷水中浸泡

C: 50~100ml 热水中浸泡

D: 幼儿可自行服用

答案：A

48. 服用他汀类调节血脂药可能导致

A: 血清白蛋白升高

B: 血白细胞计数降低

C: 血清碱性磷酸酶升高

D: 血清总胆固醇升高

答案：C

49. 血管扩张剂、 α 受体阻滞剂、抗抑郁药等可能会诱发或加重的反应是

A: 肝脏合成凝血因子能力下降，对肝素及华法林非常敏感

B: 心血管系统与维持水电解质平衡的内环境稳定功能减弱，易发生体位性低血压

C: β 受体阻滞剂普萘洛尔等减慢心率的作用亦钝化

D: 对异丙肾上腺素的敏感性降低

答案：B

50. 1 日 1 次用药的外文规范缩写是

A: qn

B: qod

C: qh

D: qd

答案：D

51. 患者，男，68 岁，既往体健，因“受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热 2 天”入院。查体：体温 39.1℃，血压 138 / 80mmHg，心率 102 次 / 分，呼吸 32 次 / 分，左肺可闻及湿性啰音。化验结果：白细胞计数 $11.2 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 85%。胸部 x 线：左肺下叶渗出性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

A: 肺炎链球菌

B: 支原体

C: 铜绿假单胞菌

D: 衣原体

答案：C

52. 适用于各种类型的心绞痛

A: 利多卡因

B: 普萘洛尔

C: 地高辛

D: 硝酸酯类

答案：D

53. 男性高血压患者应

A: 停用 ACEI 或减量

B: 给予硫酸亚铁

C: 联用他汀类

D: 慎用甲基多巴

答案：D

54. 由国家药典委员会组织编写的是

- A: 《中国药典临床用药须知》
- B: 《中国国家处方集》
- C: 《国家基本药物处方集》
- D: 《医师案头参考》

答案：A

55. 发热（发烧）指人体体温升高，超过正常范围，主要表现是体温升高、脉搏加快。按体温状况，发热分为低热、中等度热、高热、超高热。高热是指体温范围

- A: $39.1^{\circ}\text{C} \sim 41.0^{\circ}\text{C}$
- B: $37.0^{\circ}\text{C} \sim 38.3^{\circ}\text{C}$
- C: $37.4^{\circ}\text{C} \sim 38.0^{\circ}\text{C}$
- D: $38.1^{\circ}\text{C} \sim 39.0^{\circ}\text{C}$

答案：A

56. 与胆酸螯合剂合用，应至少提前 2h 服用的药物是

- A: 伊曲康唑
- B: 螺内酯
- C: 他汀类与烟酸类联用
- D: 依折麦布

答案：D

57. （2018 年真题）药师应掌握处方中常用的外文缩写，“每晚”用药的缩写是（）

- A: qn

B: prn

C: qid

D: qd

答案：A

58. (2018 年真题) 患者, 男 58 岁, 高血压病史 5 年, 吸烟史 40 年, 日均 40 支, 6 小时前出现左侧肢体无力, 并逐渐加重, 不能站立, 家属发现其说话迟钝含混, 右侧嘴唇变浅, 意识清楚, 到某院急诊 BP190/120mmHg, 血常规基本正常, 行头部 MRI 检查后, 诊断为急性脑梗死。

A: 甘露醇注射液 250mlq6hiv

B: 尼莫地平注射液 20mgqdiv

C: 胞二磷胆碱注射液 200mgqdiv

D: 呋塞米片 200mgqdp0

答案：A

59. 队列研究试验结果属于循证医学证据级别

A: 2 级证据

B: 1 级证据

C: 4 级证据

D: 3 级证据

答案：A

60. 非甾体类抗炎药导致消化性溃疡病的主要机制是 ()

A: 破坏胃黏膜屏障

B: 抑制胃酸分泌

C: 促进胃酸分泌

D: 影响胃、十二指肠协调运动

答案：A

61. 血尿酸检查超过正常值

- A: 诊断痛风
- B: 诊断心肌梗死
- C: 诊断急性胰腺炎
- D: 诊断消化性溃疡

答案：A

62. 不应剧烈震动、开启前应充分降温的是

- A: 重组人促红素
- B: 甘露醇注射剂
- C: 乙醚
- D: 降钙鼻喷雾剂

答案：C

63. 环磷酰胺可引起

- A: 出血性膀胱炎
- B: 溶血性尿毒症
- C: 心脏毒性
- D: 末梢神经炎

答案：A

64. 结核病化学治疗成功的关键措施是

- A: 采用间歇疗法
- B: 采用大剂量
- C: 避免与克服细菌耐药
- D: 采用短程疗法

答案：C

65. 急性胰腺炎发病几小时，血清淀粉酶达到高峰

- A: 48~72
- B: 2~12
- C: 12~72
- D: 1

答案：C

66. 下列药物中，可呈现肝药酶抑制作用的是

- A: 利福平
- B: 异烟肼
- C: 地塞米松
- D: 苯巴比妥

答案：B

67. 成人空腹血糖正常参考区间是

- A: 3.7~6.1mmol / L
- B: 3.9~6.1mmol / L
- C: 3.3~5.5mmol / L
- D: 3.5~6.1mmol / L

答案：B

68. 服用维生素 A、维生素 D 等应该食用的是

- A: 食盐
- B: 食醋
- C: 脂肪
- D: 酒

答案：C

69. 不宜与小活络丹、香连片、贝母枇杷糖浆合用的药品是

- A: 可待因
- B: 地高辛
- C: 氯苯那敏
- D: 氨茶碱

答案: D

70. 临床试验观测的指标限于实验设计内容，其他临床指标容易忽视，属于

- A: 病例数目少
- B: 管理漏洞
- C: 考察不全面
- D: 观察时间短

答案: C

71. 急性缺血性脑卒中抗血小板药物治疗的时机为

- A: 溶栓前 12h
- B: 溶栓后 12h
- C: 溶栓后 24h
- D: 溶栓同时

答案: C

72. 女，30 岁。G2P1 既往月经规律，月经量少，身体健康，要求长期采取避孕措施。

- A: 安全期避孕
- B: 宫内节育器
- C: 长效口服避孕药

D: 紧急避孕药

答案：B

73. 针对单纯严重乙醇中毒同时出现烦躁不安症状的患者，下列救治措施，错误的是()

A: 肌内注射维生素 B

B: 静脉滴注维生素 C 注射液 1g

C: 静脉注射纳洛酮 0.4mg 和吗啡 20mg

D: 静脉注射 50%葡萄糖注射液 100ml 和胰岛素 20U

答案：C

74. 麻醉药品、第一类精神药品处方的前记中，必须添加的项目是

A: 药品名称、剂型、规格、数量

B: 患者身份证明编号

C: 临床诊断

D: 患者姓名、性别

答案：B

75. (2015 年真题) 患者，女，51 岁，体检时发现血压 160/105mmHg，糖耐量试验餐后 2 小时血糖为 9.56mmol/L (参考范围 <7.8mmol/L)，甘油三酯 1.52mmol/L (参考范围 0.56~1.70mmol/L)，总胆固醇 6.26mmol/L (参考范围 <5.2mmol/L)，低密度脂蛋白胆固醇 4.85mmol/L (参考范围 2.1~3.1mmol/L)，高密度脂蛋白胆固醇 1.20mmol/L (参考范围 1.2~1.65mmol/L)，肌酐 60 μ mol/L (参考范围 45~84 μ mol/L)，蛋白尿：++。临床诊断为高血压病、高脂血症、糖耐量异常。

A: 特拉唑嗪

B: 依那普利

C: 复方利血平

D: 氢氯噻嗪

答案: B

76. 感冒初，出现卡他症状，如鼻粘膜充血、打喷嚏、流眼泪、流鼻涕，宜选服

A: 含伪麻黄碱及氯苯那敏制剂

B: 含非甾体抗炎药制剂

C: 含氢溴酸右美沙芬制剂

D: 含中枢兴奋剂咖啡因制剂

答案: A

77. 老年人服用可能出现锥体外系反应的药物是

A: 苯二氮革类药

B: 甲氧氯普胺

C: 哌替啶

D: 双嘧达莫

答案: B

78. 患者女,29 岁孕 29+6 周血压 160/100mmHg,尿蛋白(-),该患者降压药应选用()

A: 氨氯地平

B: 卡托普利

C: 甲基多巴

D: 厄贝沙坦

答案: C

79. 进行药学信息的收集、保管、整理、评价、传递、提供和利用，是

- A: 参与健康教育
- B: 处方点评
- C: 处方审核
- D: 药物信息服务

答案：D

80. 制定疾病的防治指南、国家基本药物目录、非处方药目录、医疗保险目录等以及药品淘汰时都参考循证医学的研究结果表明

- A: 列为行政决策的依据
- B: 有利诊断特殊疾患
- C: 改变降脂治疗观念
- D: 有助个体化给药

答案：A

81. 用半衰期较长的药物或缓控释制剂，每日 1 次给药

- A: 使用分时药盒和用药记录
- B: 针对患者生理及心理特点选药
- C: 简化治疗方案
- D: 使患者了解药物的重要性

答案：C

82. 可以抑制菌群的繁殖，可造成球后神经炎的药物是（）

- A: 乙胺丁醇
- B: 莫西沙星
- C: 氧氟沙星
- D: 异烟肼

答案：A

83. 饮酒后酒精除了影响神经系统、心血管系统的功能外，还会影响药物的疗效作用和毒副作用。因此，在服用药物时应该考虑酒精对药物的影响。

- A: 嗜睡
- B: 血压升高
- C: 痛风急性发作
- D: 出现蛋白尿

答案：C

84. 患者，女，54 岁，诊断为类风湿关节炎 2 年。目前服用甲氨蝶呤 (15mg, qw) 和塞来昔布 (200mg, qd)。患者因担心药物不良反应。用药不规律，时断时续。近几日出现腕关节肿胀和疼痛加重，晨僵明显，加用泼尼松 10mg, qd。

- A: 定期就诊，评估病情，调整治疗方案
- B: 多晒太阳，适量补充钙剂、维生
- C: 预防骨质疏松
- D: 早期治疗，遵医嘱规律用药

答案：A

85. 常见老年人 ADR 的药物类别，阿托品、苯海索等致尿潴留

- A: β 受体阻断剂
- B: 抗胆碱药
- C: 抗生素
- D: 钙通道阻滞剂

答案：B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

86. 无症状菌尿

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/957154152141010024>