

2024年安徽黄山市歙县中医医院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、蛋白质-热能营养不良小儿最先出现下列哪项？（ ）

- A. 体重减轻
- B. 皮下脂肪消失
- C. 体重不增
- D. 身高低于正常
- E. 肌张力低下

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2、患者，女，入院3天，头部受伤后立即昏迷，10分钟后清醒，有呕吐，对受伤情况不能回忆，考虑是（ ）。

- A. 脑震荡
- B. 脑干损伤
- C. 颅内血肿
- D. 脑挫裂伤
- E. 脑供血不全

【正确答案】

A

【答案解析】

脑震荡的表现为：①意识丧失，不超过30分钟。②头痛、恶心、呕吐等症状。③往往伴有逆行性健忘。④神经系统无阳性体征。具有明显的受伤史、意识丧失<30分钟、近事遗忘、神经系统无阳性体征、腰穿压力正常、脑脊液无红细胞，可作出诊断。

3、在临床医学研究时对受试者选择的最佳道德原则是（ ）。

- A. 充分权衡受试者的负担和权益，受益要大于负担
- B. 只要能挽救生命，受试者的权益可小于负担
- C. 只要病人同意，可不考虑受试者的负担和权益
- D. 受试者的负担和权益要大体持平
- E. 以上都不是

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

4、下列哪项是体内脂肪酸合成的主要原料？（ ）

- A. NADPH和乙酰CoA
- B. NADPH和乙酰乙酸
- C. NADPH和丙二酰CoA
- D. NADH和乙酰CoA
- E. NADH和丙二酰CoA

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

5、足月女婴，自然分娩，出生体重3kg，娩出时Apgar评分4分，抢救10分钟后评9分。生后2小时出现凝视、哭声单调，继而全身抽搐，肌张力偏高，为控制惊厥，应首先采用（ ）。

- A. 肌注呋塞米（速尿）3mg
- B. 肌注地塞米松15mg
- C. 20%甘露醇10ml静脉推注
- D. 苯巴比妥60mg15~30分钟内静滴
- E. 肌注维生素K₁1mg

【正确答案】

D

【答案解析】

生后有窒息，以后惊厥，诊断为新生儿缺氧缺血性脑病。止惊首选苯巴比妥，负荷量是20mg/kg，15~30分钟内静脉滴入。

6、脑组织在正常情况下主要利用葡萄糖供能，在下列哪种情况下脑组织主要利用酮体供能？（ ）

- A. 空腹
- B. 剧烈运动
- C. 短期饥饿
- D. 长期饥饿
- E. 轻型糖尿病

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

7、下列对T细胞表位的描述正确的是（ ）。

- A. 必须要有MHC分子
- B. 表位受体是TCR和BCR
- C. 表位位置是抗原表面
- D. 属构象表位
- E. 以上都不对

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

8、新生儿溶血病最常见的是（ ）。

- A. 葡萄糖6-磷酸脱氢酶缺乏症
- B. 球形红细胞增多症
- C. MN血型不合
- D. Rh血型不合
- E. ABO血型不合

【正确答案】

E

【答案解析】

目前已知血型抗原已有160种以上，但新生儿溶血病以ABO系统血型不合最为常见，其次是Rh系统血型不合。ABO溶血病中，母亲多为O型，婴儿为A型或B型；Rh溶血病以RhD溶血病最为常见，其次为RhE溶血病，亦可发生其他Rh溶血病。故答案为E

9、血胸欲行胸腔闭式引流术，最佳引流位置是（ ）。

- A. 腋中线第6~8肋间
- B. 腋中线与腋后线之间第6~8肋间

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/958000115140006040>