

单选题

- 1.成年妇女子宫形态学特征正确的是
  - A.重约 150g
  - B.宫腔容积约 10ml
  - C.长度 7~8cm
  - D.宫体：宫颈=1： 2
  - E.下部较上部宽
- 2.维持子宫在正常位置，主要依靠
  - A.子宫韧带及直肠支托
  - B.盆底组织支托
  - C.子宫韧带、骨盆底肌及筋膜
  - D.腹肌收缩力及膈肌收缩力
  - E.膀胱及直肠支托
- 3.下列哪项属于孕激素的生理作用
  - A.使增生期子宫内膜转化为分泌期内膜
  - B.促使子宫发育及肌层变厚
  - C.使乳腺腺管增生
  - D.促使阴道上皮细胞增生、角化
  - E.促使钠、水潴留
- 4.胎儿发育及生理特点下列哪项是正确的
  - A.妊娠 16 周末，胎儿身长 25cm
  - B.妊娠 20 周末，胎儿体重 700 克
  - C.妊娠 28 周末，可有呼吸运动
  - D.妊娠 32 周末，皮肤粉红色
  - E.妊娠 14 周，检查孕妇时能听到胎心音
- 5.关于妊娠期母体内分泌系统的变化，下列哪项正确
  - A.腺垂体不增大
  - B.促黑素细胞激素减少
  - C.甲状腺功能低下
  - D.皮质醇轻度减少

- E.垂体催乳激素增多
- 6.末次月经为 2001 年 3 月 25 日，预产期应是
- A.2002 年 1 月 2 日
  - B.2001 年 12 月 2 日
  - C.2002 年 1 月 11 日
  - D.2002 年 2 月 21 日
  - E.2001 年 12 月 30 日
- 7.关于宫颈口的扩大，下述哪项是错误的
- A.是子宫收缩向上牵拉的结果
  - B.前羊水囊的作用
  - C.破膜后胎先露直接压迫子宫颈
  - D.宫颈口扩张的快慢，决定了产程的长短
  - E.初产妇宫颈管消失与宫口开大同时进行
- 8.新生儿窒息的处理下列哪项是错误的
- A.整个复苏过程必须保温
  - B.胎头娩出后立即清除呼吸道内粘液和羊水
  - C.在呼吸道通畅的基础上行人工呼吸
  - D.纠正酸中毒
  - E.倒提双足，拍打背部，使口中粘液和羊水排出
- 9.关于分娩分期，错误的是
- A.从规律性宫缩至胎盘娩出为总产程
  - B.总产程分为 3 个时期
  - C.从规律性宫缩开始到宫口开全为宫颈扩张期
  - D.宫口开全至胎儿娩出为胎儿娩出期，初产妇为 1h—2h
  - E.胎儿娩出至胎盘娩出为胎盘娩出期约需 30min 以上
- 10.第一产程中用温肥皂水灌肠哪项禁忌是错误的
- A.胎膜早破
  - B.见红
  - C.心脏病，心功能Ⅲ、Ⅳ级
  - D.胎位异常

E.初产妇宫口扩张 4cm 以上

11.接生过程中，下列何项处理错误

- A.宫缩时，协助胎头俯屈
- B.协助胎头俯屈，是变枕下前凶径为枕额径
- C.应让胎头在宫缩间歇期娩出
- D.胎肩娩出时，仍应注意保护会阴
- E.宫缩时，接生者以手掌大鱼际肌向上内方托压会阴体

12.会阴切开指征下列哪项错误

- A.初产妇阴道助产手术
- B.会阴过紧或胎头过大
- C.早产时预防胎儿颅内出血
- D.经产妇，胎儿窘迫需要立即结束分娩
- E.估计分娩时会阴撕裂不可避免者

13.下列哪项符合正常产褥期子宫复旧的规律

- A.产后 30 天，子宫体恢复正常大小
- B.产后 4 周时子宫颈完全恢复正常形态
- C.产后 4 天内宫颈内口关闭
- D.产后 1 周，子宫于腹部不可扪及
- E.产后子宫底每天下降 3 厘米

14.初乳指

- A.产后 4 天分泌的乳汁
- B.产后 5 天分泌的乳汁
- C.产后 6 天分泌的乳汁
- D.产后 7 天内分泌的乳汁
- E.产后 8 天分泌的乳汁

15.流产病人宫颈内口松弛者应于妊娠一周行宫颈内口环扎术

- A.4 周
- B.8 周
- C.10 周
- D.14 周

E.20 周

16.早产的病人可在妊娠多少周行子宫颈内口环扎术

A.8 周

B.15 周

C.40 周

D.临产前

E.10 周

17.边缘性前置胎盘初次出血多发生于

A.临产前

B.20 周

C.28 周

D.32 周

E.38 周

18.前置胎盘阴道出血的特点是

A.多数发生在妊娠 28 周

B.出血发生在宫缩开始以后

C.出血量与前置胎盘的种类无关

D.胎膜破裂后出血减少或停止

E.出血时胎盘附着的子宫下段有压痛

19.羊水过多是指妊娠任何时期羊水量超过

A.300ml

B.500ml

C.1000ml

D.1500ml

E.2000ml

20.孙女士，27 岁，妊娠 28 周，轻微活动后自感心悸，气急，休息后无不适心功能为()级

A.0 级

B.Ⅱ级

C.Ⅲ级

D.Ⅳ级

E. I 级

21.针对上述病例，下列哪项处理是正确的

- A.宫口开全鼓励产妇屏气，腹部加压，快速分娩
- B.胎儿娩出后，在产妇腹部放置沙袋，预防心衰
- C.预防产后出血，静脉注射麦角新碱
- D.产后 24 小时鼓励产妇下床轻微活动，有助于子宫复位
- E.以上都不是

22.心脏病孕妇，心功能三级及以上者首选的处理原则是

- A.剖宫产
- B.侧切
- C.产钳
- D.自然分娩
- E.胎头吸引术

23.为了预防心力衰竭，孕妇休息应采取的卧位是

- A.平卧
- B.左侧或半卧位
- C.右侧卧位
- D.自由卧位
- E.仰卧位

24.足月新生儿血糖小于()视为低血糖

- A.5. 6mmol/L
- B.2. 22mmol/L
- C.6. 7mmol/L
- D.1. 7mmol/L
- E.1. 22mmol/L

25.妊娠合并病毒性肝炎的产后正确处理是

- A.产后继续保肝治疗
- B.新生儿不需做特殊处理
- C.高脂，高蛋白，高糖饮食
- D.产后常规用雌激素退奶

- E.母乳喂养
- 26.袁女士，妊娠 32 周，自行服用铁片二日，今晨大便黑色，无任何消化道症状，来院就诊，便常规无异常，作为护士你应该怎样为该孕妇解释黑便原因
- A.铁剂本身呈黑色
  - B.引起肠黏膜溃疡
  - C.生成硫化铁所致
  - D.引起上消化道出血
  - E.腐蚀肠壁血管
- 27.孕妇骨盆对角径 $<11.5\text{cm}$ ，余各径线均正常，是
- A.均小骨盆
  - B.漏斗骨盆
  - C.单纯扁平骨盆
  - D.类人猿型骨盆
  - E.倾斜骨盆
- 28.单臀先露是指
- A.胎儿双髋关节屈曲，双膝关节直伸
  - B.胎儿双髋关节及双膝关节屈曲
  - C.胎儿双足先露.
  - D.胎儿双膝关节屈曲
  - E.胎儿双膝或一膝关节先露
- 29.胎膜早破病人阴道流液的 PH 值说法正确的是
- A.PH 值 $\leq 4.5$
  - B.PH 值  $4.5\sim 5.5$
  - C.PH 值  $5.5\sim 6.0$
  - D.PH 值  $6.0\sim 6.5$
  - E.PH 值 $\geq 6.5$
- 30.24 岁孕妇，孕 1 产 0，39 周妊娠，做家务时突感阴道流水，急来我院就诊，首先考虑何种诊断
- A.胎膜早破
  - B.见红

- C.前置胎盘
  - D.胎盘早剥
  - E.正常临产
- 31.病理性缩复环最常见于
- A.男性骨盆
  - B.高张性宫缩乏力
  - C.软产道损伤
  - D.先兆子宫破裂
  - E.枕后位
- 32.不符合先兆子宫破裂的是
- A.病理性缩复环
  - B.休克表现
  - C.血尿
  - D.产妇疼痛难忍
  - E.胎儿宫内窘迫
- 33.病理性缩复环是指
- A.子宫上下段之间形成缩窄环并随宫缩逐渐上升
  - B.子宫某部肌肉呈不协调收缩形成环状狭窄
  - C.子宫上下段之间形成环状，位置不变
  - D.宫缩时硬，松弛时变软
  - E.围绕胎儿肢体形成的狭窄环
- 34.下列关于子宫破裂的叙述正确的是
- A.自然分娩者可以排除子宫破裂
  - B.缩复环越高先兆子宫破裂的可能性越大
  - C.子宫下段剖宫产疤痕易在妊娠期发生破裂，子宫体部剖宫产疤痕易在分娩期破裂
  - D.子宫破裂时应迅速从阴道娩出胎儿
  - E.血尿提示有先兆子宫破裂的可能
- 35.下列不是子宫痉挛性狭窄环的临床表现的是
- A.多发生于破膜后
  - B.环的下段薄而长，有压痛

- C.不随子宫收缩而上升
  - D.可出现于子宫的任何部位
  - E.产程易停滞
- 36.初产妇，妊娠 39 周，头位临产已 20 小时，估计胎儿体重约 3800g，骨盆外侧量正常，宫口已全开 2 小时，头位，诉下腹痛，导尿发现血尿，正确的处理应该是
- A.立即剖宫产
  - B.立即产钳助产
  - C.立即进行吸引器助产
  - D.再观察一小时
  - E.可静脉滴注小剂量催产素
- 37.最易发生急性右心衰竭的疾病是
- A.羊水栓塞
  - B.妊娠合并心脏病
  - C.妊娠期高血压疾病
  - D.妊娠期急性脂肪肝
  - E.产后出血
- 38.下列不易诱发羊水栓塞的是
- A.中期妊娠引产，钳刮术及剖宫产术时
  - B.滴注催产素后宫缩过强
  - C.宫缩间期破膜
  - D.前置胎盘
  - E.胎盘早剥
- 39.不是羊水栓塞的病理生理变化
- A.肺动脉高压及呼吸循环功能障碍
  - B.过敏性休克
  - C.弥漫性血管内凝血
  - D.全身小动脉痉挛
  - E.肾衰
- 40.29 岁初产妇，妊娠 40 周，分娩经过正常，在胎儿娩出后产妇突然气急，呼吸困难，随即昏迷，BP60/40mmHg，最可能的诊断是



- A.呼吸衰竭
  - B.心脑血管意外
  - C.羊水栓塞
  - D.子宫破裂
  - E.胎盘早剥
- 41.下列哪项表现严重时可出现“冰冻骨盆”
- A.急性子宫内膜炎
  - B.急性子宫肌炎
  - C.急性输卵管炎
  - D.急性盆腔结缔组织炎
  - E.急性盆腔腹膜炎
- 42.滴虫性阴道炎的传染方式，下列错误的是
- A.性交传播
  - B.宫内传播
  - C.公共浴池传播
  - D.游泳池传播
  - E.衣物传播
- 43.阴道内有大量脓性黄绿色呈泡沫状分泌物，最常见的疾病是
- A.假丝酵母菌类
  - B.细菌性阴道炎
  - C.滴虫性阴道炎
  - D.宫颈糜烂
  - E.老年性阴道炎
- 44.正常阴道菌群不包括
- A.支原体
  - B.假丝酵母菌
  - C.大肠杆菌
  - D.衣原体
  - E.消化球菌
- 45.有关慢性盆腔炎的治疗，错误的是

- A.增加营养，锻炼身体，提高抵抗力
  - B.单一疗法效果差，采用综合治疗为主
  - C.物理治疗
  - D.手术治疗
  - E.抗生素治疗，不宜手术治疗
- 46.无排卵型功血病员的基础体温呈
- A.双相型
  - B.低热
  - C.单相型
  - D.弛张热
- 47.绝经是指月经完全停止达()以上未来潮者
- A.1 年
  - B.2 年
  - C.3 年
  - D.6 个月
- 48.更年期妇女，妇查：子宫不大，阴道不规则流血，首先考虑
- A.子宫黏膜下肌瘤
  - B.子宫内膜炎
  - C.有排卵型功血
  - D.无排卵型功血
- 49.疑为子宫内膜不规则脱落，理想取内膜活检的时间是
- A.月经第 1 日
  - B.月经第 5 日
  - C.月经干净后 3 日
  - D.月经来潮前 12 小时
- 50.用孕激素治疗闭经出现撤药性阴道流血，表示
- A.子宫内膜萎缩
  - B.子宫内膜结核
  - C.子宫内膜对雌激素不起反应
  - D.子宫内膜已受雌激素影响

51.持续的雌激素作用而无孕激素拮抗，可能会导致以下几种子宫内膜病理改变，但除外

- A.子宫内膜简单型增生过长
- B.子宫内膜复杂型增生过长
- C.子宫内膜不典型增生过长
- D.增生期子宫内膜
- E.子宫内膜炎

52.绝经过渡期功血者治疗原则不包括

- A.大量雌激素止血
- B.调整周期
- C.孕激素药物刮宫
- D.大量孕激素止血
- E.刮宫

53.下列与排卵无关的项目是

- A.基础体温呈双相曲线
- B.阴道涂片多为中层细胞和角化前细胞
- C.宫颈粘液涂片见羊齿状结晶
- D.子宫内膜呈分泌反应
- E.卵巢内黄体形成

54.因闭经行卵巢功能检查，下列无关的项目是

- A.测基础体温
- B.阴道脱落细胞学检查
- C.宫颈粘液结晶检查
- D.子宫输卵管碘油造影
- E.测血中雌、孕激素值

55.卵巢性闭经不包括

- A.卵巢早衰
- B.卵巢切除
- C.卵巢功能性肿瘤
- D.低促性腺激素性闭经
- E.多囊卵巢综合症

- 56.原发性闭经是指
- A.年龄超过 13 岁，第二性征已发育或未发育，而无月经来潮者
  - B.年龄超过 16 岁，第二性征已发育，或年龄超过 14 岁，第二性征未发育，而无月经来潮者
  - C.年龄超过 14 岁，第二性征已发育，而无月经来潮者
  - D.年龄超过 15 岁，第二性征已发育，而无月经来潮者
  - E.年龄超过 18 岁，第二性征已发育或未发育，而无月经来潮者
- 57.葡萄胎的症状和体征不包括
- A.停经及阴道流血
  - B.子宫异常增大
  - C.妊娠高血压综合征
  - D.阴道紫蓝色转移灶
- 58.下列诊断依据对葡萄胎最有意义的是
- A.子宫妊娠 5 个月大小，摸不到胎体
  - B.B 超示落雪状图像
  - C.血 HCG>100KIU/L
  - D.阴道排出水泡状组织
  - E.停经后阴道出血
- 59.绒癌病人最常见的转移部位依次是
- A.肺、脑、肝、阴道
  - B.阴道、肺、肝、脑
  - C.肺、阴道、脑、肝
  - D.肝、脑、阴道、肺
  - E.肝、肺、阴道、脑
- 60.葡萄胎病人随访时间应为
- A.3 个月
  - B.6 个月
  - C.1 年
  - D.2 年
  - E.3 年

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/958011043046006037>