

外科学主治医师(烧伤外科学)模拟试题及答案

烧伤外科学专业(总分 160, 考试时间 90 分钟)

一、A1型题

1. 何种原因引起的Ⅱ度烧伤,通常不会出现水疱()

- A 沸水
- B 火焰
- C 钢水
- D 电火花
- E 强酸

答案:E

2. 烧伤急救过程中,最早的一个环节在何处实施()

- A 各个基层医院
- B 烧伤专科医院的急诊室
- C 重症烧伤监护病房
- D 烧伤现场
- E 急救中心

答案:D

3. 烧伤病人早期主诉口渴,最适宜饮用()

- A 凉开水
- B 大量糖水
- C 少量多次饮生理盐水
- D 大量茶水
- E 橘子水

答案:C

4. 大面积烧伤病人伤后 48 小时内最主要的并发症()

- A 创伤性休克
- B 毒血症
- C 脓毒症
- D 急性肾衰竭
- E 低血容量性休克

答案:E

5. 当前,下列哪项临床检测指标能够比较准确地反映组织缺氧的情况()

- A 动脉血压

- B 动脉血气分析
- C 血乳酸含量
- D 胃肠黏膜 pH
- E 中心静脉压

答案:D

6. 大面积烧伤患者早期清创的原则()

- A 全面彻底地清创
- B 待全身情况稳定后进行清创
- C 全身麻醉下进行清创
- D 清创过程中须去除所有坏死表皮
- E 患者入院后立即进行清创

答案:B

7. 男性成年患者,烧伤面积为 80%,均为Ⅲ度烧伤,创面处理应选择哪种方法为宜()

- A 有计划分期切痂植皮
- B 局部应用中草药
- C 一次性切痂植皮
- D 自然脱痂植皮
- E 磺胺嘧啶银冷霜保痂

答案:A

8. 男性,在车库修车时,不慎汽油燃烧,导致头面、颈部、双手烧伤,来医院就诊时,检查发现:病人声音嘶哑。面部肿胀明显,此时应考虑烧伤合并()

- A 休克
- B 神经损伤
- C 脑水肿
- D 吸入性损伤
- E 毒性反应

答案:D

9. 吸入性损伤,伤后的主要危害是()

- A 肺水肿
- B 窒息
- C 肺部感染
- D 呼吸衰竭
- E 呼吸频率增加

答案:B

10. 吸入性损伤主要影响()

- A 气体运送
- B 组织换气
- C 通气
- D 通气和换气
- E 换气

答案:D

11. 烧伤患者出现哪种情况,应考虑合并吸入性损伤()

- A 烧伤面积 $>80\%$
- B III度烧伤面积 $>50\%$
- C 口、鼻周围深度烧伤
- D 烦躁
- E 寒战

答案:C

12. 按照临床分类,中度吸入性损伤是指()

- A 病变仅限于门鼻、咽部
- B 病变主要侵犯咽、喉和气管
- C 病变可达支气管
- D 病变可达细支气管
- E 病变深达肺泡

答案:B

13. 早期诊断吸入性损伤具有诊断意义的()

- A 呼吸缓慢
- B 恶心呕吐
- C 呼吸性碱中毒
- D 声嘶和喘鸣
- E 烦躁

答案:D

14. 烧伤病人病原菌侵入的最主要途径()

- A 创面
- B 肠道
- C 呼吸道
- D 静脉导管
- E 留置尿管

答案:A

15. 烧伤侵袭性感染是指()

- A 烧伤组织内有大量细菌
- B 创面有脓性分泌物
- C 可伴有轻、中度发热
- D 组织细菌含量 $<10^5\text{cfu/g}$ 组织
- E 病原菌侵袭至痂下活组织,伴有全身中毒症状

答案:E

16. 导致重症烧伤病人真菌感染的最主要原因是()

- A 免疫功能增强
- B 长期卧床
- C 多次手术
- D 长期大量使用广谱抗生素
- E 静脉高营养

答案:D

17. 防治大面积烧伤感染,哪项正确()

- A 抗生素的应用是防止感染的唯一办法
- B 抗生素可以清除创面所有细菌
- C 所有病人均需预防性使用抗生素
- D 清创包扎
- E 临床须合理使用抗生素

答案:E

18. 成年男性,热烧伤 20%,均为III度烧伤,伤后 1 周,体温 38°C , $\text{WBC } 9.5 \times 10^9/\text{L}$,创面有脓性分泌物,该患者应考虑烧伤并发()

- A 非侵入性感染
- B 侵入性感染
- C 肠源性感染
- D 创面脓毒症
- E 脓毒症

答案:A

19. 男性,体重 60kg,烧伤总面积 60%,三度烧伤 30%,伤后 2 周按照 Curreri 公式计算,每日需补充热卡()

- A $20223\text{KJ}(2022\text{kca})$
- B $20220\text{kJ}(2022\text{kca})$
- C $20222\text{kJ}(2022\text{kca})$

D 20222kJ(2022kca

E 20222kJ(2022kca

答案:D

20. 患者工作中不慎被浓硫酸烧伤颜面部,最佳紧急处理措施()

A 立即到医院就诊

B 立即用碱性溶液予以中和处理

C 立即用大量清水冲洗颜面

D 立即用大量清水冲洗颜面,勿忘冲洗眼部

E 立即打电话与急救中心联系

答案:D

21. 烧伤休克期,关于补液公式,正确的是()

A 体重单位按照斤斤计算

B 烧伤面积的计算不包括 I 度烧伤

C 计算常数是 5ml

D 生理需要量为 2022ml

E 伤后第二个 24 小时补液量是第一个 24 小时总量的 2/3

答案:B

22. 大面积深度烧伤患者合并 ARDS 时,应该()

A 禁止实施切痂植皮手术

B 积极清除坏死焦痂

C 创面应用强力抗生素

D 必须进行有创血流动力学监测

E 大量输血

答案:B

23. 大面积烧伤患者,休克期防止应激性溃疡发生最关键的措施()

A 禁食

B 积极有效的液体复苏

C 早期应用胃肠动力药物

D 预防性应用止血药

E 检测胃液 pH

答案:B

24. 保留完整水疱皮的作用,哪项是错误的()

A 减少水分蒸发

B 减轻疼痛

- C 防止创面干燥而加深
- D 美观
- E 减少污染、感染

答案:D

25. 重症烧伤病人实施早期喂养的概念()

- A 休克期禁食
- B 休克期口服大量营养液
- C 休克期静脉补充营养
- D 休克期静脉补充高张葡萄糖溶液
- E 休克期在积极补液抗休克的同时,口服少量流质饮食

答案:E

26. 男性患者,伤后 18 小时,补液充足,中心静脉压高,少尿,此时应采取的最佳措施()

- A 给予血浆代用品
- B 快速滴注 20%甘露醇
- C 加快输液速度
- D 缓慢输入 20%清蛋白
- E 输血

答案:B

27. 下列哪项不是深Ⅱ度烧伤创面的特点()

- A 创面可有或无水疱
- B 创面痛觉迟钝
- C 可见粗大树枝状栓塞血管
- D 如无感染,约 3~4 周愈合
- E 愈合后多遗有瘢痕

答案:C

28. 患者烧伤早期出现血红蛋白尿时,在快速补液、应用利尿剂的同时,还应输入()

- A 抗菌药物
- B 高渗盐水
- C 低分子右旋糖酐
- D 清蛋白
- E 5%碳酸氢钠

答案:E

29. 判断重症烧伤病人休克是否得到改善,哪项临床监测指标最可靠()

- A 心率
- B 每小时尿量
- C 呼吸频率
- D 是否口渴
- E 神志

答案:B

30. 关于烧伤创面的处理,哪项错误()

- A 大面积烧伤病人入院后立即给予彻底清创
- B 较大且完整的水疱宜清除水疱液
- C 头、颈和会阴部烧伤创面适用于暴露疗法
- D 尚不能准确判断深Ⅱ度或Ⅲ度烧伤创面时,宜采用削痂疗法
- E 浅度烧伤创面宜采用包扎疗法

答案:A

二、A3型题

男性,35岁,体重60kg,双上肢、躯体、双臀会阴部被硫酸烧伤,伤后20分钟到达医院就诊。

31. 此时医生应该立即采取哪种急救措施()

- A 立即用大量清水冲洗
- B 包扎疗法
- C 创面外涂碱性药物
- D 立即送往监护病房
- E 以上都是

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:A

32. 该患者烧伤面积为()

- A 25%
- B 40%
- C 50%
- D 60%
- E 30%

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:C

33. 第一个24小时补液总量()

- A 2022~2022ml
- B 2022~2022ml
- C 2022~2022ml
- D 2022~2022ml
- E 2022~2022ml

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:E

34. 该患者Ⅲ度烧伤创面治疗宜采取()

- A 蚕食脱痂
- B 保守疗法
- C 包扎疗法
- D 早期施行切痂植皮手术
- E 半暴露疗法

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:D

8岁小孩不慎将暖水瓶打碎而致双下肢烫伤。

35. 最恰当的现场急救方法()

- A 立即将浸有热水的衣物脱掉
- B 立即将患儿送到烧伤专科医院诊治
- C 立即脱掉浸有热水的衣物,用凉毛巾湿敷创面
- D 立即拨打急救中心电话,将患儿送往医院救治
- E 立即口服索密痛片

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:C

36. 该患儿烧伤面积()

- A 35%
- B 50%
- C 45%
- D 42%
- E 30%

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:D

37. 到医院后应首先采取的急救措施()

- A 应用创面外用药
- B 立即拍照胸部 X线片
- C 行气管切开术
- D 导尿
- E 静脉穿刺补液

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:E

男性患者,热烧伤 20%,伤后 10 天,创面有脓性分泌物并伴有创缘炎性反应,体温 39℃,伴有寒战,创面分泌物细菌培养(+),创面组织细菌计数>105cfu/g 组织。

38. 该患者诊断为()

- A 非侵入性感染

- B 创面脓毒症
- C 肠源性感染
- D 毒血症
- E 脓毒症

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:B

39. 该患者最佳的治疗方案()

- A 全身应用抗生素
- B 实施切痂植皮术
- C 局部应用强力抗生素
- D 去除坏死组织,同时全身抗感染治疗
- E 包扎疗法

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:D

患者,男性,被1万伏高压电击伤双上肢、双下肢,否认外伤及呼吸心跳停止病史。于伤后16小时就诊,体检发现:患者极度烦躁,心率158次/分,血压90/80mmHg,双上肢肿胀明显,桡动脉搏动微弱,皮温低,尿液呈酱油色。

40. 此患者应考虑电击伤并发()

- A 脑外伤
- B 多发骨折
- C 烧伤休克
- D 心源性休克
- E 失血性休克

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:C 41. 液体复苏的同时还应考虑加用()

- A 血浆
- B 清蛋白
- C 全血
- D 维生素C
- E 碳酸氢钠

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:E

42. 双上肢创面宜立即采取()

- A 切痂植皮手术
- B 神经血管探查术
- C 暴露疗法
- D 包扎疗法
- E 切开减张术

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:E

成年男性,在房间内因煤气泄漏燃烧而导致头、面、颈部、双上肢烧伤,伤后2小

,体检发现,病人声音嘶哑,面部肿胀明显,双上肢、双手创面呈环状皮革样改变,渗出不多,痛觉减弱。

43. 此患者首先应考虑烧伤可能合并()

- A 烧伤休克
- B 神经损伤
- C ARDS
- D 吸入性损伤
- E 毒性反应

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:D

44. 此时首先应该做的检查是()

- A 血常规
- B 尿常规
- C 动脉血气分析
- D 喉镜或纤维支气管镜检查
- E 血液流变学检查

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:D

45. 双上肢创面建议立即实施()

- A 创面外涂磺胺嘧啶银
- B 神经血管探查术
- C 切开减张术
- D 清创术
- E 包扎疗法

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:C

46. 双手最佳处理方法是()

- A 暴露疗法
- B 包扎疗法
- C 扩创植皮术
- D 脱痂后实行自体皮肤移植术
- E 切(削)痂自体皮肤移植术

该题您未回答: x 该问题分值: 2

答案:E

成年男性患者,热烧伤 80%,合并中度吸入性损伤,伤后 4 小时来院就诊。体检及化验发现:体温 36℃,心率 160 次/分,呼吸 28 次/分,血压测不到,导出 40ml 血红蛋白尿。遂立即快速补液,于 2 小时内输入 5%葡萄糖溶液 2022ml,生理盐水 500ml。随后,病人心率高达 180 次/分,呼吸加快,双肺可闻及啰音,咳血性泡沫样痰。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/958035022007006137>