

江苏住院医师急诊科 II 阶段-急性肺栓塞

1、下面哪项不是肺动脉栓塞典型心电图的改变（）

- A. SIQXTIII
- B. 电轴显著右偏
- C. 极度顺钟向转位
- D. 右束支传导阻滞
- E. V₁~V₄ 出现病理性 Q 波

2、患者，男，60 岁，有下肢水肿病史 5 年，右下肢水肿较剧，无高血压和糖尿病病史。昨晚在看电视时突感呼吸困难，活动后加重，不伴咳嗽、咳痰，其可能的诊断为（）

- A. 肺动脉血栓形成
- B. 肺动脉血栓栓塞
- C. 肺动脉脂肪栓塞
- D. 肺血流量增加
- E. 肺动脉狭窄

3、男，50 岁，髋关节术后 1 个月，起床后突发胸痛，咯血，呼吸困难。体检：呼吸急促，肺部可闻及湿性啰音，P₂ 亢进，左下肢肢体肿胀压痛。ECG：SQT，WBC⁺，D-Dimer⁺。最可能的诊断为（）

- A. 急性心肌梗死

- B. 气胸
- C. 肺炎
- D. 肺栓塞
- E. 主动脉夹层

4、关于肺血栓栓塞定义错误的是（）

- A. 肺动脉广泛阻塞时可以导致急性左心衰竭
- B. 是肺栓塞的常见类型
- C. 是肺栓塞的一种类型
- D. 引起肺血栓栓塞的血栓主要来源是深静脉血栓形成
- E. 英文缩写是 PTE

5、肺栓塞最常见的类型是（）

- A. 脂肪栓塞综合征
- B. 空气栓塞
- C. 肺血栓栓塞症
- D. 肺动脉肿瘤栓塞
- E. 羊水栓塞

6、引起肺血栓栓塞症的血栓主要的来源是（）

- A. 恶性肿瘤
- B. 中心静脉插管

- C. 静脉内化疗
- D. 二尖瓣赘生物
- E. 深静脉血栓形成

7、肺血栓栓塞一般不会出现（）

- A. 右心衰竭
- B. 胸痛
- C. 心源性哮喘
- D. 呼吸困难
- E. 咯血

8、有关肺血栓栓塞的流行病学资料错误的是（）

- A. 发病过程隐匿
- B. 漏诊率和误诊率较高
- C. 确诊需特殊技术
- D. 发病率高但病死率低
- E. 症状无特异性

9、不属于肺血栓栓塞症的原发性危险因素的是（）

- A. 先天性异常纤维蛋白原血症
- B. 肾病综合征
- C. 抗凝血酶缺乏

D. 纤溶酶原缺乏

E. 血栓调节因子异常

10、不属于肺血栓栓塞症的继发性危险因素的是（）

A. 抗心磷脂抗体综合征

B. 吸烟

C. 血小板异常

D. 克罗恩病

E. 脊髓损伤

11、下列哪种情况最易发生肺血栓栓塞症（）

A. 腹部大手术

B. 疝修补术

C. 脊髓损伤

D. 冠脉搭桥术

E. 外科手术后

12、关于肺血栓栓塞症的原发性危险因素理论错误的是（）

A. 原发性因素引起的常以反复静脉血栓形成和栓塞为主要临床表现

B. 随年龄增长发病率逐渐增加

C. 呈家族遗传倾向

D. 原发性危险因素由遗传变异引起

E. V 因子突变属于原发性危险因素

13、引起肺血栓栓塞的栓子最常见来自（）

- A. 右心腔
- B. 上腔静脉径路
- C. 下肢深静脉
- D. 中心静脉
- E. 锁骨下静脉

14、一般认为肺血栓栓塞更易发生的部位是（）

- A. 右上叶
- B. 右中叶
- C. 右侧肺尖
- D. 左侧肺尖
- E. 右侧和下肺叶

15、肺血栓栓塞导致低血压或休克的机制是（）

- A. 右心房压力增加
- B. 右心扩大致室间隔左移，使左心室受损
- C. 肺动脉收缩，血流灌注减少
- D. 右心血流量减少
- E. 回心血量减少

16、肺血栓栓塞症最多见的症状是（）

- A. 咳嗽、咳痰
- B. 端坐呼吸
- C. 唇指发绀
- D. 咯血
- E. 活动后呼吸困难

17、肺梗死三联症是（）

- A. 呼吸困难、胸痛、咯血
- B. 烦躁不安、呼吸困难、咯血
- C. 呼吸困难、晕厥、咯血
- D. 心动过速、呼吸困难、咳嗽
- E. 呼吸困难、咳嗽，胸痛

18、关于深静脉血栓形成的临床表现，错误的是（）

- A. 皮温降低
- B. 患肢疼痛、压痛
- C. 皮肤色素沉着
- D. 患肢肿胀
- E. 患肢周径增粗

19、深静脉血栓形成一般要测量双下肢的周径，大腿的测量点在髌骨上缘 15cm，一般双侧相差多少才有临床意义（）

- A. 2.0cm
- B. 0.5cm
- C. 2.5cm
- D. 1.0cm
- E. 1.5cm

20、肺血栓栓塞症心脏听诊时可能出现的体征是（）

- A. 舒张期连续性杂音
- B. 心尖区的收缩期杂音
- C. 心包摩擦音
- D. 肺动脉瓣区第二心音亢进或分裂
- E. 开瓣音

21、在提示诊断肺血栓栓塞症和除外其他心血管疾患方面有重要价值的检查是（）

- A. 心电图
- B. 肺功能检查
- C. 超声心动图
- D. 动脉血气分析
- E. X 线胸片

22、超声心动图检查时，划分次大面积肺血栓栓塞症的依据是（）

- A. 肺动脉扩张
- B. 右心室局部运动幅度降低
- C. 室间隔左移和运动异常
- D. 三尖瓣返流
- E. 右心室和右心房扩大

23、临床上能基本排除急性肺血栓栓塞症时，患者血浆 D-二聚体含量应低于（）

- A. 500mmol / L
- B. 600 μ g / L
- C. 0.75mg / L
- D. 400 μ g / L
- E. 500 μ g / L

24、肺血栓栓塞症最重要的诊断方法是（）

- A. 血浆 D-二聚体
- B. 胸部 X 线
- C. 支气管激发试验
- D. 放射性核素肺通气 / 灌注扫描
- E. 超声心动图

- 25、肺血栓栓塞症放射性核素肺通气 / 灌注扫描典型的征象是 ()
- A. 肺段分布的肺灌注缺损，并与通气显象不匹配
 - B. 放射性斑片状缺损
 - C. 肺通气阳性，肺灌注阴性
 - D. 灌注图像显示放射性分布呈非节段性，斑片状减低区或缺损区
 - E. 通气图像上表现为中央气道内放射性沉积增多，形成散在的减低区或缺损区

- 26、对肺段以上肺动脉内血栓的诊断敏感性和特异性较高的检查是 ()
- A. 肺动脉造影
 - B. 超声心动图
 - C. 放射性核素肺通气 / 灌注扫描
 - D. 螺旋 CT 和电子束 CT
 - E. 磁共振显像

- 27、具有创伤性的检查是 ()
- A. 螺旋 CT 和电子束 CT
 - B. 放射性核素肺通气 / 灌注扫描
 - C. 磁共振显像
 - D. 超声心动图
 - E. 肺动脉造影

28、在临床上肺血栓栓塞症有时会误诊为肺炎，下列哪项不是肺炎的临床表现（）

- A. 呼吸困难
- B. 咳痰、咯血
- C. 晕厥
- D. 胸痛
- E. 咳嗽、发热

29、急性大面积肺血栓栓塞的主要临床表现是（）

- A. 休克与低血压
- B. 晕厥
- C. 咯血
- D. 咳嗽、咳痰
- E. 呼吸困难与急促

30、大面积与小面积肺血栓栓塞的区别要点是（）

- A. 是否有咯血
- B. 血浆 D-二聚体升高程度
- C. 呼吸困难的程度
- D. 有无休克与低血压
- E. 是否有剧烈胸痛

20mmHg，活动后肺动脉平均压 >30 mmHg

57、肺血栓栓塞症常用的治疗方法有（）

- A. 溶栓治疗
- B. 免疫治疗
- C. 强心治疗
- D. 抗凝治疗
- E. 支气管舒张药

58、溶栓治疗的绝对禁忌症是（）

- A. 15 天内的严重创伤
- B. 近期自发性颅内出血
- C. 有活动性内出血
- D. 大手术
- E. 2 个月内有缺血性脑卒中的病人

59、溶栓治疗常用药物有（）

- A. 链激酶
- B. 华法林
- C. 尿激酶
- D. rt-PA

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/958056016006006037>