

2024 湖南省平江县《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库（全国通用）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. （2018 年真题）不能减小前列腺的体积，也不能降低 PSA 水平，但可松弛前列腺平滑肌，缓解膀胱和下尿道急性症状的药物是（）

- A: 坦索罗辛
- B: 西地那非
- C: 非那雄胺
- D: 他达拉非

答案：A

2. 静脉溶栓首选的药物是

- A: 阿替普酶
- B: 维生素 K
- C: 达比加群酯
- D: 重组人促红素

答案：A

3. 胃肠道不良反应较轻的是

- A: 硫酸亚铁缓释片
- B: 琥珀酸亚铁胶囊
- C: 硫酸亚铁糖浆
- D: 硫酸亚铁片

答案：A

4. 以下药物治疗高血压时，给药次数为一日 2 次给药的是

- A: 非洛地平缓释片
- B: 硝苯地平控释片
- C: 硝苯地平缓释片
- D: 氨氯地平片

答案：C

5. 用药后可使尿液呈橘红色的药物是

- A: 异烟肼
- B: 乙胺丁醇
- C: 链霉素
- D: 利福平

答案：D

6. 男性，70 岁，进食后饱胀不适伴反酸 5 年余，黑便 1 天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡（A1 期）伴出血。

- A: 埃索美拉唑
- B: 阿莫西林
- C: 胶体果胶铋胶囊
- D: 克拉霉素

答案：C

7. 属于胃黏膜保护药的是

- A: 多潘立酮
- B: 胶体果胶铋
- C: 山莨菪碱
- D: 熊去氧胆酸

答案：B

8. 患者，男性，23 岁。患者 2 年前出现咳嗽，低热，气喘，胸闷隐痛，盗汗。经 X 线诊断为“肺结核”，以抗结核药物治疗。

- A: 青霉素
- B: 吡嗪酰胺
- C: 乙胺丁醇
- D: 链霉素

答案：C

9. (2020 年真题) 患者，女，26 岁。因心悸、手颤、易饥饿、烦躁易怒前来就诊，实验室检查游离甲状腺素 (FT3、FT4) 增高、促甲状腺素 (TSH) 降低，诊断为甲状腺功能亢进症。医师处方给予抗甲状腺药治疗。

- A: 丙硫氧嘧啶
- B: 碳酸锂
- C: 卡比马唑
- D: 甲巯咪唑

答案：D

10. 镇静催眠药佐匹克隆的禁忌证是 ()

- A: 低蛋白血症
- B: 重症肌无力
- C: 癫痫
- D: 糖尿病

答案：B

11. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染宜首选的抗菌药物是 ()。

- A: 头孢曲松

B: 利奈唑胺

C: 头孢他啶

D: 罗红霉素

答案: B

12. 某患者新诊断为退行性膝关节炎,既往有磺胺过敏史,不宜选用的非甾体抗炎药是 ()

A: 塞来昔布

B: 双氯芬酸

C: 吲哚美辛

D: 布洛芬

答案: A

13. 局部应用杀灭疥虫的药物中,疗效最佳的是 ()

A: 硫黄软膏

B: 苯甲酸苄酯

C: 林旦霜

D: 克罗米通

答案: C

14. 为预防大剂量环磷酰胺引起的膀胱毒性,在充分水化,利尿的同时,还应给予的药物是 ()

A: 美司钠

B: 螺内酯

C: 二甲双胍

D: 氯化钾

答案: A

15. 患者，女，46 岁。以"口角歪斜 3 天"之主诉入院。3 天前洗澡冲凉后次日晨起刷牙时发现右口角漏水，右侧闭眼不紧，口角歪斜，伴右眼流泪。查体：大致正常。诊断：面神经麻痹(右侧)。医嘱：

- A: 苯妥英钠
- B: 伊曲康唑
- C: 苯巴比妥
- D: 卡马西平

答案：B

16. 强心苷对以下哪种心功能不全疗效最好

- A: 严重贫血引起的心功能不全
- B: 甲状腺功能亢进引起的心功能不全
- C: 高度二尖瓣狭窄引起的心功能不全
- D: 伴有心房扑动、颤动的心功能不全

答案：D

17. 应用华法林时，为掌握好剂量，应测定

- A: 凝血时间
- B: 出血时间
- C: 部分凝血活酶时间
- D: 凝血酶原时间

答案：D

18. 袢利尿药发挥利尿的作用点是

- A: Na^+-Cl^- 共转运子
- B: 碳酸酐酶
- C: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子
- D: 磷酸二酯酶

答案：C

19. 多柔比星的异构体，适应证同多柔比星，疗效相等或略高，但对心脏毒性及脱发都明显低于多柔比星的药物是

- A: 吡柔比星
- B: 多柔比星
- C: 柔红霉素
- D: 表柔比星

答案：D

20. 抗菌谱广，对厌氧菌也有强大抗菌活性，对 β -内酰胺酶高度稳定的药物是()

- A: 他唑巴坦
- B: 克拉维酸
- C: 美罗培南
- D: 氨曲南

答案：C

21. 可用于治疗阴茎勃起功能障碍的药物是

- A: 炔诺酮
- B: 他达拉非
- C: 丙酸睾酮
- D: 米非司酮

答案：B

22. 作用于前列腺平滑肌，减轻膀胱出口梗阻的是()

- A: 哌达帕胺
- B: 普适泰

C: 西地那非

D: 坦洛新

答案: D

23. (2018 年真题) 同时具有短效和长效 (双时相) 作用的胰岛素/胰岛素类似物是 ()

A: 甘精胰岛素注射液

B: 精蛋白锌胰岛素注射液

C: 普通胰岛素注射液

D: 预混胰岛素注射液

答案: D

24. 育龄女性在无防护的性生活或避孕失败 72 小时内, 宜使用的口服紧急避孕药物是 ()

A: 左炔诺孕酮 (1

B: 十一酸睾酮 (40mg)

C: 复方醋酸环丙孕酮 (35 μ g/2mg)

D: 炔雌醇去氧孕烯 (30g/150g)

答案: A

25. 下列关于铁剂的叙述错误的是

A: 最容易吸收的铁剂为三价铁

B: 脂肪泻患者不建议使用

C: 口服铁剂主要在十二指肠和空肠上段吸收

D: 儿童缺铁可能影响其行为和学习能力

答案: A

26. 较常引起外周神经炎的抗癌药是

- A: 巯嘌呤
- B: 氟尿嘧啶
- C: 甲氨蝶呤
- D: 长春新碱

答案：D

27. 不易发生耐药株，是目前治疗原虫和厌氧菌的重要药物是

- A: 多黏菌素
- B: 克林霉素
- C: 呋喃妥因
- D: 甲硝唑

答案：D

28. 下列药物中属于抗纤维蛋白溶解药的是

- A: 酚磺乙胺
- B: 卡巴克络
- C: 维生素 K
- D: 氨甲环酸

答案：D

29. 不能用于曲霉菌感染的抗真菌药是()

- A: 伏立康唑
- B: 两性霉素 B
- C: 卡泊芬净
- D: 氟康唑

答案：D

30. 袢利尿药中，耳毒性最小，对听力有缺陷及急性肾衰竭者宜选用的药物是()

- A: 托拉塞米
- B: 布美他尼
- C: 依他尼酸
- D: 呋塞米

答案：B

31. 神经垂体功能不足引起的中枢性尿崩症具有良好抑制作用的药物是

- A: 促肾上腺皮质激素
- B: 催乳素
- C: 促性腺激素
- D: 醋酸去氨加压素

答案：D

32. 用于抢救肝素所致严重出血的药物是

- A: 亚叶酸钙
- B: 对羧基苄胺
- C: 硫酸鱼精蛋白
- D: 维生素 K

答案：C

33. 奥美拉唑属于

- A: 胃泌素受体拮抗药
- B: H₂ 受体拮抗药
- C: M 受体拮抗药
- D: H⁺, K⁺-ATP 酶抑制剂

答案：D

34. 患者，女，36 岁，近期经常上腹灼烧痛、反酸，疼痛多出现在上午 10 点及下午 4 点，有时夜间痛醒。食后缓解，X 线钡餐诊断为十二指肠溃疡，该患者宜使用的治疗药物是（）

- A: 颠茄
- B: 奥美拉唑
- C: 甲氧氯普胺
- D: 多潘立酮

答案：B

35. 易通过血脑屏障的抗真菌药物是

- A: 克霉唑
- B: 氟康唑
- C: 酮康唑
- D: 咪康唑

答案：B

36. 以上属于阿片类药物轻度戒断症状的是

- A: 惊厥、震颤、反射加速、发热
- B: 神经过敏、失眠、恶心、呕吐
- C: 哈欠、打喷嚏、流涕、出汗
- D: 胃痉挛、心动过速、极度疲乏

答案：C

37. 患者，女，49 岁，间断上腹部饱胀、恶心 1 年。患者 1 年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2 个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部 B 超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3 次/日。

- A: 不会导致 Q-T 间期延长及室性心律失常
- B: 不会导致锥体外系反应
- C: 不会促进乙酰胆碱的释放
- D: 不会导致催乳素增多

答案：C

38. 精神紧张、情绪恐惧所致的失眠

- A: 谷维素
- B: 夸西泮
- C: 氯美扎酮
- D: 氟西泮

答案：C

39. 铁剂用于治疗

- A: 溶血性贫血
- B: 巨幼红细胞性贫血
- C: 再生障碍性贫血
- D: 小细胞低血红蛋白性贫血

答案：D

40. 可用于中、重度细菌性感染，半衰期长，可以一日 1 次给药的是

- A: 美罗培南
- B: 西司他丁

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 厄他培南

D: 亚胺培南

答案：C

41. 华法林应用过量可选用的拮抗药是()

- A: 维生素 K
- B: 氨基己酸
- C: 鱼精蛋白
- D: 葡萄糖酸钙

答案: A

42. 竞争性抑制胃肠道的 α 葡萄糖苷酶活性,减慢肠道内多糖、寡糖或双糖的降解从而延缓单糖的吸收,可降低餐后血糖的药物是 ()

- A: 格列吡嗪
- B: 吡格列酮
- C: 二甲双胍
- D: 伏格列波糖

答案: D

43. 阿司匹林抗血栓形成的机制是

- A: 降低凝血酶活性
- B: 环氧酶失活,减少 TXA₂ 生成,产生抗血栓形成作用
- C: 直接对抗血小板聚集
- D: 激活抗凝血酶

答案: B

44. (2015 年真题) 属于 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂的是 ()。

- A: 吗氯贝胺
- B: 文拉法辛
- C: 阿米替林

D: 氟西汀

答案: B

45. 服用二甲双胍期间应注意()

A: 服药期间不可饮酒

B: 肝功能不全患者无需调整剂量

C: 初始治疗可大剂量给药

D: 无需控制饮食

答案: A

46. (2017 年真题) 导致视神经炎的抗结核药的是()

A: 利福平

B: 乙胺丁醇

C: 吡嗪酰胺

D: 利福喷丁

答案: B

47. 通过抑制碳酸酐酶发挥利尿作用的药物是

A: 氢氯噻嗪

B: 乙酰唑胺

C: 托拉塞米

D: 呋达帕胺

答案: B

48. 阿司匹林预防血栓形成的机制是

A: 抑制 PABA 的合成

B: 抑制 GABA 的合成

C: 促进 PG 的合成

D: 抑制 TXA2 的合成

答案：D

49. (2016 年真题) 鱼精蛋白可用于救治

A: 异烟肼中毒导致的神经毒性

B: 吗啡过量导致的呼吸抵制

C: 肝素过量导致的出血

D: 华法林过量导致的出血

答案：C

50. (2019 年真题) 体内代谢迅速，严重过量导致出血时，可用鱼精蛋白拮抗的药物是 ()

A: 阿司匹林

B: 氯吡格雷

C: 肝素

D: 依诺肝素

答案：C

51. 下列药物中属于缩瞳药的是

A: 毛果芸香碱

B: 硫酸阿托品

C: 托吡卡胺

D: 氢溴酸后马托品

答案：A

52. (2017 年真题) 可增强吗啡对平滑肌的松弛作用的药物是 ()

A: 阿托品

B: 苯甲酸钠咖啡因

C: 纳洛酮

D: 氟马西尼

答案: A

53. (2018 年真题) 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA) 高检出率的医疗机构, 进行人工瓣膜置换术时, 为预防 MRSA 感染, 可选用 ()

A: 万古霉素

B: 青霉素 G

C: 氨曲南

D: 头孢唑林

答案: A

54. (2021 年真题) 属于阳离子型表面活性剂, 可用于治疗咽喉炎的药物是 ()

A: 度米芬

B: 羟甲唑啉

C: 氯溴索

D: 西地碘

答案: A

55. 耳底、耳塞、耳内流黄水等症可选用

A: 9%硼酸冰片滴耳液

B: 1%碘甘油

C: 曲伏前列素

D: 四环素

答案: A

56. 阿昔洛韦的作用靶点是

- A: 神经氨酸酶
- B: HIV-1 反转录酶
- C: HIV-1 和 HIV-2 蛋白酶
- D: 脱氧核糖核酸聚合酶

答案：D

57. 下列选项中，主要用于控制疟疾复发和传播的药物是()。

- A: 青蒿素
- B: 奎宁
- C: 氯喹
- D: 伯氨喹

答案：D

58. 患者，男，43 岁，诊断为感染性心内膜炎，血液细菌培养为草绿色链球菌，拟用青霉素 G 和下列其中一药合用，应合用的药物是

- A: 阿莫西林
- B: 红霉素
- C: 奈替米星
- D: 庆大霉素

答案：D

59. 决定皮肤外用药物临床疗效的关键因素是

- A: 药物浓度
- B: 皮肤温度
- C: 剂型
- D: 经皮吸收

答案：D

60. 可用于恶性淋巴瘤的药物是

- A: 阿糖胞苷
- B: 氟尿嘧啶
- C: 利妥昔单抗
- D: 甲氨蝶呤

答案：A

61. 静脉注射可以治疗单纯疱疹病毒脑炎，局部可以用于疱疹病毒性角膜炎的药物是

- A: 阿糖腺苷
- B: 阿昔洛韦
- C: 奥司他韦
- D: 干扰素

答案：A

62. 具有中枢和外周抗多巴胺双重作用的是

- A: 西沙必利
- B: 莫沙必利
- C: 多潘立酮
- D: 甲氧氯普胺

答案：D

63. 长期大量应用可致视神经炎、视力下降、视野缩小，出现盲点的是

- A: 乙胺丁醇
- B: 链霉素
- C: 异烟肼
- D: 利福平

答案：A

64. 需停 5 周才能换用单胺氧化酶抑制剂的药物是

- A: 文拉法辛
- B: 吡拉西坦
- C: 氟西汀
- D: 吗氯贝胺

答案：C

65. 下述不能用于治疗痤疮的药物是

- A: 克霉唑
- B: 壬二酸
- C: 过氧苯甲酰
- D: 阿达帕林

答案：A

66. 卡托普利的主要降压机制是

- A: 抑制醛固酮的释放
- B: 抑制血管紧张素转化酶
- C: 促进前列腺素 I₂ 的合成
- D: 抑制缓激肽的水解

答案：B

67. (2018 年真题) 配制静脉输液时, 应选择氯化钠注射液或乳酸钠林格注射液稀释, 不得使用葡萄糖注射液稀释的抗真菌药是 ()

- A: 卡泊芬净
- B: 两性霉素 B
- C: 氟康唑
- D: 伏立康唑

答案：A

68. (2018 年真题) 属于 β_2 受体激动剂的平喘药是 ()

- A: 孟鲁司特
- B: 沙美特罗
- C: 噻托溴铵
- D: 茶碱

答案：B

69. 噻嗪类利尿药发挥抗利尿作用，是因为其可以抑制

- A: 磷酸二酯酶
- B: $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ 同向转运子
- C: 碳酸酐酶
- D: Na^+-Cl^- 共转运子

答案：A

70. 可预防环磷酰胺所致泌尿系毒性的药物是

- A: 呋塞米
- B: 糖皮质激素
- C: 维生素
- D: 美司钠

答案：D

71. (2020 年真题) 主要用于治疗呼吸道合胞病毒感染的药物是

- A: 阿德福韦酯
- B: 更昔洛韦
- C: 拉米夫定
- D: 利巴韦林

答案：D

72. 用于低分子肝素过量时解救的药品是

- A: 氨甲环酸
- B: 鱼精蛋白
- C: 维生素 K1
- D: 酚磺乙胺

答案：B

73. 12%复方氨基酸注射液（18AA）的静脉滴速为

- A: 滴速 20~30 滴 / 分
- B: 不超过 40 滴 / 分
- C: 不超过 15 滴 / 分
- D: 滴速 80~100 滴 / 分

答案：A

74. （2020 年真题）服药期间须大量饮水，防止发生结晶尿的药物是

- A: 头孢呋辛
- B: 克林霉素
- C: 磺胺甲噁唑
- D: 左氧氟沙星

答案：C

75. （2017 年真题）可能引起高铁血红蛋白血症的抗高血压药是（）

- A: 氨氯地平
- B: 阿利克仑(阿利吉仑)
- C: 硝普钠
- D: 卡托普利

答案：C

76. 偶发失眠和暂时失眠可使用

- A: 苯巴比妥
- B: 卡马西平
- C: 唑吡坦
- D: 地西泮

答案：C

77. (2016 年真题) 抗病毒药阿昔洛韦在静脉滴注时滴速必须缓慢，否则可能引起的不良反应 ()

- A: 胰腺坏死
- B: 急性肝衰竭
- C: 肺部纹理加重
- D: 急性肾衰竭

答案：D

78. 利福平联用伏立康唑使

- A: 肝毒性增加
- B: 吸收减少
- C: 月经不规则
- D: 疗效减弱

答案：D

79. (2017 年真题) 影响疟原虫叶酸代谢过程的抗疟药是 ()

- A: 乙胺嘧啶
- B: 青蒿素
- C: 奎宁

D: 伯氨喹

答案：A

80. 主要用于解热镇痛，但几乎没有抗炎作用的药物是

A: 吲哚美辛

B: 对乙酰氨基酚

C: 阿司匹林

D: 塞来昔布

答案：B

81. 可导致坏死性结肠炎的是

A: β 受体阻断剂

B: 利福平

C: 甲氨蝶呤

D: 阿糖胞苷

答案：D

82. 镇痛药的合理用药原则, 不包括()

A: 按阶梯给药对于轻度疼痛者首选弱阿片类药物

B: “按时”给药, 而不是“按需”给药

C: 用药剂量个体化, 根据患者需要由小剂量开始逐渐加大剂量

D: 尽可能选口服给药

答案：A

83. 主要经肝脏代谢，受肾功能影响小，可用于肾功能不全患者的强心苷是

A: 去乙酰毛花苷（西地兰 D）

B: 毛花苷丙（西地兰 C）

C: 地高辛

D: 洋地黄毒苷

答案: D

84. 给药后易产生抗体，5 天至 1 年内重复给药疗效可能下降，1 年内不宜再次使用的溶栓药是

A: 阿替普酶

B: 瑞替普酶

C: 尿激酶

D: 链激酶

答案: D

85. 原发性纤维蛋白溶解亢进所致的各种出血可选用

A: 维生素 K

B: 氨甲环酸

C: 尿激酶

D: 低分子肝素

答案: B

86. 口服呋喃妥因可用于治疗()

A: 肺感染

B: 尿路感染

C: 呼吸道感染

D: 肠道感染

答案: B

87. 通过将身体的水分吸到肠道或防止大便中的水分被吸收来增加肠道中的水分来发挥致泻作用的是

专业《执业药师之西药学专业二》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/958066052042007022>