专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年广西壮族自治区银海区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试内部题库带答案（巩固）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.应贮存在凉暗处的药物是

A：头孢拉定

B：重组人促红细胞生成素

C：托烷司琼注射剂

D：硫酸亚铁片

答案：C

2.长期应用苯二氮（艹卓）类药物不能突然停止使用，因其存在

A：毒性反应?

B：戒断症状?

C：首剂效应?

D：后遗效应?

答案：B

3.是否增加房颤患者死亡率尚无定论，可谨慎地用于房颤的心室率控制的是()

A：普罗帕酮

B：美托洛尔

C：地尔硫

D：地高辛

答案：D

4.患者，女，27岁，2年前开始出现多汗、多食，近期因消瘦、心悸就诊。查体：甲状腺肿大，根据血T3、T4及TSH检查结果，诊断为甲亢。目前该患者正处于哺乳期。

A: 皮疹

B: 粒细胞减少

C: 肝功能损害

D: 头痛

答案：B

5.（2015年真题）患儿，女，4岁半，身高110cm，体重15kg，一天前开始发热（39.1℃），咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热20h左右出现腹泻，约2～3h一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐1次。体格检查，T38.8℃，P118次/分，R28次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC18.5×109/L（参考值4.0×109～10.0×109），粪便镜检可见红、白细胞。

A: 药用炭

B: 洛哌丁胺

C: 鞣酸蛋白

D: 小檗碱

答案：B

6.对急性心肌梗死引起的室性心律失常首选

A: 利多卡因

B: 硝酸酯类

C: 地高辛

D: 普萘洛尔

答案：A

7.（2018年真题）患者,男,69岁,因高血压长期服用抗高血压药,近日患者出现足踝部水肿引起此不良反应的药物是（）

A: 非洛地平

B: 多沙唑嗪

C: 普萘洛尔

D: 卡托普利

答案：A

8.茶碱、咖啡因、可卡因等容易引起癫痫发作，属于

A: 药源性血损害

B: 药源性肾损害

C: 药源性神经损害

D: 药源性肝损害

答案：C

9.不可震荡的是

A: 重组人促红素

B: 甘露醇注射剂

C: 降钙鼻喷雾剂

D: 乙醚

答案：A

10.膀胱炎占尿路感染的60%以上，致病菌多为

A: 白假丝酵母菌

B: 大肠埃希菌

C: 金黄色葡萄球菌

D: 淋病奈瑟菌

答案：B

11.哺乳期妇女应用下列药物会对乳婴产生何种不良影响,过量维生素D

A: 可引起过期妊娠、产程过长和产后出血

B: 导致新生儿血钙过高

C: 可能引起乳婴视神经损害、智力障碍

D: 可能致胎儿畸形

答案：B

12.下列哪项不是尿路感染的易感因素

A: 细菌感染

B: 尿路梗阻

C: 过度憋尿

D: 不洁性活动

答案：A

13.脑出血急性期体位应注意的是（）

A: 俯卧位

B: 仰卧位

C: 侧卧位

D: 抬高床头15-30°

答案：D

14.妥布霉素可导致

A: 肾小球滤过率下降

B: 前列腺素合成障碍

C: 结晶沉积

D: 不可逆性肾小管坏死

答案：A

15.治疗过敏性结膜炎可选用的药物是()

A: 羟甲基纤维素钠滴眼液

B: 色甘酸钠滴眼液

C: 氧氟沙星滴眼液

D: 酞丁安滴眼液

答案：B

16.临终关怀是对于预期寿命少于几个月的慢性病终末期患者的一项特殊疗护项目

A: 6

B: 5

C: 12

D: 10

答案：A

17.心血管疾病患者感冒时退热建议选用的药物是

A: 对乙酰氨基酚

B: 布洛芬

C: 金刚烷胺

D: 奥司他韦

答案：A

18.可出现痤疮样皮疹的是（）

A: 博来霉素

B: 阿霉素

C: 氟尿嘧啶

D: 吉非替尼

答案：D

19.患者，女，35岁，临床诊断为高甘油三酯血症，用非诺贝特微粒型胶囊调节血脂治疗，下列给药正确的用法与用量为

A: 0.5gtid

B: 0.5gqd

C: 0.1gtid

D: 0.2gqd

答案：D

20.可出现认知功能受损、谵妄、跌倒的是

A: 双嘧达莫

B: 哌替啶

C: 苯二氮

D: 甲氧氯普胺

答案：C

21.拮抗作用的配伍用药是

A: 纳洛酮用于解救吗啡中毒

B: 阿托品联用吗啡镇痛

C: 应用地高辛与氢氯噻嗪

D: 青蒿素与乙胺嘧啶或磺胺多辛联用延缓抗药性

答案：A

22.患者，男,69岁，BMI27．8kg/mr,既往有骨性关节炎病史。近期爬山后，再次出现膝关节疼痛，患者热敷后疼痛未缓解，前来咨询如何选用“止痛药"。

A：对因治疗

B：对症治疗

C：缓和治疗

D：姑息治疗

答案：B

23.在与患者进行沟通的过程中，切忌的事项是

A：可提供一些宣传资料

B：认真聆听

C：尽量提供更多的信息

D：尽量避免使用专业术语

答案：C

24.患者，男，35岁。于午饭后即开始出现胃部疼痛，胀满食少，后感觉脐周硬结、闷痛、拒按，于1日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因蛋白质进食过多而导致的继发性消化不良。

A：小檗碱

B：双八面体蒙脱石散

C：胰酶

D：碳酸氢钠

答案：C

25.第二代抗组胺药氯雷他定治疗过敏性鼻炎的用法、用量是

A：一次4mg，每日3次

B：一次4mg，每日1次

C: 一次10mg，每日1次

D: 一次2mg，每日3次

答案：C

26.脂肪或酪蛋白消化不良（儿童）可呈现

A: 乳凝块便

B: 柏油黑便

C: 鲜血便

D: 白陶土便

答案：A

27.肾素抑制剂

A: 阿利吉仑

B: 阿米洛利

C: 雷米普利

D: 依普利酮

答案：A

28.Ⅰ类手术切口应用第三代头孢菌素

A: 无适应证用药

B: 过度治疗用药

C: 盲目联合用药

D: 超适应证用药

答案：A

29.男性，35岁，髋关节置换术后7天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

A: 华法林

B: 肝素

C: 氯吡格雷

D: 利伐沙班

答案：C

30.男性，72岁。高血压病3年，血压165/95mmHg，伴Ⅱ型糖尿病。首选降压药物是

A: 利尿剂

B: β-受体阻滞剂

C: 心痛定

D: ACEI类

答案：D

31.在药物信息服务中，三级信息资料最突出的优势是

A: 提供的信息丰富、详实

B: 内容全面、细致

C: 能看到研究细节如实验设计方法、数据统计分析等

D: 内容广泛、使用方便

答案：D

32.（2018年真题）患者,女,30岁,因感冒所致发热（体温38.5℃）并伴有头痛、全身酸痛到药店购药,药师应推荐的药品是（）

A: 氯苯那敏片

B: 酚麻美敏片

C: 对乙酰氨基酚片

D: 萘甲唑啉滴鼻液

答案：C

33.在导致药源性胃肠道疾病的药品中，引起局部缺血性结肠炎、重者可致死亡等风险的药品是

A: 呋塞米

B: 阿米替林

C: 阿洛司琼

D: 利血平

答案：C

34.老年人应该避免使用与疾病状态相关的潜在不适当用药。以下用于判断老年患者潜在不适当用药的依据是

A: 数字评分法

B: Beers 标准

C: CTP 评分标准

D: Bayesian 反馈法

答案：B

35.能够给予当即解答的就当即解答

A: 解释的技巧

B: 及时回答不拖延

C: 保护患者的隐私

D: 特别关注特殊人群

答案：B

36.肾脏功能主要是分泌和排泄尿液、废物、毒物和药物，调节和维持体液容量和成分，维持机体内环境（血压、内分泌）的平衡。变态反应、感染、肾血管病变、代谢异常、先天性疾病、全身循环和代谢性疾病、药物、毒素对肾脏的损害，均可影响肾功能。

A: 18～62μmol/L

B: 45～84μmol/L

C: 53～97μmol/L

D: 18～35μmol/L

答案：D

37.可引起排尿困难，尿潴留患者禁用的药物是

A: 法莫替丁

B: 阿米替林

C: 加兰他敏

D: 奥美拉唑

答案：B

38.下列药源性疾病中，其诱因主要是"性别因素"的是

A: 羟化酶缺乏者服用一半剂量的苯妥英钠呈现引起神经毒性

B: 灰婴综合征是氯霉素在新生儿体内蓄积所致

C: 老年人应用普萘洛尔可诱发头痛、眩晕、低血压等不良反应

D: 口服避孕药致阿米替林清除率下降

答案：D

39.一般高血压患者服用降压药，建议控制在

A: <120/80mmHg

B: <130/80mmHg

C: <140/90mmHg

D: <140/80mmHg

答案：C

40.患者,男,82岁,诊断为帕金森病,给予左旋多巴联合卡比多巴治疗,产生的药物相互作用属于()

A: 降低抗药性,疗效增加

B: 敏感化作用,药品不良反应增加

C: 拮抗作用,药品不良反应增加

D: 增加靶器官药物浓度,药品不良反应减少

答案：D

41.服用左旋多巴不宜同食

A: 食醋

B: 高蛋白食物

C: 咖啡

D: 葡萄柚汁

答案：B

42.相互作用延缓或降低抗药性的联合用药是

A: 阿托品联用普萘洛尔

B: 青蒿素联用乙胺嘧啶

C: 普萘洛尔联用硝苯地平

D: 阿托品联用氯磷定

答案：B

43.患者，女性，25岁，因面色苍白、头晕、乏力1年余，加重伴心悸1个月来诊。经诊断为缺铁性贫血。

A: 餐前

B: 两餐间

C: 餐后

D: 睡前

答案：C

44.能刺激骨骼、肌肉和组织生长发育的是

A：肽类激素

B：麻醉药品

C：蛋白同化激素

D：利尿剂

答案：A

45.患者，男，65岁，良性前列腺增生病史3年，高血压病史2年，咳嗽，咳痰10余年，伴哮喘，尤以活动后明显，因近半月咳嗽加重入院，主诉便秘，每周2次排便，长期口服硝苯地平控释片30mg/qd，血压控制良好。体格检查：体温36.6℃，P82次/分，R22次/分，端坐位，喘息貌，桶状胸，双肺叩诊过清音，散在干啰音，双肺下少许湿罗音，辅助检查：血常规WBC11.2×10

A：布地奈德混悬液

B：氨溴索注射液

C：异丙托溴铵溶液

D：硝苯地平控释片

答案：C

46.患者，男，35岁。于午饭后即开始出现胃部疼痛，胀满食少，后感觉脐周硬结、闷痛、拒按，于1日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因蛋白质进食过多而导致的继发性消化不良。

A：助消化药与吸附剂合用须间隔2~3h

B：胰酶口服时应嚼碎服用

C：复方消化酶制剂送服时不宜用热水

D：多潘立酮可能引起心脏相关风险

答案：B

47.血糖正常、尿葡萄糖阳性可以提示患者可能

A：伴活动性指端肥大症

B：伴甲状腺功能亢进

C：伴肾性肾小球肾炎

D：伴心肌梗死

答案：C

48.利巴韦林的通用名是

A：病毒唑

B：阿霉素

C：无环鸟苷片

D：克毒星

答案：A

49.毒物引起严重腹泻者

A：禁止洗胃

B：不能用强利尿剂

C：不能催吐

D：不能导泻

答案：D

50.二级信息源的优点叙述，最正确的是

A：可提供丰富的信息

B：有的还能提供疾病与药物治疗的基本知识

C：对一个具体问题提供的信息全面、详实

D：读者能自己评价信息，免受他人观点影响

答案：A

51.牙痛等轻度疼痛宜选用的药物是

A：可待因

B：阿司匹林

C：吗啡

D：多奈哌齐

答案：B

52.处方中外文缩写mcg代表（）

A：餐后

B：必要时

C：临睡时

D：微克

答案：D

53.一位巨幼细胞性贫血患儿肌内注射维生素B

A：0.25～0.40ml

B：0.049～0.20ml

C：0.15～0.30ml

D：0.05～0.10ml

答案：D

54.促进机体的利用的是

A：磷霉素联用其他抗菌药物

B：亚胺培南-西司他汀复方制剂

C：维生素C与铁剂同服

D：普萘洛尔联用硝苯地平降血压

答案：C

55.溃疡或胃酸过多的人不宜饮用

A：吸烟

B：高盐饮食

C：饮茶

D：咖啡

答案：D

56.可引起泌尿生殖系统异常，指趾畸形的是

A：雌孕激素

B：沙立度胺

C：甲巯咪唑

D：氮芥类

答案：D

57.若空腹服药，则胃排空较快，药物在短时间内可进入十二指肠与小肠。餐后服用可延缓胃排空，使药物在胃中较充分地吸收，且能够减少或避免药物对胃黏膜的刺激。因此，许多药品适宜餐后服用。

A：餐后服用

B：餐中服用

C：清晨服用

D：餐前服用

答案：A

58.一般情况下，每张处方中开具的西药和中成药的总数目最多为

A：4种

B：2种

C：3种

D：5种

答案：D

59.（2015 年真题）消化不良患者宜选用（）。

A：阿苯达唑

B：小檗碱

C：乳果糖

D：干酵母

答案：D

60.可以引起视物模糊、红绿色视野受限的药物是()

A：异烟肼

B：对氨基水杨酸钠

C：乙胺丁醇

D：链霉素

答案：C

61.重度贫血，Hb 为（）

A：90~120g/L

B：小于 60g/L

C：60~90g/L

D：60~120g/L

答案：B

62.“调查显示，应用过庆大霉素治疗的霍乱患者肾衰竭的发病率是未用患者的 5 倍”提示诊断药源性疾病应该进行

A：排除药物以外的因素

B：询问用药过敏史和家族史

C：流行病学的调查

D: 致病药物的确定

答案：C

63.关于嗜酸性粒细胞叙述正确的是

A: 嗜酸性粒细胞无吞噬功能

B: 嗜酸性粒细胞可释放组胺酶

C: 嗜酸性粒细胞不能吞噬抗原-抗体复合物

D: 支气管哮喘患者的嗜酸性粒细胞减少

答案：B

64.（2016年真题）对于有睡眠障碍的抑郁症患者，适宜选用的抗抑郁药是（）。

A: 米氮平

B: 地西泮

C: 雷美尔通

D: 佐匹克隆

答案：A

65.属于选择性5-羟色胺再摄取抑制剂的是

A: 阿米替林

B: 吗氯贝胺

C: 氟西汀

D: 文拉法辛

答案：C

66.（2019年真题）患者，男，34岁，因糖尿病酮症酸中毒入院需静脉给予胰岛素或胰岛素类似物，应选用的药物是

A: 普通胰岛素

B: 低精蛋白锌胰岛素

C: 精蛋白锌胰岛素

D: 门冬胰岛素

答案：A

67.患者，男，68岁，既往体健，因“受凉后咳嗽、咳黄脓痰，伴发热2天”入院。查体：体温39．1℃，血压138／80mmHg，心率102次／分，呼吸32次／分，左肺可闻及湿性哕音。化验结果：白细胞计数11．2×109／L，中性粒细胞百分比85%。胸部x线：左肺下叶渗出性阴影。痰培养结果待归。入院诊断：社区获得性肺炎。

A: 肺炎链球菌

B: 支原体

C: 衣原体

D: 铜绿假单胞菌

答案：D

68.与蛇胆川贝液不宜联用的药物是

A: 阿托品

B: 可待因

C: 氢氧化铝

D: 苯巴比妥

答案：B

69.误服药物、服药过量以及滥用药物均可引起药物中毒。常见的致中毒药物包括西药、中药和农药。随着化学制药工业的不断发展，如果管理和解救措施跟不上，药物中毒的危害即将越来越严重。

A: 新斯的明

B: 纳洛酮

C：毒扁豆碱

D：毛果芸香碱

答案：D

70.下述“药物治疗慢性阻塞性肺疾病的目的”中，不正确的是

A：预防疾病进展

B：排痰化痰

C：减少病死率

D：缓解呼吸道症状

答案：B

71.需要在凉暗处贮存的药品是

A：头孢曲松钠

B：硝酸甘油

C：复方甘草合剂

D：阿卡波糖片

答案：C

72.右心衰竭最常见的症状是

A：腹胀、食欲不振、恶心、呕吐

B：端坐呼吸

C：夜间阵发性呼吸困难

D：劳力性呼吸困难

答案：A

73.下列药物信息源中，归属一级文献资料的是

A：中国药学文摘

B：新编药物学

C：中国药学年鉴

D：中国药学杂志

答案：D

74.用于前列腺增生症的高选择性 α1A 受体阻断剂是（）

A：坦索罗辛

B：索利那新

C：托特罗定

D：特拉唑嗪

答案：A

75.服用维生素 B1、维生素 B2、烟酸等应该禁用的饮食是

A：食盐

B：脂肪

C：食醋

D：酒

答案：D

76.血清天门冬氨酸氨基转移酶(AST)的正常值参考范围是

A：<40U/L

B：速率法：<40U/L

C：速率法：成人<40U/L

D：成人<60U/L

答案：C

77.饮酒过多可致死亡，所以乙醇浓度危及生命最低限是

A：0.15%～0.2%

B：0.2%～0.25%

C：0.35%～0.4%

D：0.25%～0.3%

答案：C

78.有机酸排出减少

A：肾小球滤过减少

B：肾血流量减少

C：肾小管重吸收增加

D：肾小管分泌减少

答案：D

79.根据体重计算婴幼儿的剂量时注

A：可适当调整

B：选用剂量的上限

C：应减少用量

D：不可调整

答案：B

80.属于苯二氮革类药物的是

A：艾司唑仑

B：阿米替林

C：舍曲林

D：丁螺环酮

答案：A

81.与阿米卡星合用会影响其排泄导致急性肾损害的药物是()

A：阿司匹林

B：铝碳酸镁

C: 伏立康唑

D: 维生素 B

答案：A

82.一般由葡萄糖与脂肪提供机体 NPC 的比例是

A: NPC7：3

B: 100kcal：1gN

C: NPC5：5

D: 150kcal：1gN

答案：A

83.影响核酸合成的药物

A: 培美曲塞

B: 依托泊苷

C: 顺铂

D: 放线菌

答案：A

84.Ⅳ级临床研究的结论或Ⅱ、Ⅲ级临床研究的推论属于循证医学证据推荐强度的

A: C 级

B: E 级

C: D 级

D: B 级

答案：A

85.舒肝丸与甲氧氯普胺合用

A: 合用后抑制后者吸收，降低疗效

B：合用后增加毒性，出现药物中毒

C：两者合用作用相反，互相降低药效

D：合用抑制呼吸，易致呼吸衰竭

答案：C

86.新生儿血红蛋白(Hb)正常参考区间是

A：(15.0～20.0)X109／L

B：170～200g／L

C：180～220g／L

D：(5.0～12.0)X109／L

答案：B

87.肝功能不全者服用由肝脏清除，但并无明显毒性反应的药物时

A：必须减量应用

B：避免使用

C：一般无需调整剂量

D：须谨慎使用，必要时减量给药

答案：D

88.患者，女，42岁。左足背部出现严重冻疮，可考虑应用

A：紫云膏

B：肝素钠乳膏

C：樟脑软膏

D：赛庚啶

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/958073002045007022