

畜牧养殖工：家禽饲养工

姓名：_____ 年级：_____ 学号：_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题：在饲料里加入粗砂或碎石不是为了（ ）。
A、补钙
B、帮助消化
C、节约饲料
- 单项选择题：一般种鹅在开产前 30 天，要在自然光照的基础上每周增加半小时的光照，逐渐延长至每昼夜光照（ ）h，并将这一光照时数保持到产蛋期结束。
A、10
B、15
C、20
- 单项选择题：种蛋蛋壳过厚是由于饲料中钙的含量（ ）。
A、较多
B、合适
C、较少
- 填空题：根据皮亚杰的认知发展理论，认知发展过程分为_____、_____、_____、_____、4 个阶段。
- 单项选择题：适合鹅蛋恒温孵化的温度（ ）℃左右。
A、35.5
B、37.8
C、40.5
D、41
- 判断题：鸡马立克氏病是由疱疹病毒引起的一种肿瘤传染病。
- 单项选择题：豆粕属于（ ）饲料。
A、能量
B、矿物质
C、维生素
D、蛋白质
- 单项选择题：鹅传染病发生和发展的基本环节（ ）。
A、传染源、传播途径、易感鹅群
B、健康鹅、传播途径、易感鹅群

C、传染源、健康鹅、易感鹅群

- 9、单项选择题：中鹅养至主翼羽长出后即饲养（ ）天左右，如不做种则转入育肥期。
- A、15
 - B、45
 - C、65
 - D、80
- 10、单项选择题：高致病性禽流感发生后疫区内疫点以外的区域每（ ）天消毒一次。
- A、5
 - B、4
 - C、2
- 11、单项选择题：蛋鸡产蛋最长时期是（ ）。
- A、终产期
 - B、始产期
 - C、主产期
- 12、单项选择题：适合初生雏鸡的环境温度是（ ）。
- A、25—30℃
 - B、33—35℃
 - C、20—25℃
- 13、单项选择题：鸡的受精卵的孵化期平均为（ ）天。
- A、21天
 - B、17天
 - C、19天
 - D、30天
- 14、单项选择题：鸡痘接种的适宜途经是（ ）。
- A、皮下刺种
 - B、皮下注射
 - C、肌肉注射
- 15、单项选择题：豆粕饲料的特点是（ ）。
- A、维生素多
 - B、蛋白质多
 - C、能量高
- 16、单项选择题：维生素E缺乏导致的主要症状（ ）。
- A、脑软化症，运动障碍，共济失调
 - B、鹅步态平稳、体健
 - C、生长迅速
- 17、判断题：滨白鸡的特点是产蛋多，商品代雏鸡可以根据羽速鉴别公母，快羽型为公鸡，慢羽型的为母鸡。
- 18、单项选择题：种蛋孵化过程中要进行照蛋，通常头照的时间是（ ）天左右。
- A、3天
 - B、7天
 - C、9天
 - D、12天

19、单项选择题：新引进的鹅需要隔离（ ）天才能混群。

- A、7—10
B、10—15
C、15—20
- 20、单项选择题：雏鹅免疫注射时一般采用（ ）。
A、静脉注射
B、颈部皮下注射
C、腹腔注射
- 21、单项选择题：下列那中疾病对雏鹅危害最大（ ）。
A、小鹅瘟
B、大肠杆菌病
C、沙门氏菌病
D、巴氏杆菌病
- 22、单项选择题：以放牧为主饲养的鹅（ ）。
A、长的快
B、体型小
C、体型大，但重量轻
- 23、单项选择题：（ ）时，雏鹅远离热源，张口喘气，行动不安，饮水频繁，食欲下降。
A、温度适宜
B、温度过低
C、温度过高
D、湿度过大
- 24、单项选择题：鸡产蛋阶段调整光照主要使用的方法（ ）。
A、改变照明时间
B、调整光照强度
C、调整光线颜色
- 25、单项选择题：雏鹅生长过快会出现软腿、O型腿等症状，由于是缺钙我们一般在饲料中加入（ ）。
A、蛋白质
B、锌
C、维生素D和钙
- 26、单项选择题：饲养商品鹅时一般采用（ ）的饲养方式。
A、同一鹅舍可养几批鹅
B、同一鹅舍可养不同孵化场的鹅
C、全进全出
- 27、单项选择题：种蛋蛋壳过薄是由于饲料中钙的含量（ ）。
A、较多
B、合适
C、较少
- 28、单项选择题：鹅蛋的蛋白质及人体所需要的（ ）种必需氨基酸的含量都比鸡蛋和鸭蛋高。
A、2种
B、3种
C、8种

- D、15种
- 29、单项选择题：垫料或饲料污染霉变、导致雏鹅（ ）病。
- A、佝偻病
 - B、曲霉菌
 - C、异食癖
- 30、单项选择题：夏季，高温季节要防止鹅（ ）。
- A、大肠杆菌病
 - B、中暑
 - C、感冒
- 31、单项选择题：饮水免疫适用于大群鸡的免疫。疫苗须用凉开水稀释，水的用量根据实际饮水量决定。整个饮水时间不超过（ ）。
- A、1小时
 - B、3小时
 - C、5小时
 - D、8小时
- 32、单项选择题：下列消毒方法适用于带禽消毒的有（ ）。
- A、烧碱喷雾
 - B、甲醛、高锰酸钾熏蒸
 - C、来苏儿喷雾
- 33、问答题：如何挑选雏鸡？
- 34、单项选择题：饲养鹅（ ），易导致舍内空气恶臭，生长发育慢，出现啄羽现象
- A、密度过大
 - B、空气干燥
 - C、密度过小
- 35、单项选择题：肉种鸡产蛋前期的饲养应注意（ ）。
- A、尽力满足营养需要
 - B、严格限制饲养
 - C、满足蛋白的营养
- 36、单项选择题：下列消毒方法适用于带禽消毒的有（ ）。
- A、烧碱喷雾
 - B、甲醛、高锰酸钾熏蒸
 - C、来苏儿喷雾
- 37、单项选择题：种蛋保存相对湿度应保持（ ）左右，过高容易长霉菌。
- A、30%
 - B、45%
 - C、75%
 - D、85%
- 38、单项选择题：鹅群发生鹅副黏病毒等疫病时，应对鹅群实施清群和净化措施；全场进行彻底的清洗消毒，病死或淘汰鹅的尸体进行（ ）。
- A、高温处理后上市
 - B、无害化处理
 - C、随意丢弃

39、单项选择题：可用于鹅驱虫的药物是（ ）。

- A、庆大霉素
B、吡喹酮
C、青霉素
- 40、单项选择题：鹅为水禽，当体内损失（ ）水分会发生死亡现象。
A、2%
B、5%
C、10%
D、20%
- 41、单项选择题：可用于鹅驱虫的药物是（ ）。
A、庆大霉素
B、吡喹酮
C、青霉素
- 42、单项选择题：由于营养、环境等条件因素导致产蛋曲线下滑，恢复后产蛋率将会（ ）。
A、停产
B、不能得到补偿
C、高于下降前的水平
- 43、问答题：家禽饲喂颗粒料有什么利弊？
- 44、单项选择题：育成鸡控制光照的基本原则是（ ）。
A、易短不易长
B、保持育雏开始时光照
C、延长光照
- 45、单项选择题：肉用仔鸡应当尽量使用（ ）。
A、全价颗粒饲料
B、全价粉饲料
C、全价湿拌饲料
- 46、单项选择题：蛋用鸡限制饲喂应在（ ）停止。
A、开始出现第二性征
B、育成期的14周
C、育成期的16周
- 47、单项选择题：狮头鹅体型大，成年公鹅的平均体重（ ）千克左右。
A、4.5 千克
B、5 千克
C、8.8 千克
D、15 千克
- 48、单项选择题：狮头鹅体型大，成年公鹅的平均体重（ ）千克左右。
A、4.5 千克
B、5 千克
C、8.8 千克
D、15 千克
- 49、单项选择题：雏鹅饲养（ ），则生长发育缓慢，并出现相互啄毛、啄肛、啄趾等现象。
A、密度过大，湿度高，鹅群拥挤
B、密度过小，鹅群松散

- C、密度适中，鹅群合适
D、密度适中，温度干燥
- 50、单项选择题：生长鸡的适应钙磷比（ ）。
A、1.2: 1
B、1: 2
C、1: 3
- 51、单项选择题：从饲养的角度出发防止鸡啄癖的措施是（ ）。
A、提高饲料中的能量、蛋白质水平
B、饲料营养充足、平衡
C、增加饲料钙、磷含量
- 52、单项选择题：放牧的鹅（ ）天羽毛可以长整齐。
A、60-70
B、70-80
C、80-90
- 53、单项选择题：鹅场的建筑不包括（ ）。
A、育雏室
B、圈舍
C、水面运动场
- 54、单项选择题：开放式圈舍常用的消毒方法有（ ）。
A、煮沸消毒
B、喷雾消毒
C、熏蒸消毒
- 55、单项选择题：全进全出的饲养体制目的是（ ）。
A、全场有统一时间严格消毒阻断疫病
B、集中财力物力降低成本
C、全场同周龄易于管理
- 56、填空题：蛋用种鸭一般在（ ）或（ ）进行选择。
- 57、单项选择题：我国著名的鸡种是（ ）。
A、来航鸡
B、狼山鸡
C、罗斯鸡
- 58、单项选择题：家禽的消化道能够消化粗纤维的部位（ ）。
A、嗉囊
B、腺胃
C、盲肠
- 59、单项选择题：雏鹅生长速度快，21日龄的体重为出生重的（ ）倍左右。
A、2倍
B、10倍
C、15倍
D、20倍
- 60、单项选择题：下列哪种鹅年产蛋量最多（ ）。
A、四川白鹅

- B、莱茵鹅
C、伊犁鹅
- 61、单项选择题：中鹅又称育成鹅或青年鹅，一般指（ ）以上至育肥期前的鹅。
A、1 周龄
B、1 月龄
C、2 月龄
D、3 月龄
- 62、单项选择题：雏鸡第一周末比出壳时体重增长（ ）。
A、增长 2.5 倍
B、增长 1 倍
C、增长 3 倍
- 63、单项选择题：鹅育雏期的温度，育雏结束时育雏室育雏期的温度，应保持（ ）。
A、自然温度
B、 26°C - 27°C
C、 30°C - 32°C
- 64、单项选择题：我国家鹅品种中（ ）起源于灰雁。
A、伊犁鹅
B、太湖鹅
C、四川白鹅
D、皖西白鹅
- 65、单项选择题：鹅是耐粗饲的家禽，对粗纤维的利用率达（ ）左右。
A、60%
B、45%
C、30%
D、20%
- 66、单项选择题：提高蛋鸡场的经营利润主要靠（ ）。
A、降低饲料费
B、提高饲料转化率
C、降低工资费、管理费、水电费
- 67、单项选择题：下列属于病毒性疾病有（ ）。
A、曲霉病
B、霍乱
C、小鹅瘟
- 68、问答题：简述孵化操作技术。
- 69、单项选择题：四川白鹅的成年公鹅的平均体重（ ）千克左右。
A、5 千克
B、4.5 千克
C、3 千克
D、2.8 千克
- 70、单项选择题：我国唯一的大型优质鹅种（ ）。
A、四川白鹅
B、狮头鹅

- C、皖西白鹅
D、太湖鹅
- 71、单项选择题：鹅的正常体温是（ ）。
A、35℃
B、39℃
C、41℃
- 72、单项选择题：下列哪种鹅年产蛋量最多（ ）。
A、四川白鹅
B、莱茵鹅
C、伊犁鹅
- 73、单项选择题：（ ）常用于养禽场环境杀菌消毒。
A、可见光线
B、红外线
C、紫外线
D、射线
- 74、单项选择题：提高蛋鸡场的经营利润主要靠（ ）。
A、降低饲料费
B、提高饲料转化率
C、降低工资费、管理费、水电费
- 75、单项选择题：鹅舍空置鹅舍清洗、消毒完毕后（ ）天可以进鹅。
A、当天
B、7天
C、20天
- 76、单项选择题：雏鹅在温度适宜时的表现为（ ）。
A、分布均匀
B、活动正常
C、无扎堆现象
D、以上都对
- 77、单项选择题：雏鹅的特点是（ ）。
A、体温调节机能较差
B、生长发育快，新陈代谢旺盛
C、喜欢扎堆
D、以上都是
- 78、单项选择题：四川白鹅的出壳体重为（ ）克左右。
A、35克
B、45克
C、50克
D、75克
- 79、单项选择题：肉仔鸡舍增加光照的目的是（ ）。
A、促进生长
B、防止啄癖

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/958074132050007051>