专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背200题题库，word格式可自由下载编辑，附完整答案！

2024年海南省天涯区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背200题王牌题库附参考答案（综合题）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.由药师审核监测

A：患者执行医嘱差错

B：护士执行医嘱差错

C：药师调配处方差错

D：医师处方差错

答案：D

2.患者，男，60岁，有糖尿病家族史。出现口干，多饮，多尿，体重下降6个月，BMI值29.0。空腹血糖10.2mmol/L，餐后2小时血糖16.7mmol/L，血压115/80mmHg。

A：胃肠道反应

B：皮疹

C：关节痛

D：低血糖

答案：A

3.下列药物中，具有肝药酶诱导作用的是

A：异烟肼

B：克林霉素

C：利福平

D：咪康唑

答案：C

4.中成药血脂康中航油的化学成分是

A：洛伐他丁

B：依折麦布

C：辛伐他丁

D：阿托伐他汀

答案：A

5.据统计，全国高血压患者已经超过2亿，高血压患者中不足三成的人知道自己患病；而知道自己患有高血压的患者中，一半多没有应用药物治疗；而接受治疗的患者中，能达到治疗要求的仅占三成左右。高血压死亡率不断升高，因此熟悉高血压及其相关治疗用药，对更有效地防治高血压非常重要。

A：甲基多巴

B：依那普利

C：氢氯噻嗪

D：拉贝洛尔

答案：B

6.降钙素属于

A：骨吸收抑制剂

B：促进骨矿化剂

C：激素替代剂

D：骨形成刺激剂

答案：A

7.患者,男,62岁,临床使用青蒿素和乙胺嘧啶联合治疗疟疾,产生的药物相互作用属于()

A: 拮抗作用,药品不良反应增加

B: 敏感化作用,药品不良反应增加

C: 增加靶器官药物浓度,药品不良反应减少

D: 降低抗药性,疗效增加

答案：D

8.与胆酸螯合剂合用，应至少提前2h服用的药物是

A: 螺内酯

B: 伊曲康唑

C: 依折麦布

D: 他汀类与烟酸类联用

答案：C

9.适用轻中度肾功不全者的是由肝胆排泄的

A: 格列吡嗪控释片

B: 格列本脲

C: 格列喹酮

D: 甲苯磺丁脲

答案：C

10.心衰治疗中能够快速控制体液潴留的药物是（）

A: β 受体阻断剂

B: 肾上腺素

C: 阿托品

D: 利尿剂

答案：D

11.患者，男，72岁，以“间断发热、纳差、精神抑郁半年，再发高热1天”为主诉入院，既往体健，无高血压、糖尿病、冠心病史。入院时查体：T36.9℃，P88次/分，R22次/分，BP112/77mmHg，可触及颈部、锁骨上、腋下多部位浅表淋巴结肿大。经实验室检查、影像学检查，确诊为非霍奇金淋巴瘤。

A: 每21天为1个疗程

B: 抗肿瘤药物均采用静脉给药

C: 抗肿瘤药物选择在每个疗程的第一天给药

D: 根据患者的体重计算抗肿瘤药物给药剂量

答案：D

12.下列药物使用方式,正确的是()

A: 乙酰半胱氨酸泡腾片用100ml温开水浸泡溶解后服用

B: 氧氟沙星滴眼液打开使用后,继续使用3个月

C: 硝酸甘油片在心绞痛发作的紧急情况下嚼碎用冰水送服

D: 酵母片在餐后整片用水送服

答案：A

13.患者，女，72岁，因心力衰竭急性发作入院，水肿明显，给予呋塞米40mg静脉滴注，给药后应定期监测的生理指标是

A: 血脂

B: 血糖

C: 血钾

D: 血钙

答案：C

14.人体正常体温的标准是直肠温度不超过

A：37.2℃

B：36.6℃

C：37.6℃

D：36.9

答案：C

15.结果一致的Ⅱ、Ⅲ级临床研究结论或Ⅰ级临床研究的推论属于()分级。

A：B级

B：C级

C：A级

D：D级

答案：A

16.二甲双胍的最佳服用时间是

A：餐后

B：餐中

C：清晨空腹

D：餐前

答案：B

17.用于有机磷中毒症状的对抗药物是

A：碘解磷定

B：毛果芸香碱

C：亚甲蓝

D：阿托品

答案：D

18.外阴阴道假丝酵母菌病宜选用

A：制霉菌素

B：林可霉素

C：甲硝唑

D：庆大霉素

答案：A

19.适用于有完整子宫、绝经后期仍希望有月经样出血的妇女()

A：雌孕激素连续联合用药

B：单纯雌激素补充治疗

C：单纯孕激素补充治疗

D：雌孕激素序贯用药

答案：D

20.患者,女,50岁,近期出现失眠、潮热、出汗、烦躁等不适症状,临床诊断为围绝经期综合征,在使用激素替代治疗之前应先排除禁忌证。下列情况不属于禁忌证但属于慎用的是()

A：严重肝功能障碍

B：近6月内患活动性静脉栓塞性疾病

C：乳腺增生

D：耳硬化症

答案：C

21.关于药品编码，下列说法错误的是

A：国家药品编码只适用于药品生产、经营和使用领域

B：药品编码是我国药品监督管理的一项基础的标准化工作

C：建立国家药品编码系统是一项专业化极强的技术工作

D：药品作为特殊商品，要实现防止伪劣，必须遵循"单品单码"的原则

答案：A

22.患者，男，70岁，2周以来出现尿频、夜尿次数明显增多，且尿流变细、间断，排尿踌躇、费力等排尿困难现象，排尿后滴沥、尿不尽，近几天又出现睡眠障碍。

A: 急性肾盂肾炎

B: 急迫性尿失禁

C: 压力性尿失禁

D: 膀胱炎

答案：A

23.属于苯二氮䓬类药物的是

A: 艾司唑仑

B: 丁螺环酮

C: 阿米替林

D: 舍曲林

答案：A

24.（2015年真题）患者，男，70岁，右手抖动和行走缓慢3个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病。既往前列腺肥大史3年，临床上对该患者不宜选用（）。

A: 司来吉兰

B: 左旋多巴

C: 多巴丝肼

D: 苯海索

答案：D

25.下列情况的首选药物是，高TC血症

A：他汀类
B：弹性酶
C：胆酸螯合剂+贝特类
D：贝丁酸类
答案：A

26.属于HIV整合酶链转移抑制剂的是（）
A：洛匹那韦
B：奈韦拉平
C：阿巴卡韦
D：多替拉韦
答案：D

27.以下属于急性肾盂肾炎的表现的是
A：老年人表现不典型，可仅表现为纳差、淡漠、谵妄等
B：可出现排尿不适、下腹痛和排尿困难
C：约30%可出现血尿
D：尿液常浑浊，有异味
答案：A

28.患者，男，身高180cm，体重90kg，腰围100cm，其体重指数(BMI)是()
A：27.8
B：30.2
C：18
D：20
答案：A

29.对于效果不易察觉或起效慢的药物，应特别提示、告知坚持服药
A：针对患者生理及心理特点选药
B：使用分时药盒和用药记录
C：使患者了解药物的重要性
D：简化治疗方案
答案：C

30.可引起血清总蛋白降低的是
A：慢性肝炎、肝硬化、肝实质性损害
B：摄入不足、消化不良时
C：各种原因脱水所致的血液浓缩
D：自身免疫性疾病如风湿热、红斑狼疮等
答案：B

31.关于血清尿素氮和血肌酐的叙述正确的是
A：血肌酐的浓度会受到饮食、高分子代谢等肾外因素的影响
B：通过测定尿素氮可了解肾小球的滤过功能
C：血清尿素氮主要经肾小管分泌而随尿液排出体外
D：当肾实质受损害时，可使血液中血清尿素氮的水平降低
答案：B

32.对购药患者讲授安全用药常识是
A：主动方式
B：质问方式
C：指令方式
D：被动方式
答案：A

33.患者，男，40岁，因肺结核使用抗结核药后，肌肉痉挛，四肢感觉异常，导致这种症状的药物是

A: 利福平

B: 乙胺丁醇

C: 吡嗪酰胺

D: 异烟肼

答案：D

34.应用胆碱酯酶复活剂应注意

A: 复活剂对毒蕈碱样作用较强

B: 中毒已超过3日使用复活剂仍然有效

C: 切勿两种或三种复活剂同时使用，以免毒性增加

D: 复活剂不需稀释，直接注射

答案：C

35.经口急性汞中毒出现的典型症状是（）

A: 肌肉震颤、抽搐

B: 腐蚀性口腔炎

C: 恶心、呕吐、视物模糊

D: 恶心、呕吐、口内有金属味

答案：B

36.患者女45岁。一年前临床诊断为室上性心动过速服用美托洛尔片25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡幽门螺杆菌阳性。医师处方：埃索美拉唑镁肠溶片20mgbid，甲硝唑片0.4gbid，克拉霉素片50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊0.6gbid。

A: 甲硝唑片

B: 枸橼酸铋钾胶囊

C：克拉霉素片

D：埃索美拉唑镁肠溶片

答案：C

37.成人(末梢血)白细胞(WBC)的正常值参考范围是

A：(5.0～10.0)×10

B：(5.0～12.0)×10

C：(4.0～10.0)×10

D：(3.5～10.0)×10

答案：C

38.容易引起肌酸激酶升高的药物是

A：青霉素

B：洛伐他汀

C：奥美拉唑

D：红霉素

答案：B

39.以下所列药物中，最可能引起血小板减少的是

A：硝酸甘油

B：阿司匹林

C：维生素E

D：呋噻米

答案：B

40.利血平+氢氯噻嗪

A：抑制乙醛脱氢酶

B：产生有利的药物相互作用

C: 造成听神经和肾功能不可逆性损害

D: 抑制氧化代谢反应

答案：B

41.可告知患者采取如穿戴宽松的鞋袜和手套，避免反复揉搓手脚，避免长时间阳光直射等措施预防药物不良反应的是

A: 奥沙利铂

B: 顺铂

C: 卡铂

D: 卡培他滨

答案：D

42.患者，女，58岁，既往无心脏病、高血压、糖尿病病史及手术史。日前体检：身高160cm，体重70kg;白细胞8.0×10

A: 心力衰竭

B: 低血糖

C: 肌痛

D: 乳酸酸中毒

答案：D

43.需要在冷处贮存的高警示药品是

A: 高锰酸钾

B: 胰岛素

C: 降钙素

D: 肾上腺素

答案：B

44.(用药导致的血常规异常)甲基多巴

A：中性粒细胞减少

B：血小板减少

C：嗜酸性粒细胞减少

D：血红蛋白量增多

答案：C

45.枸橼酸铋钾所致的主要不良反应是

A：性功能减退

B：腹痛

C：神经毒性

D：皮炎

答案：C

46.孕妇的急性膀胱炎治疗时间是

A：3~7日

B：3~5日

C：1~3日

D：10日

答案：A

47.属于癌痛治疗第三阶梯的止痛药物为

A：对乙酰氨基酚

B：曲马多

C：可待因

D：羟考酮

答案：D

48.脑梗死的治疗药物，抗凝治疗

A: 阿司匹林

B: 甘露醇

C: 阿替普酶

D: 普通肝素

答案：D

49.发现处方存在或潜在的问题、制定并实施干预和改进措施，是

A: 处方点评

B: 参与健康教育

C: 处方审核

D: 药物信息服务

答案：A

50.记录患者用药问题、药学干预内容、药学监护计划的技能是

A: 自主学习能力

B: 药历书写技能

C: 药品警戒技能

D: 沟通技能

答案：B

51.冠状动脉粥样硬化心脏病患者，如没有用药禁忌症，欲服用阿司匹林作为一线预防，最佳剂量范围是

A: 150～300mg/d?

B: 25～50mg/d?

C: 25～75mg/d?

D: 75～150mg/d?

答案：D

52.糖尿病合并肾病者首选

A：二甲双胍

B：比格列酮

C：阿卡波糖

D：格列喹酮

答案：D

53.提供药师药学服务的重要方式和途径的是

A：参与临床药物治疗

B：处方调配

C：治疗药物监测

D：静脉药物配置

答案：C

54.患者，女，32岁，2天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛。血常规见WBC15×109／L，中性粒细胞百分比85%。尿常规见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

A：左氧氟沙星

B：庆大霉素

C：罗红霉素

D：克林霉素

答案：A

55.在一定范围内,其水平与动脉粥样硬化和冠心病的发生、发展呈负相关的指标是（）

A：LDL-C

B：TG

C: HbA1c

D: HDL-C

答案：D

56.特布他林平喘的主要机制是

A: 抑制白三烯受体

B: 激动肾上腺素 β2 受体

C: 拮抗 M 胆碱受体

D: 阻断腺苷受体

答案：B

57.患者，男，70 岁，右手抖动和行走缓慢 3 个月，经过神经科检查后诊断为帕金森病，既往前列腺肥大史 3 年，临床上对该患者不宜选用：

A: 左旋多巴

B: 司来吉兰

C: 多巴丝肼

D: 苯海索

答案：D

58.下列关于巨幼细胞性贫血的说法错误的是()

A: 全胃切除的巨幼细胞性贫血患者需要终生维持治疗

B: 可静脉滴注维素 B12100~500μg

C: 恶性贫血者需要终生维持治疗

D: 老年人和酗酒者为高危人群

答案：B

59.水杨酸、荼甲唑啉等局部用药可引起中毒，即

A：药物吸收
B：药物分布
C：药物代谢
D：药物中毒
答案：A

60.无吞噬功能，但细胞颗粒中含有许多生物活性物质如肝素、组胺、慢反应物质等的细胞为
A：嗜碱性粒细胞
B：中性粒细胞
C：嗜酸性粒细胞
D：淋巴细胞
答案：A

61.通过重整患者的医嘱或药疗方案，评估药物治疗的有效性、安全性和经济性，核查患者的用药依从性，属于
A：处方审核
B：药学干预
C：药物利用研究和评价
D：药物治疗管理
答案：D

62.流行性出血性结膜炎可选用
A：0.1%碘苷滴眼剂
B：0.1%羟苄唑滴眼剂
C：四环素眼膏
D：2%色甘酸钠滴眼剂
答案：B

63.因不良反应很小，可在老年人群中使用的治疗失眠症药物为（）
A: 米氮平
B: 艾司唑仑
C: 佐匹克隆
D: 雷美尔通
答案：D

64.钙制剂属于
A: 促进骨矿化剂
B: 骨吸收抑制剂
C: 激素替代剂
D: 骨形成刺激剂
答案：A

65.急诊处方一般不超过几日
A: 1日常用量
B: 15日常用量
C: 7日常用量
D: 3日常用量
答案：D

66.患者,男,46岁,因类风湿性关节炎长期使用免疫抑制剂,近日因出现发热、咳嗽、咳痰入院经病原学检查,诊断为侵袭性肺曲霉病,临床欲使用伏立康唑治疗。患者同时合并肝功能不全Child-TurcottePugh(CTP)评分为13分(CTPC级)。根据CTP评分结果,药师的用建议是()
A: 该患者轻度肝功能不全,伏立康唑维持剂量减少25%

B: 该患者中度肝功能不全,伏立康唑维持剂量减少50%

C: 该患者轻度肝功能不全,伏立康唑维持剂量不变

D: 该患者重度肝功能不全,不建议使用伏立康唑

答案：D

67.男性，72岁。高血压病3年，血压165/95mmHg，伴2型糖尿病。首选降压药物是

A: 心痛定

B: β-受体阻滞剂

C: 利尿剂

D: ACEI类

答案：D

68.关于抗抑郁药用药注意事项及患者教育的说法，错误的是

A: 氟西汀停药5周之后才能换用MAOIs

B: 多种抗抑郁药合并使用，可增加5一HT综合征的发生风险

C: 尽可能采用最小有效剂量

D: 联合用药效果好，应为首选

答案：D

69.治疗腹痛较重或反复呕吐性腹泻宜选用的药物是

A: 山莨菪碱

B: 庆大霉素

C: 泛昔洛韦

D: 双歧杆菌

答案：A

70.治疗反复性偏头痛推荐应用

A: 阿司匹林
B: 对乙酰氨基酚
C: 苯妥英钠
D: 麦角胺咖啡因片
答案：D

71.可导致手、足、脸以及内部器官不正常发育的兴奋剂是
A: 精神刺激剂
B: 人生长激素
C: 蛋白同化激素
D: B受体阻断剂
答案：B

72.患者，女，实验室检查：血红蛋白95g/L。临床诊断为缺铁性贫血，处方口服硫酸亚铁片。下列向患者交代的用药注意事项，错误的是
A: 宜同时补充维生素C或稀盐酸
B: 不宜与钙剂同时服用
C: 不宜同时进食牛奶和蛋类
D: 宜空腹服用
答案：D

73.属于非核苷类逆转录酶抑制剂的是
A: 齐多夫定
B: 利巴韦林
C: 利托那韦
D: 依非韦伦
答案：D

74.用于产后出血，但在胎盘娩出前禁用的药物是
A：麦角新碱
B：水合氯醛
C：甲巯咪唑
D：抗组胺药
答案：A

75.患者，男，62岁，以“咳嗽、咳痰、胸闷、呼吸困难”为主诉就医，问诊“有吸烟史30年，2年前从水泥厂退休”。肺功能检查FEV1占预计值35%。诊断为慢性阻塞性肺疾。针对该患者，治疗方案应选择
A：联合使用福莫特罗+倍氯米松
B：单一、规律使用沙丁胺醇气雾剂
C：单一、规律口服泼尼松片
D：单一、规律使用布地奈德吸入粉雾剂
答案：A

76.属于5-羟色胺及去甲肾上腺素再摄取抑制剂的药品是
A：雷尼替丁
B：奥美拉唑
C：吗氯贝胺
D：度洛西汀
答案：D

77.不宜与茶叶合用的药物是
A：辛伐他汀
B：硫酸亚铁
C：磺胺类药物
D：左旋多巴

答案：B

78.缓泻药连续使用的时间一般不应超过

A：10日

B：5日

C：7日

D：3日

答案：C

79.患者，男，55岁，因支气管哮喘使用倍氯米松-福莫特罗干粉吸入剂治疗，症状控制良好，5个月内无急性发作，拟进行降级治疗。关于哮喘降级治疗原则的说法，错误的是

A：降级治疗应选择适当时机，需避开患者呼吸道感染等情况

B：以最低剂量的福莫特罗维持治疗，直到最终停药

C：通常每3个月减少倍氯米松剂量25%～50%

D：首先降低激素剂量，再减少使用频率

答案：B

80.（2017年真题）半衰期大于24h的药物通常选择（）

A：每日给药1次

B：每个半衰期给药1次

C：静脉滴注给药

D：2～3个半衰期给药1次

答案：A

81.成人白细胞计数（WBC）的正常参考区间是

A：（5.0～12.0）X109/L

B：（4.0～10.0）X109/L

C: （3.5～10.0）X109 / L

D: （5.0～10.0）X109 / L

答案：B

82.阿司匹林中副产物乙酰水杨酰水杨酸和乙酰水杨酸酐引起哮喘、慢性荨麻疹归属

A: 药物制剂因素

B: 药物的使用

C: 药理作用

D: 药动学相互作用

答案：A

83.门诊处方一般不超过几日

A: 7日常用量

B: 15日常用量

C: 1日常用量

D: 3日常用量

答案：A

84.以下哪项是乳果糖治疗功能性便秘的主要机制

A: 润滑并刺激肠壁，软化大便

B: 润滑肠壁，软化大便和调节稠度

C: 刺激肠壁的感受神经末梢，引起肠反射性蠕动增强而排便

D: 在结肠中被消化道菌群转化成低分子量的有机酸，导致肠道内的pH下降，并通过渗透作用增加结肠内容量

答案：D

85.患者，女，55岁，因“反复发作胸骨后疼痛2年，伴反酸、胃灼热、间断积食”来诊，食管测压提示食管下段括约肌压力小于6mmHg，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病。医师处方：奥美拉唑20mgbid强化抑酸治疗。

A: 长期服用可能会出现维生素K缺乏

B: 不宜咀嚼

C: 适宜餐前30分钟服用

D: 用药后可能出现口干、便秘等不良反应

答案：A

86.患者，男，56岁，以发热、左侧胸廓剧痛就诊。查体：体温38.8℃，左侧沿第四肋走向有簇集性水疱。

A: 卡马西平

B: 对乙酰氨基酚

C: 普瑞巴林

D: 阿米替林

答案：A

87.患者，男，体检发现血清尿素氮升高、血肌酐升高，其他生化指标正常，该患者最可能患有

A: 肝脏疾病

B: 心脏疾病

C: 肾脏疾病

D: 血液疾病

答案：C

88.吩噻嗪类抗精神病药中毒时若癫痫发作应给予

A：地西泮

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/965102221121012033