

一、单项选择题（每小题 1 分，共 100 分）

1、每年分春秋两次采收的药材是

- A、肉桂
- B、厚朴
- C、杜仲
- D、黄柏
- E、牡丹皮

【答案】：A

2、某药材呈类圆球形，稍偏斜，直径 0.8~1.5cm，表面白色或浅黄色，顶端有凹陷茎痕，下端钝圆，断面洁白，富粉性，味辣麻舌刺喉，此药为

- A、天南星
- B、白附子
- C、半夏
- D、甘遂
- E、延胡索

【答案】：C

3、蜂蜜中还原糖的含量测定采用()

- A、滴定法
- B、分光光度法
- C、薄层扫描法
- D、气相色谱法
- E、高效液相色谱法

【答案】：A

4、阳损及阴的病机，主要是指

- A、阳热内盛，深伏于里，阳气被遏，拒阴于外

- B、阳气虚损，累及阴液生化不足
- C、阳气不足，不能制阴，导致虚寒内生
- D、外感温热阳邪，伤及阴液
- E、阳气虚损，气化不利，水湿阴寒病邪积聚

【答案】：B

5、主产于甘肃省的中药材是

- A、三七
- B、当归
- C、地黄
- D、附子
- E、紫菀

【答案】：B

6、急躁易怒，胸胁胀满，口苦而干，或头痛目赤耳鸣，或嘈杂吞酸，大便秘结。舌质红苔黄，脉弦数症属

- A、血行郁滞
- B、肝气郁结
- C、痰气郁结
- D、气郁化火
- E、肝阴亏虚

【答案】：D

7、番泻苷 A 属于

- A、二蒽酮衍生物
- B、二蒽醌衍生物
- C、大黄素型蒽醌衍生物
- D、茜草素型蒽醌衍生物
- E、蒽酮衍生物

【答案】：A

8、治心火亢盛，口舌生疮，及移热于小肠，热淋涩痛等，宜选用的药物是

A、黄柏

B、黄芩

C、芦根

D、夏枯草

E、淡竹叶

【答案】：E

9、外感风热可引起的鼻及鼻内分泌物变化是

A、鼻干少涕

B、鼻头充血

C、鼻流浊涕

D、鼻流清涕

E、久流腥臭涕

【答案】：C

10、马钱子的药用部位为

A、干燥成熟果实

B、干燥未成熟果实

C、干燥近成熟果实

D、干燥幼果

E、干燥成熟种子

【答案】：E

11、穿心莲中的内酯类成分主要存在于

A、根中

B、茎中

C、叶中

D、花中

E、种子中

【答案】：C

12、苷酸催化水解的难易与糖的类型有关，其由易至难的顺序是

A、 α -羟基糖苷、 α -氨基糖苷、 α -去氧糖苷

B、 α -羟基糖苷、 α -去氧糖苷、 α -氨基糖苷

C、 α -去氧糖苷、 α -氨基糖苷、 α -羟基糖苷

D、 α -氨基糖苷、 α -羟基糖苷、 α -去氧糖苷

E、 α -去氧糖苷、 α -羟基糖苷、 α -氨基糖苷

【答案】：E

13、罂粟壳的功效是

A、补肾助阳，固精缩尿

B、涩肠，敛肺，下气

C、敛肺，涩肠，止痛

D、涩肠，止泻，杀虫

E、益肾，固精，缩尿

【答案】：C

14、脏腑关系中，表现为燥湿相济关系的是指

A、肾与膀胱

B、心与小肠

C、肺与大肠

D、肝与胆

E、脾与胃

【答案】：E

15、主要提供中药学及中西医结合信息的网站是

A、.winpharm.net

B、.tnp

C、.sdrug

D、.itcmedu

E、.zhongyao.net

【答案】：D

16、蒙医药方的药味数是固定的，一般来说治疗中病、病情中等的方中各药味数的组成为

A、君臣各1，佐2使3

B、君臣各1，佐3使5

C、君臣各1，佐5使9

D、君臣各2，佐3使5

E、君臣各2，佐5使9

【答案】：B

17、宜研粉吞服的药物是

A、使君子

B、苦楝皮

C、槟榔

D、贯众

E、鹤草芽

【答案】：E

18、下列关于注射剂的质量要求错误的是

A、无菌

B、无热原

C、与血浆等渗和等张

D、同一品种 pH 值差异范围不超过 2.0

E、溶液型注射剂不得有肉眼可见的异物

【答案】：D

19、伪品大黄药材新折断面在紫外光灯下显

- A、黄色
- B、紫红色
- C、棕色或红棕色
- D、蓝色或灰蓝色
- E、亮蓝紫色

【答案】：E

20、下列关于粉碎原则的论述中，错误的是

- A、药物应粉碎得愈细愈好
- B、粉碎时应尽量保存药材组分和药理作用不变
- C、粉碎毒性药及刺激性药时，应注意劳动保护
- D、粉碎易燃易爆药物时，应做好防火防爆
- E、植物药材粉碎前应先干燥

【答案】：A

21、既为治蛔虫病之佳品，又为治小儿疳积之要药的中药是

- A、使君子
- B、苦楝皮
- C、贯众
- D、雷丸
- E、槟榔

【答案】：A

22、关于混合的叙述，错误的是

- A、混合的原理大致有切变、对流和扩散混合等
- B、混合的方法一般有研磨、搅拌和过筛混合等
- C、当药物比例量相差较大时应采用套色法混合

D、等量递增法亦称等体积递增配研法

E、当药物的堆密度相差较大时，应将轻者先置于钵体中，加重者配研

【答案】：C

23、《处方管理办法》规定，保存期满的处方销毁须经

A、医疗、预防、保健机构或药品零售企业主管领导批准、登记备案

B、县以上卫生行政部门批准、登记备案

C、县以上(食品)药品监督管理部门-批准、登记备案

D、县以上监察管理部门批准、登记备案

E、医疗机构主要负责人批准、登记备案

【答案】：E

24、药品申报者在申报临床试验时，提供虚假资料，情节严重的，不受理该药品申报者申报该药品的期限是

A、6个月

B、3个月

C、1年

D、3年

E、10年

【答案】：D

25、下列有关黄酮类化合物从聚酰胺柱上的洗脱规律，错误的是

A、苷元相同，洗脱先后顺序为：叁糖苷，双糖苷，单糖苷，苷元

B、具有对位或间位羟基黄酮洗脱先于具有邻位羟基黄酮

C、不同类型黄酮化合物，洗脱先后顺序为：异黄酮，二氢黄酮醇，黄酮，黄酮醇

D、查耳酮比相应的二氢黄酮后洗脱

E、黄酮母核上增加羟基，洗脱速度减慢

【答案】：B

26、化学配伍变化的是

- A、粒子聚集
- B、某些溶剂性质不同的制剂相互配合使用时，析出沉淀
- C、变色
- D、潮解、液化和结块
- E、分散状态变化

【答案】：C

27、米拌炒时辅料用量一般为每 100kg 药物用米

- A、30kg
- B、20kg
- C、10kg
- D、15kg
- E、适量

【答案】：B

28、含毒性药物酞剂的浓度为()

- A、25% (g / ml)
- B、20% (g / ml)
- C、15% (g/ml)
- D、10% (g / ml)
- E、5% (g / ml)

【答案】：D

29、肠溶空心胶囊囊壳常用的包衣材料是

- A、聚乙二醇 (PEG)
- B、聚维酮 (PVP)
- C、聚乙烯醇 (PVA)
- D、醋酸纤维素酞酸酯 (CAP)

E、羧甲基纤维素钠(CMC-Na)

【答案】：D

30、补肝肾、强筋骨，又能安胎的药宜选

A、续断

B、狗脊

C、杜仲

D、骨碎补

E、A+C

【答案】：E

31、热原致热的活性中心为

A、蛋白质

B、磷脂

C、脂多糖

D、核糖核酸

E、生物激素

【答案】：C

32、含淀粉多的饮片易

A、泛油

B、腐烂

C、发霉

D、潮解

E、虫蛀

【答案】：E

33、不属于解表药使用注意的是

A、不可过汗

B、不宜久煎

- C、热病津亏者忌服
- D、疮疡初起者忌服
- E、失血兼表证者慎服

【答案】：D

34、津液输布排泄过程与下面哪一项功能不密切

- A、肺的宣发与肃降
- B、脾的运化和散精
- C、肝的疏泄条达
- D、心主血脉
- E、肾的蒸腾气化

【答案】：D

35、胡黄连主含

- A、生物碱
- B、皂苷
- C、木脂素类
- D、蒽醌类
- E、环烯醚萜苷类

【答案】：E

36、鉴定中药的真实性、纯度和品质优良度的最佳方法是

- A、基原鉴定
- B、水分测定
- C、有害物质检测
- D、理化鉴定
- E、本草考证

【答案】：D

37、关于红升丹的基础方叙述正确的为()

- A、水银、白矾、火硝
- B、水银、火硝
- C、白矾、火硝
- D、水银、白矾、食盐
- E、水银、白矾

【答案】：A

38、钩藤横切片置紫外光灯下观察，切面显

- A、蓝色
- B、亮淡绿色
- C、亮蓝紫色
- D、金黄色
- E、棕黄色

【答案】：A

39、非处方药专有标识用于

- A、已列入《国家基本药物目录》的药品
- B、通过药品监督管理部门审核登记的非处方药药品
- C、通过药品监督管理部门审批的非处方药药品
- D、已列入《国家非处方药目录》，并通过药品监督管理部门审批的非处方药药品
- E、已列入《国家非处方药目录》，并通过药品监督管理部门审核登记的非处方药药品

【答案】：E

40、马鹿茸具3个侧枝者习称

- A、单门
- B、大挺
- C、二茬

D、三岔

E、莲花

【答案】：D

41、黄酮类化合物的基本母核是

A、色原酮

B、2-苯基色原酮

C、苯骈 α -吡喃酮

D、苯骈 β -吡喃酮

E、苯丙素

【答案】：B

42、香豆素基本母核的结构特征是

A、内酯

B、苯骈 α -吡喃酮

C、苯骈呋喃环

D、萘酚

E、苯环

【答案】：B

43、母丁香药用部位是

A、花蕾

B、花序

C、果实

D、种子

E、枝皮

【答案】：C

44、番泻苷 A 中两个蒽酮连接位置为

A、C-10 和 C-10'

- B、C-1 和 C-3'
- C、C-6 和 C-7'
- D、C-10 和 C-1'
- E、C-10 和 C-2'

【答案】：A

45、可用于家庭保健的一次性吸血、敷药使用的是

- A、医用橡皮膏
- B、医用纱布
- C、一次性使用输液器
- D、医用绷带
- E、创可贴

【答案】：B

46、中药胶囊剂宜置阴凉干燥处保存，其温湿度控制的范围最好是

- A、温度 30℃以下，相对湿度 60%~70%
- B、温度 25℃以下，相对湿度 50%~60%
- C、温度 30℃以下，相对湿度 50%~60%
- D、温度 20℃以下，相对湿度 60%~70%
- E、温度 20℃以下，相对湿度 50%~60%

【答案】：A

47、既能治疗咳嗽气喘，又能治疗肠燥便秘的一对中药是

- A、杏仁苏子
- B、杏仁胖大海
- C、杏仁火麻仁
- D、杏仁柏子仁
- E、杏仁郁李仁

【答案】：A

48、五脏共同的生理特点是

- A、推动血液运行
- B、受盛和传化水谷
- C、促进水液输布与排泄
- D、主生长、发育与生殖
- E、化生和贮藏精气

【答案】：E

49、若患者平日食少且食后腹胀，腹中常冷痛，喜温饮，舌淡苔白，脉沉迟，治疗时应

- A、温脾补气
- B、益气健脾
- C、温中健脾
- D、温中化湿
- E、以上均不是

【答案】：C

50、sephadex 分离混合物的基本原理是

- A、吸附性差异
- B、分配比不同
- C、分子大小不同
- D、氢键吸附能力不同
- E、离子状态不同

【答案】：C

51、长于祛风解表的药组是

- A、麻黄桂枝
- B、桑叶菊花
- C、荆芥防风

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/965140241120011131>