



脐带脱垂护理查房



| CATALOGUE |

目录

- 脐带脱垂概述
- 脐带脱垂对母婴的影响
- 脐带脱垂的紧急处理
- 脐带脱垂的预防与护理
- 脐带脱垂的病例分享与讨论

01

CATALOGUE

脐带脱垂概述

定义与分类



定义

脐带脱垂是指胎膜破裂后，脐带脱出宫颈口外，降至阴道内甚至露于外阴的现象。



分类

根据脐带脱垂的程度，可分为部分性脐带脱垂和完全性脐带脱垂。

发生原因



胎位异常

如肩难产、臀先露等异常胎位，容易发生脐带脱垂。



早产或过期妊娠

早产或过期妊娠时，羊水过多、胎膜早破等风险增加，可能导致脐带脱垂。



胎儿过小

胎儿过小使得脐带更容易滑出。




其他因素

如头盆不称、胎头未衔接等也可能导致脐带脱垂。




临床表现



01

腹痛

由于脐带受到压迫，孕妇可能出现腹痛症状。



02

胎心音变化

脐带脱垂可能导致胎儿缺氧，表现为胎心音异常。



03

阴道异常流血

部分孕妇可能出现阴道异常流血现象。



04

其他症状

如子宫收缩乏力、羊水过少等也可能出现。

02

CATALOGUE

脐带脱垂对母婴的影响

对胎儿的影响

01




胎儿缺氧



脐带脱垂时，胎儿可能因脐带受压而缺氧，严重时可能导致胎儿死亡。

02



胎儿酸中毒



长时间的脐带受压可能导致胎儿酸中毒，影响胎儿的神经系统发育。

03



胎儿窘迫



脐带脱垂可能导致胎儿窘迫，使胎儿在子宫内处于危险状态。



对母体的影响



产程延长

脐带脱垂可能导致产程延长，增加产妇和胎儿的风险。



产后出血

部分产妇在分娩后可能出现产后出血，与脐带脱垂有关。



感染风险增加

脐带脱垂可能导致子宫和产道感染的风险增加。



并发症

新生儿窒息

新生儿可能因脐带脱垂导致出生时窒息，需要紧急抢救。



母体并发症增多

如产褥感染、产后出血等，与脐带脱垂有关。



胎儿死亡

严重的脐带脱垂可能导致胎儿死亡，是产科的严重并发症之一。



03

CATALOGUE

脐带脱垂的紧急处理



产前紧急处理

立即就医

一旦发现脐带脱垂的迹象，应立即前往医院就诊，避免自行处理。



保持冷静

在等待急救人员或前往医院的途中，保持冷静，不要惊慌失措。



采取合适体位

尽量采取平卧或侧卧位，避免增加腹压和影响血液循环。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/965302243343011114>