2024年广东省南山区《执业药师之西药学专业二》考试必背200题题库大全加答案下载

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.下列哪种维生素可用于慢性铁中毒的治疗

A：维生素C

B：维生素E

C：维生素B

D：维生素B

答案：A

2.（2015年真题）可用于重度痤疮（尤其是结节囊肿型痤疮）的药品是（）。

A：阿达帕林

B：过氧苯甲酰

C：克林霉素

D：异维A酸

答案：D

3.（2019年真题）患者，女，孕8周，诊断为“甲状腺功能减退症”，给予左甲状腺素钠片治疗。对该患者的用药指导，错误的是（）

A：左甲状腺素钠极少通过胎盘，治疗剂量下对胎儿无不良影响

B：孕期甲减可能对胎儿造成不良影响，服药期间应监测甲功

C：应于早餐后将一日剂量左甲状腺素钠片一次性用温水送服

D：服用左甲状腺素钠片期间如出现心悸、多汗或体重下降，应及时就诊

答案：C

4.患者。男，42岁，胃癌，病理为胃窦低分化腺癌，根治术后，肝肾功能正常，化疗方案为紫杉醇，顺铂+氟尿嘧啶。

A：10%~30%

B：30%~90%

C：1

D：大于90%

答案：D

5.抗瘤谱较广，恶性淋巴瘤疗效显著，还可治疗自身免疫性疾病的药物是()

A：环磷酰胺

B：丝裂霉素

C：奥沙利铂

D：塞替派

答案：A

6.下述关于甘油的描述，错误的是

A：妊娠期妇女慎用

B：属于渗透性泻药

C：属于润滑性泻药

D：用于便秘的治疗

答案：B

7.联用治疗布氏杆菌感染的是

A：链霉素和磺胺嘧啶

B：青霉素和链霉素

C: 青霉素和磺胺嘧啶

D: 链霉素和异烟肼

答案：A

8.对短动作电位时程的心房肌无效，仅用于室性心律失常的是()

A: 利卡多因

B: 维拉帕米

C: 普萘洛尔

D: 奎尼丁

答案：A

9.磺酰脲类降糖药的作用机制是

A: 加速胰岛素合成

B: 提高胰岛 β 细胞功能

C: 抑制胰岛素降解

D: 刺激胰岛 β 细胞释放胰岛素

答案：D

10.患儿，5岁。有咽痛、肌肉酸痛、咳嗽，实验室检查为支原体感染；医师处方红霉素治疗。

A: 与核蛋白50S亚基结合，抑制细菌蛋白质合成

B: 抑制细菌蛋白质合成全过程

C: 与核蛋白70S亚基结合，抑制细菌蛋白质合成

D: 与核蛋白30S亚基结合，抑制细菌蛋白质合成

答案：A

11.（2017年真题）属于抗雄性激素的肿瘤药是（）

A: 阿那曲唑

B: 氟他胺

C: 炔雌醇

D: 他莫昔芬

答案：B

12.患者，女，49岁，间断上腹部饱胀、恶心1年。患者1年前无明显诱因出现恶心、上腹饱胀感，自行服用胃药（具体不详）治疗后症状好转。2个月前患者上述症状再次发作，查体：上腹部轻微压痛，无反跳痛。胃镜、腹部B超检查未见明显异常。诊断：功能性消化不良。医嘱：枸橼酸莫沙必利片，5mg，口服，3次/日。

A: 莫沙必利

B: 胰酶

C: 甲氧氯普胺

D: 多潘立酮

答案：B

13.对红霉素的描述，下列不正确的是

A: 对青霉素耐药的金黄色葡萄球菌有效

B: 抗菌谱与青霉素相似但略广

C: 具有肝脏毒性

D: 属繁殖期杀菌剂

答案：D

14.（2018年真题）对磺胺类药物过敏者可以选用的利尿剂是（）

A: 依托塞米

B: 依他尼酸

C: 布美他尼

D: 乙酰唑胺

答案：B

15.具有抗炎作用的他汀类调血脂药是

A：阿伐他汀

B：藻酸双酯钠

C：普伐他汀

D：氟伐他汀

答案：C

16.主要用于控制疟疾症状的药物是

A：氯喹

B：甲硝唑

C：吡喹酮

D：乙胺嘧啶

答案：A

17.降低夜间眼压的首选药物是()

A：拉坦前列素滴眼剂

B：毛果芸香碱滴眼剂

C：噻吗洛尔滴眼剂

D：地匹福林滴眼剂

答案：A

18.下列哪种属于长效青霉素

A：苯唑西林

B：阿莫西林

C：苄星青霉素

D：青霉素V

答案：C

19.属于非麻醉性镇痛药的是

A：布洛芬

B：吗啡

C：可待因

D：美沙酮

答案：A

20.下列关于单克隆抗体抗肿瘤药物的描述，错误的是

A：对癌细胞和正常体细胞都有“杀灭”作用

B：优点是选择性“杀灭”，就是只对癌细胞起作用而对正常体细胞几乎没有伤害

C：贝伐单抗作用机制较为特殊，作用于血管内皮生长因子

D：静脉滴注可致患者发生过敏样反应或其他超敏反应

答案：A

21.患者，男，35岁，农民。感觉头昏乏力入院。查体：粪中钩虫卵(+++)，血红蛋白60g/L，诊断为钩虫感染、缺铁性贫血。

A：蔗糖铁

B：琥珀酸亚铁

C：叶酸

D：硫酸亚铁

答案：A

22.患者男性，56岁。有糖尿病史15年，近日并发肺炎，呼吸35次/分，心率105次/分，血压160/90mmHg，呼出气体有丙酮味，意识模糊，尿酮呈强阳性，血糖500mg/dl，诊断为糖尿病酮症酸中毒。

A: 口服

B: 皮下

C: 舌下含服

D: 静脉

答案：D

23.属于解毒类保肝药的是

A: 异甘草酸镁

B: 还原型谷胱甘肽

C: 多烯磷脂酰胆碱

D: 双环醇

答案：B

24.属于嘌呤类抗代谢类药物的是

A: 巯嘌呤

B: 吉西他滨

C: 甲氨蝶呤

D: 长春瑞滨

答案：A

25.铂类化合物

A: 丝裂霉素

B: 喜树碱类

C: 顺铂

D: 环磷酰胺

答案：C

26.抗血小板药西洛他唑属于

A: 整合素受体阻断剂

B: 磷酸二酯酶抑制剂

C: 维生素K拮抗剂

D: 二磷酸腺苷P2Y12受体阻断剂

答案：B

27.既能增加糖分解和减少糖生成，又能改善对胰岛素的敏感性的药物是

A: 二甲双胍

B: 罗格列酮

C: 氢氧化镁

D: 胰岛素

答案：A

28.联用治疗细菌性心内膜炎的是()

A: 链霉素和异烟肼

B: 链霉素和磺胺嘧啶

C: 青霉素和磺胺嘧啶

D: 青霉素和链霉素

答案：D

29.关于聚乙二醇4000治疗便秘的说法，错误的是

A: 疗程不宜过长

B: 肠梗阻患者禁用

C: 作用机制为刺激肠道分泌，增加粪便含水量以软化粪便

D: 适用人群为成人及8岁以上儿童

答案：C

30.很少单独缺乏，常伴其他维生素缺乏，大量服用可使尿液变黄，该物质是

A: 维生素AD

B: 维生素B2

C: 维生素C

D: 精氨酸

答案：B

31.内脏绞痛可选用()

A: 阿托品

B: 甲氧氯普胺

C: 肾上腺素

D: 熊去氧胆酸

答案：A

32.不可用于治疗白细胞减少的药物是

A: 腺嘌呤

B: 利伐沙班

C: 糖皮质激素

D: 利可君

答案：B

33.改善心肌收缩功能，抑制血管肥厚，可以减低血管僵硬程度，改善动脉顺应性抗高血压药是

A: 利尿降压药

B: 钙离子通道阻滞药

C: α受体激动药

D: 血管紧张素转换酶抑制药

答案：D

34.长期、单一应用 β

A：头痛

B：支气管痉挛

C：暂时性低血糖

D：耐药性

答案：D

35.以下属于袢利尿药的禁忌证的是()

A：高血压

B：高钾血症

C：高血糖

D：对试验剂量无反应的无尿者

答案：D

36.（2021年真题）患者，女，45岁。因持续的烧心和反酸就诊，诊断为胃食管反流病，宜选用的抑酸药物是（）

A：乳酶生

B：米索前列醇

C：吉法酯

D：雷尼替丁

答案：D

37.伐更昔洛韦口服后在肠道和肝脏中水解为

A：西多福韦

B：喷昔洛韦

C：阿昔洛韦

D: 更昔洛韦

答案：D

38.患者，女，55岁，临床诊断为2型糖尿病。目前药物治疗方案如下：

A: 可能出现的不良反应有腹痛，腹泻，腹胀

B: 服药期间不要饮酒，以免引起低血糖

C: 服药通常需3-4周的治疗才达降糖疗效

D: 定期监测血清维生素B12水平

答案：C

39.（2020年真题）餐后1~2小时、睡前或胃部不适时服用的抗酸剂是

A: 兰索拉唑

B: 米索前列醇

C: 铝碳酸镁

D: 枸橼酸铋钾

答案：C

40.丙磺舒与水杨酸盐和阿司匹林合用()

A: 代谢加快而失效

B: 抑制排酸作用

C: 代谢加速而导致意外怀孕

D: 子宫内膜突破性出血

答案：B

41.为快速杀菌药的抗菌药是()

A: 万古霉素和林可霉素

B: 万古霉素和氯霉素

C：氯霉素和替考拉宁

D：万古霉素和替考拉宁

答案：D

42.（2018年真题）关于乙酰半胱氨酸的说法,错误的是（）

A：乙酰半胱氨酸可用于对乙酰氨基酚中毒解救

B：对痰液较多的患者,乙酰半胱氨酸可与中枢性镇咳药合用增强疗效

C：乙酰半胱氨酸能减弱青霉素类、头孢菌素类、四环素类药物的抗菌活性

D：乙酰半胱氨酸能裂解脓痰中糖蛋白多肽链中的二硫键,使浓痰易于咳出

答案：B

43.抢救糖尿病合并酮症酸中毒患者

A：胰岛素皮下注射

B：静脉用胰岛素

C：刺激胰岛β细胞释放胰岛素

D：二甲双胍

答案：B

44.氨基糖苷类作用机制

A：抑制细菌糖代谢

B：干扰细菌核酸代谢

C：抑制细菌蛋白质合成

D：抑制细菌细胞壁合成

答案：C

45.抑制胸腺核苷酸合成酶

A: 羟基脲

B: 甲氨蝶呤

C: 阿糖胞苷

D: 氟尿嘧啶

答案：D

46.青霉素在体内的主要消除方式是

A: 肾小球滤过

B: 肝脏代谢

C: 肾小管分泌排泄

D: 被血浆酶破坏

答案：C

47.雷尼替丁用于治疗消化性溃疡的机制是

A: 竞争性拮抗H2受体

B: 抑制胃壁细胞H+，K+-ATP酶

C: 竞争性拮抗H1受体

D: 直接中和胃酸

答案：A

48.噻嗪类与类噻嗪类利尿药可升高的项目是

A: 血钠

B: 血钾

C: 血氯

D: 血氨

答案：D

49.（2020年真题）消化道溃疡和胃肠道出血高风险患者可以选用，但禁用于有心肌梗死病史患者的药物是

A：塞来昔布

B：吲哚美辛

C：对乙酰氨基酚

D：阿司匹林

答案：A

50.关于地芬诺酯的叙述，不正确的是()

A：长期应用可产生依赖性

B：可吸附肠内的细菌及有毒气体

C：能提高肠张力，减少肠蠕动

D：用于急、慢性功能性腹泻

答案：B

51.口服吸收少，用于肠道感染的是

A：呋喃唑酮

B：磺胺嘧啶

C：甲氧苄啶

D：氧氟沙星

答案：A

52.下列药物中属于缩瞳药的是

A：噻吗洛尔

B：拉坦前列素

C：毛果芸香碱

D：阿托品

答案：C

53.（2017年真题）降低同型半胱氨酸水平的是（）

A: 泛酸钙

B: 叶酸

C: 维生素B2

D: 烟酸

答案：B

54.男性，70岁，进食后饱胀不适伴反酸5年余，黑便1天。胃镜检查提示：胃多发性溃疡(A1期)伴出血。13C呼气试验：Hp(+)。患者既往有高血压病史8年，口服替米沙坦、美托洛尔及硝苯地平控制血压。医嘱：0．9%氯化钠注射液100ml+注射用埃索美拉唑钠40mg，静脉滴注，2次／日；阿莫西林胶囊1g，口服，2次／日；克拉霉素缓释胶囊0．5g，口服，2次／日；注射用蛇毒血凝酶1U，静脉滴注，1次／日；替米沙坦40mg，15服，1次／日；硝苯地平缓释片30mg，口服，1次／日；美托洛尔12．5mg，口服，2次／日；胶体果胶铋胶囊100mg，口服，3次／日。

A: 胶体果胶铋胶囊

B: 美托洛尔

C: 替米沙坦

D: 埃索美拉唑钠

答案：A

55.治疗期间避免献血的药物

A: 阿达帕林

B: 壬二酸

C: 维A酸

D: 异维A酸

答案：D

56.属于噻唑烷二酮类胰岛素增敏剂的是

A：格列美脲

B：罗格列酮

C：沙格列汀

D：瑞格列奈

答案：B

57.应用强心苷期间或停用后7日内不宜使用的药物是

A：氯化钾

B：氯化钙

C：氯化钠

D：枸橼酸钾

答案：B

58.冠状动脉支架置入术前一日起开始口服阿司匹林，剂量为每日

A：75～150mg

B：10～25mg

C：150～300mg

D：25～50mg

答案：D

59.促进大脑对磷脂和氨基酸的利用，增加蛋白质合成，改善脑缺氧和脑损伤的是

A：吡拉西坦

B：多奈哌齐

C：胞磷胆碱钠

D: 银杏叶提取物

答案：A

60.使用痤疮治疗药物不会出现

A: 眼周局部刺激

B: 皮肤色素沉着

C: 肝脏氨基转移酶AST降低

D: 红斑

答案：C

61.属于阿片受体激动剂，晚期癌痛不宜长期使用的药物是

A: 吗啡

B: 秋水仙碱

C: 哌替啶

D: 布洛芬

答案：C

62.急性心肌梗死引起的室性心律失常的首选药是()

A: 奎尼丁

B: 胺碘酮

C: 利多卡因

D: 普萘洛尔

答案：C

63.阿昔洛韦的作用靶点是

A: 神经氨酸酶

B: 脱氧核糖核酸聚合酶

C: HIV-1反转录酶

D: HIV-1和HIV-2蛋白酶

答案：B

64.维生素A的适应证不包括

A: 夜盲症

B: 角膜软化

C: 干眼病

D: 甲状旁腺功能不全引起的低钙血症

答案：D

65.氟尿嘧啶、卡培他滨属于()

A: 胸腺核苷合成酶抑制剂

B: 二氢叶酸还原酶抑制剂

C: DNA多聚酶抑制剂

D: 核苷酸还原酶抑制剂

答案：A

66.（2017年真题）可杀灭疥虫的药物是（）

A: 甲苯达唑

B: 林旦

C: 阿苯达唑

D: 维A酸

答案：B

67.下列属于非选择性β受体阻断药的是()

A: 比索洛尔

B: 美托洛尔

C: 阿替洛尔

D: 普萘洛尔

答案：D

68.以多酶或辅酶形式参与体内新陈代谢及重要的生化反应的是

A: 脂肪乳

B: 葡萄糖

C: 维生素

D: 果糖

答案：C

69.长期使用可使血钾水平升高的药品是

A: 氨苯蝶啶

B: 乙酰唑胺

C: 吲达帕胺

D: 呋塞米

答案：A

70.与促皮质激素合用，能促进尿钾排泄，降低钾盐疗效的是

A: 枸橼酸钾

B: 氯化钾

C: 氯化钙

D: 氯化钠

答案：B

71.氟喹诺酮类

A: 禁用于早产儿、新生儿

B: 禁用于胆道阻塞患者

C: 禁用于8岁以下儿童

D：禁用于18岁以下儿童及青少年

答案：D

72.（2017年真题）口角炎可以使用的治疗药物是（）

A：维生素A

B：维生素D

C：维生素B2

D：维生素B1

答案：C

73.仅作为吸入给药的平喘药是()

A：特布他林

B：沙美特罗

C：布地奈德

D：沙丁胺醇

答案：B

74.（2020年真题）在体内主要经CYP3A4代谢的质子泵抑制剂是

A：兰索拉唑

B：米索前列醇

C：铝碳酸镁

D：枸橼酸铋钾

答案：A

75.对铜绿假单胞菌无效的氟喹诺酮类药是

A：甲氧苄啶

B：磺胺嘧啶

C：呋喃唑酮

D: 氧氟沙星

答案：D

76.属于孕激素类的是

A: 己烯雌酚

B: 睾酮

C: 他莫昔芬

D: 甲地孕酮

答案：D

77.属于雌激素类退乳药的是()

A: 他莫昔芬

B: 甲羟孕酮

C: 睾酮

D: 己烯雌酚

答案：D

78.吡喹酮的抗虫作用首选用于

A: 丝虫

B: 蛔虫

C: 血吸虫

D: 牛肉绦虫

答案：C

79.不宜应用喹诺酮类药物的人群是

A: 溃疡病患者

B: 老年人

C: 婴幼儿

D：肝病患者

答案：C

80.氯吡格雷应避免与奥美拉唑联合应用，因为两者竞争共同的肝药酶，该肝药酶是()。

A：CYP2C19

B：CYP286

C：CYP2E1

D：CYP2D6

答案：A

81.抑制真菌中由细胞色素P450介导的14a一甾醇去甲基化，从而抑制真菌细胞膜主要固醇类——麦角固醇的生物合成，损伤真菌细胞膜并改变其通透性，以致细胞内重要物质摄取受影响或流失而使真菌死亡的是

A：万古霉素

B：伊曲康唑

C：两性霉素

D：氟胞嘧啶

答案：B

82.临床主要用于耐药金黄色葡萄球菌的糖肽类抗菌药物是

A：红霉素

B：克拉霉素

C：罗红霉素

D：万古霉素

答案：D

83.大剂量具有抗雄激素作用,可用于子内膜癌或肾癌的药物是

A：屈螺酮

B：地屈孕酮

C：甲羟孕酮

D：环丙孕酮

答案：D

84.（2019年真题）服用后易出现呃逆、腹胀和嗳气，甚至引起反跳性胃酸分泌增加的药物是（）

A：替普瑞酮

B：复方碳酸钙

C：奥美拉唑

D：胶体果胶铋

答案：B

85.（2021年真题）用于验光配镜屈光度检查前散瞳的药物是（）

A：硫酸阿托品眼用凝胶

B：毛果芸香碱滴眼液

C：聚乙二醇滴眼液

D：雷珠单抗注射液

答案：A

86.氯沙坦的降压作用机制是

A：阻断AT2受体

B：阻断 α 受体

C：阻断 β 受体

D：阻断AT1受体

答案：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/965313324122012033