

## 第 06 篇外科护理学复习题 1

### 外科护理学复习题 1

1.高渗性缺水病人，下列病理改变中哪一项是错误的 B

A.口渴 B. 抗利尿激素分泌减少 C.细胞内水外移 D.醛固酮分泌增加 E.尿浓缩

2.低渗性脱水的特点，下列哪项是错误的 D

A.失钠的比例大于失水  
B.血清钠低于 130mmol/L  
C.易发生休克  
D.尿比重高、烦渴  
E.严重者发生惊厥和昏迷

3.代谢性酸中毒病人的典型临床表现是 B

A.面色潮红  
B.呼吸深而快  
C.心率加快  
D.血压下降  
E.嗜睡

4.肠内营养的严重并发症是 B

A.肠道功能紊乱  
B.误吸  
C.高血糖  
D.补水不足  
E.低血糖

5.休克病人，提示病情好转的表现是 D

A.神志由兴奋转为抑制  
B.脉搏加快  
C.脉压减小  
D.尿量 > 30ml/h  
E.肢体皮肤湿冷

6.ARDS 病人主要特征性的临床表现是 E

- A.呼吸音减弱
- B.肺部湿啰音
- C.胸部 X 线改变
- D.动脉氧分压降低
- E.进行性呼吸困难

7.抢救心跳呼吸骤停患儿首要的措施是 D

- A.口对口人工呼吸
- B.胸外心脏按压
- C.注射复苏药
- D.通畅呼吸道
- E.电除颤

8.心脏复苏首选药物是 A

- A.肾上腺素
- B.阿托品
- C.利多卡因
- D.碳酸氢钠
- E.糖皮质激素

9.属于限期手术的疾病是 C

- A.重症胆管炎
- B.急性肠套叠
- C.胰腺癌
- D.甲状腺腺瘤
- E.外伤性肝破裂

10.手术护士与巡回护士应共同完成的工作为 D

- A.术中观察病情
- B.传递器械
- C.安置手术体位
- D.体腔切开与关闭之前清点器械敷料
- E.术后清洗器械

11. 面部“危险三角区”疖的危险性在于 B

- A.易引起眼球后感染
- B.易引起颅内海绵窦炎
- C.易形成败血症
- D.易形成痈
- E.易扩散为急性蜂窝组织炎

12. 确诊菌血症的最可靠的依据是 A

- A.寒战高热,热型呈稽留热
- B.皮下出现淤点
- C.肝、脾肿大及黄疸
- D.血培养阳性
- E.出现休克

13. 破伤风发病时，最先出现的症状是 E

- A.苦笑面容
- B.颈项强直
- C.角弓反张
- D.上肢屈曲，下肢挺直
- E.牙关紧闭，开口困难

14. 在车祸现场，应先抢救的伤员是 A

- A.脑挫伤
- B.张力性气胸
- C.脊柱骨折
- D.孔
- E.肩关节脱位

15. 确诊肿瘤最可靠的检查是 C

- A.B 超
- B.X 光
- C.病理
- D.内镜
- E.核素扫描

16. 放疗病人的皮肤护理措施不正确的是 D

- A. 局部皮肤保持干燥
- B. 切忌用肥皂、粗毛巾擦拭
- C. 防止阳光直射
- D. 照射部位常规涂乙醇
- E. 告知病人穿宽松柔软、吸湿性强的内衣

17. 颅内压增高的最终恶性结果是 E

- A. 头痛
- B. 休克
- C. 癫痫
- D. 昏迷
- E. 脑疝

18. 颅内高压三主征是 A

- A. 头痛、呕吐、视神经乳头水肿
- B. 呕吐、视神经乳头水肿、抽搐
- C. 视神经乳头水肿、抽搐、昏迷
- D. 抽搐、昏迷、头痛
- E. 昏迷、头痛、呕吐

19. 颅脑损伤病人的卧位取抬高床头  $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$  角的目的是 B

- A. 预防呕吐性窒息
- B. 减轻脑水肿
- C. 病员舒适
- D. 有利于呼吸道通畅
- E. 减轻头痛

20. 对于凹陷深度超过 1cm 的颅盖骨骨折的处理应采取 C

- A. 不做任何处理
- B. 严密观察病情变化
- C. 尽早手术恢复
- D. 脱水疗法
- E. 应用防癫痫药物

21. 颅前窝骨折可损伤 A

- A. 嗅神经
- B. 动眼神经
- C. 听神经
- D. 滑车神经
- E. 面神经

22. 诊断颅底骨折最可靠的临床表现是 C

- A. 意识障碍
- B. 头皮下血肿
- C. 脑脊液漏
- D. 颅底骨凹陷
- E. 血性脑

23. 颅脑损伤病人出现下列哪种征象应立即做好手术前准备 E

- A. 血压升高，脉压变大
- B. 呼吸深而慢
- C. 脑膜刺激征
- D. 血性脑脊液
- E. 一侧瞳孔进行性散大，对侧肢体瘫痪

24. 甲状腺大部分切除术后最危急的并发症是 E

- A. 误咽
- B. 声音嘶哑
- C. 手足抽搐
- D. 甲状腺危象
- E. 呼吸困难和窒息

25. 乳房淋巴液输出的最主要途径是 B

- A. 经肋间淋巴管→胸骨旁淋巴结
- B. 经胸大肌外缘淋巴管→腋窝淋巴结
- C. 经胸大、小肌间淋巴结→锁骨下淋巴结
- D. 经皮下交通网→对侧
- E. 经深部淋巴网→肝脏

26. 急性乳房炎最常见的病因是 A

- A.乳汁瘀积
- B.雄激素分泌增加
- C.雌性激素分泌增加
- D.卵巢内分泌功能失调
- E.家族遗传

27. 张力性气胸的成因是 D

- A.形成了血气胸
- B.破裂口自动闭会
- C.肺大泡破裂出血
- D.破裂口呈单向活瓣
- E.破裂口较大而持续开放

28. 排气时胸腔闭式引流管常放置于 D

- A.腋中线第七肋间
- B.腋中线第八肋间
- C.腋后线第七肋间
- D.锁骨中线第二肋间
- E.锁骨中线第五肋间

29. 肺癌早期常见症状为 A

- A.刺激性干咳
- B.声音嘶哑
- C.颈静脉怒张
- D.胸腔积液
- E.上肢水肿

30. 胸部手术后的护理错误是 E

- A.常规吸氧
- B.用抗生素防治感染
- C.病人取半卧位
- D.鼓励病人深呼吸
- E.大量快速输液

31. 疝修补术后切口部位放置沙袋的主要作用是 D

- A.减轻切口疼痛
- B.减少切口张力
- C.固定伤口敷料
- D.防止伤口出血
- E.防止切口裂开

32. 腹腔内脏损伤时，X 线检查不会出现膈下游离气体的是 B

- A.十二指肠破裂
- B.肝破裂
- C.胃破裂
- D.小肠破裂
- E.结肠破裂

33. 诊断腹腔内实质脏器破裂的主要依据是 D

- A.腹肌紧张
- B.腹式呼吸消失
- C.X 线片示结肠充气影
- D.腹腔穿刺抽出不凝血
- E.腹腔 B 超示腹腔积液

34. 肠痿最常见的电解质紊乱是 A

- A.低钾、低钠
- B.低钾、高钠
- C.高钾、低钠
- D.低钾、钠正常
- E.高钾、高钠

35. 下列关于痔的说法错误的是 D

- A.痔是肛管或直肠下端静脉扩张、迂曲而形成的静脉团
- B.齿状线是却别内、外痔的主要标志
- C.混合痔具有内、外痔的症状和体征
- D.内痔出现静脉破裂可引起剧烈疼痛
- E.外痔在没有发生血栓以前一般不会出现剧烈疼痛

36. 门静脉高压症病人分流术的最主要缺点是 D

- A. 手术难度大
- B. 易发生血栓
- C. 不能减轻腹水
- D. 易诱发肝性脑病
- E. 不能纠正脾功能亢进

37. 肝脏手术后最严重的并发症是 B

- A. 出血
- B. 腹腔感染
- C. 胆汁性腹膜炎
- D. 肠系膜血管血栓形成
- E. 腹水

38. 胰腺癌最常见的首发症状是 A

- A. 上腹部胀痛不适
- B. 黄疸
- C. 消瘦和乏力
- D. 腹泻、恶心、呕吐
- E. 发热

39. 血栓闭塞性脉管炎错误的护理是 B

- A. 戒烟
- B. 注意肢体保暖，寒冷时可用热水袋局部加温
- C. 湿性坏死创面宜加强换药
- D. 避免外伤
- E. 指导病人进行 **Buerger** 运动，促进侧肢循环建立

40. 尿道损伤后最易造成的并发症是 B

- A. 尿瘘
- B. 尿道狭窄
- C. 慢性尿道周围脓肿
- D. 尿失禁
- E. 阳痿或阴茎萎缩

41. 泌尿系排石疗法中最重要的护理是 B

- A.防治感染
- B.多饮水、适当运动
- C.注射哌替啶、阿托品
- D.碱化尿液或酸化尿液
- E.药物治疗

42. 肾癌血尿的特点是 C

- A.无痛持续性全血尿
- B.无痛持续性终末血尿
- C.无痛间歇性全血尿
- D.无痛间歇性终末血尿
- E.绞痛、血尿

43. 骨折中期功能锻炼指 D

- A.卧床不动
- B.以患肢肌肉舒缩活动为主
- C.以骨折处远、近侧关节活动为主，活动范围逐渐扩大
- D.重点关节为主的全面功能锻炼
- E.参加重体力劳动

44. 骨折病人转运前重要的措施是 C

- A.手法复位
- B.止痛
- C.固定伤肢
- D.保持患肢功能位
- E.抬高或悬吊患肢

45. 戴女士，67岁，因急性肾功能衰竭入院治疗，尿量200ml/24h，今出现呼吸困难，头痛，四肢无力、心律不齐、心动过缓，腹胀，应考虑 A

- A.高钾血症
- B.低钾血症
- C.水中毒

## 酸中毒

### E.尿毒症

46. 赵先生，25 岁，因高热 2 日未能进食，自述口渴、口干、尿少色黄。查体：口干舌燥，皮肤弹性差，眼窝凹陷。实验室检查：尿比重 1.028，血清钠浓度为 155mmol/L。考虑病人出现 D

### A.等渗性脱水

### B.低渗性脱水

### C.轻度高渗性脱水

### D.中度高渗性脱水

### E.重度高渗性脱水

47. 许先生，40 岁。因肠梗阻 4 日入院，血压 62 / 45mmHg，血钠 122mmol / L，血钾 3mmol / L，C02CPl8mmol / L。处理时首先考虑 D

### A.纠正酸中毒

### B.补充钾盐

### C.急诊手术

### D.补充血容量

### E.给予升压药

48. 蒋先生，30 岁。外伤后 1 天，病人表现为表情淡漠，皮肤发绀，脉率 104 次/分，血压

9.33/6.67kPa(70/50mmHg)，中心静脉压低于 50mmH2O，该病人目前属于以下哪种情况 B

### A.休克早期

### B.休克期

### C.休克晚期

### D.酸中毒

### E.碱中毒

49. 王先生，70 岁。上腹部隐痛 1 年，近 1 个月加重，且疼痛规律改变，精神状态差，消瘦明显，经胃镜检查确诊为胃癌，将于近日择期行胃癌根治术。术前准备中不妥的一项是 C

术前 1~2 周禁止吸烟

B.术前 1~2 日进流质

C.术前 3 日起每晚温盐水洗胃

D.术前晚灌肠

E.积极纠正营养不良

50. 李先生，60 岁。因绞窄性肠梗阻行坏死小肠切除术。术后 8 日拆线，当日，打喷嚏时，突然感觉伤口有液体流出，检查可见伤口敷料被红色液体浸湿，皮肤缝线完整，伤口有 1cm 长裂隙，未发现有内脏脱出。应考虑 B

A.切口感染

B.切口部分裂开

C.切口完全裂开

D.切口缝线反应

E.切口脂肪液化

51. 董先生，50 岁。阑尾切除术后 5 天，伤口红肿，触之有波动感，穿刺抽到脓液，其最佳处理是 D

A.用依沙吖啶纱布换药

B.局部理疗

C.全身应用抗生素

D.拆去缝线，伤口敞开引流

E.以上都不

是

52. 马先生，36 岁，昨天在硬膜外麻醉下行疝修补术，体温 38℃，脉搏 88 次/分，最可能的是 D

A.肺部感染

B.泌尿道感染

C.伤口感染

D.吸收热

E.腹腔感染

53. 你作为某台手术的器械护士，负责监督执行无菌操作技术，下

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/966105150204011013>