

考试备考资料

(习题试卷、考点)

药理学复习题含答案

1、下列何种降血糖药易引起乳酸血症

- A、正规胰岛素
- B、阿卡波糖
- C、格列本脲
- D、甲苯磺丁脲
- E、苯乙福明

答案：E

2、肾上腺素与局部麻药配伍的目的是

- A、防止过敏性休克
- B、增强中枢镇静作用
- C、局部血管收缩, 促进止血
- D、延长局麻药作用时间及防止药物吸收中毒
- E、防止出现低血压

答案：D

3、胃肠道不良反应较轻的退热止痛有效

- A、扑热息痛
- B、保泰松
- C、羟基保泰松
- D、消炎痛
- E、阿司匹林

答案：A

4、高血压伴有肾功能不全者宜选用

- A、卡托普利
- B、美加明
- C、利血平
- D、普萘洛尔
- E、胍乙啶

答案：A

5、下列有关药物依赖性的叙述, 错误的是

- A、精神依赖性又称心理依赖性
- B、分为躯体依赖性和精神依赖性
- C、绝大多数具有依赖性的药物同时兼有精神依赖性和躯体依赖性
- D、躯体依赖性又称心理依赖性
- E、一旦产生躯体依赖性, 中断用药将产生戒断症状

答案: D

6、氢氯噻嗪的不良反应是:

- A、水和电解质紊乱
- B、低血糖血症
- C、耳毒性
- D、钾潴留
- E、胃肠道反应

答案: A

7、具有降眼内压作用的 β 受体阻断药是

- A、美托洛尔
- B、阿替洛尔
- C、普萘洛尔
- D、噻吗洛尔
- E、拉贝洛尔

答案: D

8、大环内酯类药物对下列哪种细菌无效

- A、肺炎球菌
- B、流感杆菌
- C、大肠杆菌
- D、军团菌
- E、结核杆菌

答案: C

9、关于新斯的明的叙述, 错误的是

- A、对骨骼肌的兴奋作用很强
- B、为难逆性胆碱酯酶抑制药
- C、可用于术后腹胀气和尿潴留
- D、不易透过角膜, 对眼的作用很弱
- E、禁用于支气管哮喘患者

答案: B

10、激动突触前膜 α_2 受体可引起

- A、瞳孔扩大
- B、血压升高
- C、肾上腺素释放增加
- D、去甲肾上腺素释放减少
- E、支气管平滑肌收缩

答案: D

11、血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)的特点为

- A、可用于各型高血压.有反射性心率加快
- B、对肾脏无保护作用
- C、可防治高血压患者心肌细胞肥大
- D、长期用药易引起电解质紊乱
- E、对高血压患者的血管壁增厚无防治作用

答案: C

12、毛果芸香碱临床作用于

- A、腹气胀
- B、尿潴留
- C、重症肌无力
- D、青光眼
- E、心动过缓

答案: D

13、下列 β 受体阻断药中哪个兼有 α 受体阻断作用

- A、普萘洛尔
- B、美托洛尔
- C、拉贝洛尔
- D、噻吗洛尔
- E、吲哚洛尔

答案: C

14、对阻断 H_2 受体具有阻断作用的药物是

- A、哌仑西平
- B、雷尼替丁
- C、丙谷胺
- D、甲硝唑
- E、奥美拉唑

答案: B

15、对氨基糖苷类不敏感的细菌是

- A、各种厌氧菌
- B、肠杆菌
- C、革兰阴性球菌
- D、金黄色葡萄球菌
- E、铜绿假单胞菌

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/966134243200010141>