2024海南省澄迈县《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必背200题真题（研优卷）

第Ⅰ部分 单选题（100题）

1.提示"噻托溴铵粉吸入剂所附胶囊需放到吸入装置内刺破吸入，不能直接吞服"，是针对

A：药品有效期

B：特殊剂型用法

C：特殊装置药品

D：药品贮存

答案：C

2.患者，男，60岁，从晨起后收缩压和舒张压迅速升高，在上午9～10时达到高峰，而晚上开始降低，于睡眠时降至低谷。那么该患者应用降压药时，关于用药时间的说法，正确的是

A：一般每日仅服一次长效抗高血压药如氨氯地平等且以清晨7时左右为最佳服用时间

B：一般每日晚上睡前服抗高血压药，服用培哚普利、氨氯地平、左旋氨氯地平等

C：一般每日需要服用长效抗高血压药如氨氯地平等2次，早、晚各一次最好

D：一般每日仅服一次长效抗高血压药如氨氯地平等且以晚上7时左右为最佳服用时间

答案：A

3.服用华法林期间应进行监测的指标是()

A：ALT

B：INR

C：RBC

D：APTT

答案：B

4.（2015年真题）患儿，女，4岁半，身高110cm，体重15kg，一天前开始发热（39.1℃），咽稍痛，无咳嗽，无吐泻，家长在家选用退烧药对症治疗。发热20h左右出现腹泻，约2～3h一次大便，量少，黄色粘液便，呕吐1次。体格检查，T38.8℃，P118次/分，R28次/分，咽微充血。出现轻微脱水症状。双肺呼吸音清，腹平软，肝脾未触及，肠鸣音活跃。实验室检查：WBC18.5×109/L（参考值4.0×109～10.0×109），粪便镜检可见红、白细胞。

A：药用炭

B：洛哌丁胺

C：小檗碱

D：鞣酸蛋白

答案：B

5.控制癫痫持续状态应首选

A：口服硫酸镁

B：肌内注射地西泮

C：静脉注射丙戊酸钠

D：静脉注射地西泮

答案：D

6.通过渗入LDL颗粒核心中，影响脂蛋白代谢，尤其用于纯合子型家族性高胆固醇血症及黄色瘤患者的是（）

A：他汀类

B：依折麦布

C：普罗布考

D：烟酸类

答案：C

7.采用锐器或指甲划过皮肤后，沿着划痕发生条状淡红色隆起，伴有瘙痒，常并发荨麻疹

A：热性荨麻疹

B：人工荨麻疹

C：幼小荨麻疹

D：冷性荨麻疹

答案：B

8.真菌引起的阴道炎宜选用

A：聚甲酚磺醛

B：咪康唑

C：甲硝唑

D：庆大霉素

答案：B

9.药物警戒信号通过评价后，将事前检出的信号归类，提示有潜在的风险，需要继续密切监测的信号属于

A：部分确认的信号

B：确认的信号

C：尚不确定的信号

D: 驳倒的信号

答案：C

10.可引起胎儿肢体、耳、内脏畸形的药物是

A: 沙利度胺

B: 叶酸拮抗剂

C: 苯巴比妥

D: 雌激素、孕激素、雄激素

答案：A

11.长期服用可导致或加重胃溃疡的药物是

A: NSAID

B: 抗酸剂

C: 米索前列醇

D: 质子泵抑制剂

答案：A

12.患者，男，57岁,因出现全身酸痛、乏力、高热等症状就诊，经流行病学调查及相关实验室检查，诊断为H1N1甲型流感。该患者可选用的神经氨酸酶抑制剂是()

A: 奥司他韦

B: 金刚烷胺

C: 利巴韦林

D: 金刚乙胺

答案：A

13.双侧肾动脉狭窄、高钾血症

A: α受体阻断剂

B: 普萘洛尔
C: 卡托普利
D: 氢氯噻嗪
答案：C

14.可加重损伤精神运动功能的是
A: 氯苯那敏
B: H
C: 地西泮
D: 异丙嗪
答案：C

15.如发现“仙牛健骨颗粒”III期临床试验过程连续发生严重不良事件，确认后暂停其试验
A: 药品上市后风险评估
B: 药品上市前风险评估
C: 发现药品质量问题
D: 发现与规避假、劣药流入市场
答案：B

16.静脉滴注过程中药液必须避光的药物是
A: 培氟沙星
B: 两性霉素B
C: 青霉素
D: 万古霉素
答案：A

17.严重烧伤患者尿常规检查可发现

A: 尿葡萄糖阳性
B: 尿淀粉酶增高
C: 尿胆红素阳性
D: 尿血红蛋白阳性
答案：D

18.膀胱炎占尿路感染的60%以上，致病菌多为
A: 淋病奈瑟菌
B: 大肠埃希菌
C: 金黄色葡萄球菌
D: 白假丝酵母菌
答案：B

19.心力衰竭伴心绞痛应首选的药物是
A: 氨氯地平
B: 美托洛尔
C: 单硝酸异山梨酯
D: 硝酸甘油
答案：B

20.食入何种物质对抗高血压药有影响
A: 食盐
B: 脂肪
C: 食醋
D: 蛋白质
答案：A

21.根据血红蛋白含量评估缺铁性贫血程度中度贫血为

A：60～90g／L

B：90～120g／L

C：120～160g／L

D：30～60g／L

答案：A

22.患者，男，56岁，因高血压常年服用苯磺酸氨氯地平10mgqd，近期体检血脂指标为LDL—C4.8mmol／L，药师应建议患者加服

A：阿托伐他汀

B：叶酸

C：二甲双胍

D：福辛普利

答案：A

23.#NAME?

A：#NAME?

B：#NAME?

C：#NAME?

D：#NAME?

答案：D

24.以下解救中毒措施中，正确的药物拮抗是

A：口服氯化铵促使苯丙胺排泄

B：阿托品拮抗颠茄碱类中毒

C：依地酸钙钠可"驱铅"

D：二巯丙醇拮抗青霉胺

答案：C

25.须在冷处保存，且避免冻结的常用药品是
A：双歧三联活菌制剂
B：硫酸阿托品
C：多巴胺
D：复方甘草合剂
答案：A

26.下列有关焦虑症的叙述，错误的是
A：焦虑症有家族聚集性，女性焦虑症的患病率较高
B：惊恐发作是焦虑症最常见的表现形式
C：大多数焦虑症起源于儿童或者青春期
D：社交焦虑障碍严重者可表现为回避社交，导致社交隔离
答案：B

27.作为女性便秘型肠易激综合征者缓解症状的短期治疗药物是
A：替加色罗
B：乳果糖
C：洛哌丁胺
D：聚乙二醇粉
答案：A

28.用药剂量相同，妊娠期的血药浓度低于非妊娠期，是由于
A：血容量增加使血浆清蛋白浓度降低
B：妊娠晚期血流动力学发生改变较多
C：胃肠活动程度减弱，使吸收减慢
D：妊娠期药物分布容积明显增加
答案：D

29.美金刚的作用机制为（）

A：抑制N-甲基天冬氨酸受体

B：脑循环改善剂

C：钙通道阻滞剂

D：抑制胆碱酯酶

答案：A

30.（2015年真题）患者，男，64岁，身高174cm，体重92kg。既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，临床处方，阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

A：患者使用抗血小板聚集药物时，应注意预防出血

B：出现弥漫性肌痛或乏力，同时伴全身不适时，应及时就医

C：应注意监护血压变化，防止血压过度降低

D：单硝酸异山梨酯能扩张血管引起头痛，即使可耐受也必须停药

答案：D

31.患者突发心前区压榨性疼痛,立即取出硝酸甘油片,正确的使用方法是()

A：清晨服用

B：舌下含服

C：用温水调服

D：应同时碱化尿液

答案：B

32.长期大量应用容易导致体重明显增加的是

A：盐酸异丙嗪

B：色甘酸钠

C：酮替芬

D：氯雷他定

答案：C

33.与阿米卡星合用会影响其排泄导致急性肾损害的药物是()

A：伏立康唑

B：铝碳酸镁

C：维生素B

D：阿司匹林

答案：D

34.应提示患者，该附带的胶囊需放到吸入装置内刺破吸入，而不能直接吞服胶囊

A：利福平滴眼剂

B：复方甲硝唑栓

C：噻托溴铵粉吸入剂

D：胰岛素笔

答案：C

35.治疗抗肿瘤药引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药物是

A：奥美拉唑

B：昂丹司琼

C：维生素B6

D：雷尼替丁

答案：B

36.尿失禁治疗的首要处理原则是

A：进行行为治疗

B: 药物治疗

C: 调整生活方式

D: 除去诱因和针对原发病进行治疗

答案：D

37.不宜与蛋白质食物合用的药物是

A: 磺胺类药物

B: 硫酸亚铁

C: 左旋多巴

D: 辛伐他汀

答案：C

38.药库管理人员根据药品用量和库存情况提出购药计划，向指定的药品经营单位采购，必须持有

A: 防盗设施

B: 基数卡

C: 印鉴卡

D: 五专管理

答案：C

39.药师应及时向患者交待有关用药的注意事项，以避免误用药物，减轻患者不必要的恐慌，提高用药依从性。根据患者用药情况，发药时药师应有针对性的提示患者各类药物的应用注意事项。

A: 患者一?

B: 患者三?

C: 患者四?

D: 患者二?

答案：B

40.可造成肝脏损害，形成肝硬化或脂肪肝，减弱对药物的代谢速度的是

A: 酒中的乙醇

B: 茶叶中的鞣酸

C: 食盐中的氯化钠

D: 食醋中的醋酸

答案：A

41.服后不宜立刻饮水，以免冲淡药物

A: 胶囊剂

B: 糖浆剂

C: 包衣片

D: 粉剂

答案：B

42.用于循证医学评价证据强弱分级的是()

A: CLHD公式

B: CoCkroft-GAut公式

C: CoChrAnE分级

D: NCEMERP标准

答案：C

43.药物相互作用是双向的，既可能产生对患者有益的结果，使疗效协同或毒性降低；也可能产生对患者有害的结果，使疗效降低和毒性增强，有时会带来严重后果，甚至危及生命。

A: 阿托品联用普萘洛尔

B: 阿托品联用吗啡

C：铁剂联用维生素

D：山莨菪碱联用哌替啶

答案：D

44.老年痴呆症选用

A：丙戊酸钠

B：布桂嗪

C：佐匹克隆

D：多奈哌齐

答案：D

45.口服用于肠道感染或肠道手术前准备的药物是

A：妥布霉素

B：庆大霉素

C：新霉素

D：异烟肼

答案：B

46.口服氯化铵用于解救的是（）

A：瘦肉精中毒

B：苯丙胺中毒

C：氯丙嗪中毒

D：硝西泮中毒

答案：B

47.（2017年真题）高血压治疗药物选择时,ACEI类药物禁用于（）

A：心力衰竭患者

B：痛风患者

C: 胃溃疡患者

D: 双侧肾动脉狭窄患者

答案：D

48.在与患者进行沟通的过程中，切忌的事项是

A: 认真聆听

B: 可提供一些宣传资料

C: 尽量提供更多的信息

D: 尽量避免使用专业术语

答案：C

49.单侧头痛伴光敏感、恶心、呕吐提示

A: 脑膜炎

B: 脑血管意外

C: 脑肿瘤

D: 偏头痛

答案：D

50.患者，男，36岁。临床诊断“大三阳”，其临床意义是

A: HBsAg阳性

B: HBsAg、HBeAb和HBcAb同为阳性

C: HBsAg、HBeAg和HBcAb同为阳性

D: HBeAg阳性

答案：C

51.下列药物属于容积性泻药的是

A: 多库酯

B: 欧车前

C: 聚乙二醇

D: 乳果糖

答案：B

52.属于胃食管反流病的食管外症状的是（）（消化性溃疡病的治疗）

A: 上腹部烧灼感

B: 反流

C: 烧心

D: 哮喘

答案：D

53.某男性患者，57岁，既往高血压病史10年，与儿子吵架后突然起病，言语不清，左侧肢体无力，意识不清，查体：BP220/120mmHg，中度昏迷，瞳孔不等大，对光反射消失，强痛刺激，左侧肢体不活动，左侧巴宾斯基征阳性。

A: 脱水

B: 扩容

C: 降血压

D: 止血

答案：A

54.服用胃动力药多潘立酮治疗消化不良，最佳用药时间是

A: 餐前

B: 餐前0.5～1小时

C: 餐后

D: 餐后1小时

答案：B

55.患者术后，给予肠外营养液10%GS500ml、50%GS250ml、20%脂肪乳250ml、8．5%复方氨基酸750ml、水溶性维生素10ml、脂溶性维生素10ml、微量元素10ml、10%氯化钠注射液40ml、10%氯化钾注射液30ml

A: 1150kcal

B: 200kcal

C: 450kcal

D: 700kcal

答案：D

56.给幼儿患者选用糖浆、水剂、冲剂等较合适，体现儿童用药原则中的

A: 根据儿童特点选择适宜的给药方案

B: 避免食物的影响

C: 严格掌握用药剂量

D: 密切监护

答案：A

57.硝酸异山梨酯的别名是

A: 消心痛

B: 心痛定

C: 心得安

D: 安痛定

答案：A

58.处方用药须与临床诊断密切相符，医师开具的处方在病情与诊断栏中应明确记录对患者的临床诊断。药师应审查处方用药与临床诊断的相符性，以加强合理用药监控。

A: 忽略药品说明书的提示用药
B: 美扑伪麻片用于伴有青光眼的感冒患者
C: 病因未明而应用两种以上的药物
D: 滥用糖皮质激素、人血白蛋白
答案：D

59.患者，女，58岁，因慢性阻塞性肺疾病住院1个月，近5天来出现高热、咳痰，伴呼吸困难。实验室检查血肌酐及尿素氮值正常，白细胞计数为12×10
A: 克林霉素
B: 甲氧西林
C: 头孢唑林
D: 万古霉素
答案：D

60.KDIGO推荐的CKD分期方法主要依据指标是
A: 肌酐清除率（CrCl）
B: 尿微量白蛋白肌酐比值（ACR）
C: 肾小球滤过率（GFR）
D: 尿微量白蛋白排泄率（AER）
答案：C

61.急性化脓性中耳炎局部治疗，鼓膜穿孔前可使用
A: 3%过氧化氢溶液
B: 2%过氧化氢溶液
C: 2%酚甘油滴耳液
D: 3%酚甘油滴耳液
答案：C

62.治疗时需长期口服维生素D
A：抗癫痫药所致的骨质疏松
B：原发性骨质疏松
C：妇女绝经后骨质疏松
D：老年性骨质疏松
答案：A

63.阿托品联用氯解磷定解救有机磷重度中毒的机制是
A：延缓或降低抗药性
B：促进机体的利用
C：作用于不同的靶点
D：竞争性拮抗作用
答案：C

64.（2019年真题）患者，男，60岁，诊断为高血压伴高尿酸血症，首选的药物是
A：美托洛尔
B：氯沙坦
C：维拉帕米
D：螺内酯
答案：B

65.“记录患者用药问题、药学干预内容、药学监测计划”的技能是
A：药历书写技能
B：沟通技能
C：药品警戒技能
D：自主学习能力

答案：A

66.冠状动脉粥样硬化性心脏病患者，如无用药禁忌证，欲服用阿司匹林进行治疗，最佳剂量范围是（）

A: 25～50mg / d

B: 150～300mg / d

C: 25～75mg / d

D: 75～150mg / d

答案：D

67.某女孩，6岁，2个月来反复突发突止的意识障碍，表现为突然动作中断，呆立凝视，呼之不应，手中物体掉落，但从不跌倒，持续数秒钟缓解。

A: 丙戊酸钠

B: 苯妥英钠

C: 地西泮

D: 卡马西平

答案：A

68.患者，男，42岁，近期出现烧心（胃灼热）、咳嗽、胸痛症状，疑似胃食管反流病。可作为胃食管反流病的初步诊断方法是给予1～2周、每日2次标准剂量的

A: 艾司奥美拉唑

B: 西咪替丁

C: 阿司匹林

D: 硝酸甘油

答案：A

69.食管癌患者应用顺铂+氟尿嘧啶+多柔比星+依托泊苷属于
A：超适应证用药
B：过度治疗用药
C：超剂量用药
D：非适应证用药
答案：B

70.已获准可以长期用于治疗失眠的药物为（）
A：艾司唑仑
B：雷美尔通
C：多塞平
D：佐匹克隆
答案：B

71.癌症患者采用伊立替康化疗后出现水样腹泻时，应立即给予
A：洛哌丁胺
B：双歧杆菌
C：小檗碱
D：昂丹司琼
答案：A

72.（2019年真题）合并闭角型青光眼的前列腺增生患者，不宜选用的药物是
A：坦索罗辛
B：托特罗定
C：多沙唑嗪
D：非那雄胺
答案：B

73.患者，男，61岁，查体空腹血糖升高来诊，中等体型，无烟酒等不良嗜好。该患者既往慢性肾炎病史，伴轻中度肾功能不全。

A: 二甲双胍

B: 格列喹酮

C: 格列美脲

D: 胰岛素

答案：D

74.餐前1h服用的药物是

A: 阿托伐他汀

B: 复方氢氧化铝

C: 奥美拉唑

D: 伊托必利

答案：B

75.耳蜗神经损伤及耳毒性

A: 阿奇霉素

B: 庆大霉素

C: 氯霉素

D: 米诺环素

答案：B

76.吸烟后促使儿茶酚胺释放，降低其吸收的药物是

A: 呋塞米

B: 胰岛素

C: 氯丙嗪

D: 西咪替丁

答案：B

77.（2018年真题）患者,女,38岁,已婚,妊娠2个月,近日自觉心慌、多汗,查FT3,FT4偏高TSH0.01mU/L,临床诊断为甲状腺功能亢进症适宜的治疗方案为（）

A: 终止妊娠,选用丙硫氧嘧啶治疗

B: 维持妊娠,选用甲巯咪唑治疗

C: 维持妊娠,行甲状腺切除手术

D: 维持妊娠,选用丙硫氧嘧啶治疗

答案：D

78.连续规律用药2日以上方能充分发挥作用的药品是

A: 非甾体抗炎药

B: 吸入型糖皮质激素

C: 短效β

D: β受体拮抗剂

答案：B

79.（2017年真题）患者到药店购买鱼肝油,药师应给予（）

A: 维生素

B: 维生素AD

C: 维生素A

D: 鱼油

答案：B

80.某患者，诊断为抑郁症，服用帕罗西汀6周，无明显效果，现考虑更换MAOIs类药物，必须先停用帕罗西汀

A: 2周

B: 1周

C: 5天

D: 3天

答案：A

81.脾功能亢进可见的

A: 白细胞增多

B: 白细胞减少

C: 红细胞沉降率减慢

D: 淋巴细胞增多

答案：B

82.归属专业学术机构网站的是

A: www.ashp.org

B: www.googl

C: www.merck.com

D: www.cmt.tom.cn

答案：A

83.（2015年真题）患者，男，体检发现血清尿素氮升高，血肌酐升高，其他生化指标正常，该患者最有可能患有（）。

A: 血液疾病

B: 肝脏疾病

C: 肾脏疾病

D: 心脏疾病

答案：C

84.分解尿酸成为可溶性产物，可诱发抗体生成而使疗效下降，尤其适用于放疗或化疗所致的高尿酸血症的药物是

A：非布司他

B：苯溴马隆

C：枸橼酸氢钾钠

D：拉布立酶

答案：D

85.可用于治疗口腔溃疡，大剂量服用后，尿液可能呈黄色的药物是

A：维生素C

B：维生素A

C：维生素

D：复合维生素B

答案：D

86.大剂量易引起碱血症的抗酸药是

A：西沙必利

B：奥美拉唑

C：碳酸氢钠

D：莫沙必利

答案：C

87.属于胃黏膜保护剂的是（）

A：铝碳酸镁

B：埃索美拉唑

C：多潘立酮

D：法莫替丁

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/966143152054011030