

1. 26 岁女性,婚后 3 年不孕,近 4 年消灭经期腹痛而就诊,妇科检查子宫后倾正常大,宫骶韧带可触及痛性结节,为明确诊断还应询问哪种最常见病症?

A.有无性交痛

D.有无不规章阴道流血

B.有无发热

E.既往有无结核病史

C.痛经有无进展性加重

2. 26 岁, 第一胎, 妊娠36 周,近 5 天消灭全身浮肿,伴头痛,视力模糊,血压 21/15kPa(158/113mmHg),尿蛋白(++),收入院后每日静滴硫酸镁 24 克,在治疗中最早消灭

以下哪一项体征时应马上停药?

A.呼吸减慢

D.膝反射消逝

B.心率减慢

E.全身肌张力减退

C.体温上升

3. 53 岁经产妇,绝经1 年后阴道流血两个月,出血量如月经量,以后时多时少,盆腔检查:宫颈光滑,子宫稍大,双附件正常,首选关心检查是:

A.宫颈涂片检查

D.宫颈活检

B.分段诊刮

E.阴道涂片雌激素水平测定

C.阴道镜检查

4. 30 岁,女性已婚,G P 现宫内孕 20 周,胎儿双顶径 5.2cm, 肝、肾功能及心电图正常尿常规正常,宫颈拭子无细菌生长,拟完毕妊娠收入院,以下哪项方法是

正确的?

A.负压吸宫术

D.缩宫素静滴

B.钳刮术

E.利凡诺羊膜腔内注射引产

C.剖宫取胎

5. 43 岁住院女患,在妇科检查中觉察:宫颈 II° 糜烂,宫颈刮片细胞学检查为巴氏III级,最适合的处理应为?

A.子宫全切除术

B.宫颈激光治疗

C.扩大性全子宫切除术

D.宫颈锥形切除术

E.宫颈活检

6. 26 岁女性,因外阴瘙痒来诊。妇科检查:小阴唇粘膜充血,阴道粘膜有散在红色斑点,分泌物淡薄有泡沫,黄色有味。最适宜的局部治疗方法是:

A.0.5 醋酸溶液冲洗后甲硝唑 200mg 置入阴道 10 天

B.1%龙胆紫涂抹阴道每周 3 次

C.2%碳酸氢钠冲洗后甲硝唑 200 毫克置入阴道 10 天

D.甲硝唑 200 毫克置入阴道 10 天

E.制霉菌素栓剂置入阴道 10 天

7. 26 岁妇女,停经 10 周,阵发性腹痛,伴阴道流血14 小时,出血量多于月经,就诊时宫口开大2cm,子宫如 10 周大小,最恰当的处理是

A.保胎休息

B.肌注黄体酮

C.等待自然流产

E.刮宫术

D.肌注催产素

8. 一住院妊高征孕妇,下述哪项检查方法能了解本病的根本病变?

A.全血粘度比值,血浆粘度比值

D.测尿雌激素/肌酐比值

B.眼底检查

E.测谷丙转氨酶

C.测红细胞压积

9. 28 岁,妊娠 37 周,2 周来恶心呕吐,食欲下降右季肋胀痛门诊检查皮肤无黄染,肝区叩痛(+),腹围 98cm,胎位 ROA,头浮,胎心好,血清转氨酶中度增高,乙型肝炎外表抗原(+),应予以乐观治疗的缘由是:

A.肝炎易合并妊高征及发生子痫

D.易发生产后出血

B.易引起胎儿宫内发育缓慢

E.易发生早产

C.易进展为重症肝炎

10. 一名 55 岁妇女,因绝经后 4 年发生阴道出血 3 月来院就诊,妇科检查:外阴及阴道正常,略显萎缩,宫颈光滑,子宫正常大,附件未见明显特别。最适宜的处理是:

A.阴道细胞学检查

C.阴道镜检查

B.分段诊断性刮宫

D.观看三月复诊

E.盆腔 B 超

11. 27 岁妇女,结婚 2 年不孕,常感下腹隐痛,经期加重,妇科检查子宫正常大,活动受限,左侧附件触及 4cm 大包块,边界不清,为明确诊断最正确检查方法是:

A.盆腔 B 型超声检查

D.子宫输卵管碘油造影

B.腹、盆腔 CT 扫描

E.阴道后穹窿穿刺

C.腹腔镜检查

12. 女性 35 岁,人流术后 4 个月,始终有不规章阴道流血,术后用避孕套避孕。查尿妊娠试验阳性,胸片可见两肺存在小片状的阴影,本病最可能的诊断是:

A.葡萄胎

D.吸宫不全

B.侵蚀性葡萄胎

E.先兆流产

C.绒毛膜癌

13. 患者 49 岁,1 年来月经紊乱,因停经 2 月后多量阴道流血 10 余天来院。体检:贫血貌,妇科检查:子宫略大,附件(-),最可能的诊断是:

A.先兆流产

D.更年期功血

B.难免流产

E.黄体萎缩不全

C.子宫肌瘤

14. 孕妇 28 岁,第一胎,孕 38 周,定期产前检查无特别,今日门诊检查时作 NST 为有反响型,无宫缩。以下处理哪项最适合?

A.可确诊为胎儿窘迫收入院

D.应进一步作 OCT E.

B.应马上行剖宫产术

正常现象,无需处理

C.应取胎儿头皮血帮助诊断胎儿窘迫

15. 28 岁,女性,放置节育器二年,停经 36 天后,下腹苦痛,伴阴道流血,量中,移动性浊音可疑,血压 12/8kPa(90/60mmHg),脉搏 100 次/分,妇科检查,阴道少量暗红色血液,宫颈举痛(±),子宫正常大小,软,后穹窿饱满,此时最恰当的处理是:

A.马上诊断性刮宫

B.后穹窿穿刺

C.严密观看,次晨留尿作妊娠试验

16. 一 30 岁初孕妇。患二尖瓣闭锁不全,现妊娠 28 周,L.O.A.心功Ⅱ级,来围产期门诊检查,询问对于心脏负担最重的时期就属下述哪项?

A.孕 27-28 周

D.孕 35-37 周

B.孕 29-31 周

E.孕 38-40 周

C.孕 32-34 周

17. 一位孕妇被觉察是奈瑟氏淋球菌的无病症携带者,一年前她因淋球菌感染使用青霉素治疗,发生严峻的过敏反响,这次应选用哪种治疗:

A.四环素

D.氯霉素

B.氨苄青霉

E.上述均不对

素C.壮丽霉
素

18. 下述测定的诸项指标中,常用哪一种代表胎盘功能?

A.阴道脱落细胞涂片检查

D.尿 HPL 测定

B.缩宫素激惹试验

E.尿 E3 测定

C.羊膜镜检查

19. 诊断前置胎盘最常用且准确的关心检查是

A.X 线摄片

D.B 型超声

B.CT 断层扫描

E.A 型超声法

C.超声多普勒检查

20. 对异位妊娠患者,以下哪一项检查最有助于诊断?

A.腹部触诊有明显的肌紧急

D.末梢血白细胞上升

B.附件区可触及有触痛的包块

E.血红蛋白降低

C.尿 HCG 阳性,后穹窿穿刺抽出不凝血

21. 重度妊娠高血压综合征的病人,首选的治疗方法是

A.降 压

D.冷静药

药 B. 利

E.解痉药

尿 药 C.

扩容药

22. 产程中,以以下何项推断胎头的凹凸?

A.胎头双顶经与坐骨棘平面的关系

B.胎头双顶经与坐骨结节的关系

C.耻骨联合上与胎头的关系

D.胎头颅骨最低点与坐骨棘平面的关系

E.胎头与阴道口的关系

1. 妊娠 8 个月孕妇,25 岁,近日患急性乙型肝炎,格外焦虑,担忧自己婴儿被感染,故急迫来我门诊询问部,母婴垂直传播机率:
- A.70%
B.50%
C.30%
D.25%
E.0
2. 初产妇,24 岁,妊娠 38 周临产,产程进展顺畅,宫口开全 1 小时,左枕前位,胎头+2,羊水Ⅲ° 污染,间隔 5 分钟听 2 次胎心,胎心率听诊 80-90 次/分,此时应实行恰当处置是:
- A.马上行剖宫产术
B.产钳完毕分娩
C.马上静滴葡萄糖液
D.马上静滴催产素
E.等待自然分娩
3. 初产,孕 32 周,头痛、胸闷及下肢浮肿 23 天,因腹痛来急诊,检查阴道少量出血,子宫收缩与间歇不明显,子宫较硬,面色苍白,脉搏细而快,BP10/6kPa(75/46mmHg)胎心 120 次/分。应实行哪项措施?
- A.马上抗休克,等待阴道分娩,
B.马上抗休克,静滴催产素引产
C.抗休克,同时扩张宫口引产
D.马上抗休克,尽快剖宫产
E.抗休克、冷静、止痛
4. 28 岁妇女,停经 40 天,阴道不规章少量流血 7 天,尿妊娠试验(+),赐予刮宫,刮出物病理检查结果为蜕膜组织,考虑最大可能是:
- A.先兆流产
B.异位妊娠
C.功能失调性子宫出血
D.炎性子宫出血
E.葡萄胎
5. 50 岁妇女,绝经后 1 年,接触出血 2 个月,宫颈涂片Ⅳ级来诊,确诊首选关心检查方法是:
- A.宫颈锥形切除
B.阴道镜检查
C.碘试验
D.宫腔细胞学检查
E.宫颈和颈管活组织检查
6. 32 岁妇女,不孕 5 年,周期性进展性痛经加重 4 年,检查子宫后倾粘连,宫颈后壁可触及多个黄豆大质硬结节,赐予服用性激素治疗,主要作用是:
- A.调整月经周期
B.减轻痛经程度
C.抑制排卵
D.劝慰性治疗
E.促使排卵
7. 初产妇,28 岁 G₁P₀ 妊娠 40 周临产入院,埋伏期进展顺畅,宫口开 6cm 后,先露 S=0 时,产程停滞,2 小时无进展,CST 呈早期减速,宫缩规律以下哪项处理正确的?
- A.催产素点滴加强宫缩
B.马上剖宫产完毕分娩
C.阴道检查,明确头盆关系
D.连续观看,等待自然分娩
E.产钳或吸引器助娩
8. 43 岁住院女患,在妇科检查中觉察:宫颈Ⅱ° 糜烂,宫颈刮片细胞学检查为巴氏Ⅲ级,最适合的处理应为:
- A.子宫全切除术
B.宫颈激光治疗
C.扩大性全子宫切除术
D.宫颈锥形切除术

E.宫颈活检

9. 62 岁妇女,48 岁绝经。近一个月消灭阴道不规章出血,妇检:宫颈光滑,子宫增大如孕 8 周,质软,双附件未觉察特别,为确诊应做以下哪项检查?

A.分段诊断性刮宫

D.宫颈刮片细胞学检查

B.阴道镜检查

E.尿妊娠试验

C.后穹窿取材行细胞学检查

10. 26 岁妇女,停经 10 周,阵发性腹痛,伴阴道流血 14 小时,出血量多于月经,就诊时宫口开大 2cm,子宫如 10 周大小,最恰当的处理是

A.保胎休息

D.肌注催产素

B.肌注黄体酮

E.刮宫术

C.等待自然流产

11. 住院足月产妇,宫缩规律,胎心良,枕左前位,宫口开大 3cm,子宫足月妊娠大小,肛查胎头颅骨最低点 S₄,盆腔后部空虚,测得的骨盆测量数值,哪项符合本产妇的实际?

A.骶耻外径值为 20cm

D.髂嵴间径值为 28cm

B.坐骨棘间径值为 8.5cm

E.耻骨弓角度为 90°

C.骶棘间径值为 25cm

12. 经产妇,妊娠 39 周,下腹阵发性坠痛,烦躁担忧,阴道出血少量,3 年前曾有剖宫产史,宫缩 40-50 “/2”,下腹部有压痛,胎心率 160 次/分,肛查先露浮动,宫口开大 4cm,羊水淡绿,导尿管检红细胞(++),首先应考虑为:

A.前置胎盘

D.子宫裂开

B.胎盘早期剥离

E.妊娠合并肾盂肾炎

C.先兆子宫裂开

13. 28 岁女性,因月经量多、周期缩短 7 个月就诊,查:贫血外观,阴道血性分泌物少许,子宫颈口扩张,可见有一红色肉质肿物,4cm×4cm×3cm 大小,其蒂在内口处,子宫略大,治疗应为:

A.经腹全子宫切除

D.阴式肌瘤剔除术

B.经腹肌瘤剔除术

E.阴式全子宫切除术

C.子宫次全切除术

14. 27 岁孕 26 周,主诉腹部急速长大,查:宫高 27cm,胎位触不清,无法触及明显的胎头,测定羊水中何种物质有助于诊断?

A.绒毛膜促性腺激素

D.甲胎蛋白

B.胎盘生乳素

E.羊水细胞染色体核型

C.雌三醇

15. 46 岁妇女,因月经过多持续半月未止入院治疗。患者近 1 年,月经周期不规章,经量时多时少,妇科检查根本正常,诊刮病理检查为子宫内膜囊腺型增生过长。最适宜的处理是:

A.孕激素周期治疗

D.子宫切除术

B.雌、孕激素周期治疗

E.刮宫后观看 3 月

C.雄激素治疗

16. 孕妇 32 岁,G₁P₀,孕 43 周入院待产。检查:血压 16/10.7kPa(120/80mmHg),宫高 35cm,胎位 LOA,胎心率 132 次/分,拟行胎盘功能测定,以下哪项表示胎盘功能缺乏?

A.12 小时胎动数 ≥ 20 次

D.NST 试验有反响型

B.B 超羊水最大直径 $\geq 3\text{cm}$

E.OCT 试验胎心消失连续晚期减速

C.血清胎盘生乳素 $\geq 4\mu\text{g/L}$

17. 患者 25 岁,停经 56 天,近日有少量不规章阴道出血伴腹痛。妇科检查:子宫增大如孕 4 个月大,软,左附件触及鸡蛋大囊性壁薄包块。为明确诊断首选的关心检查方法是:

A.HCG 测定

D.诊断性刮宫

B.腹部 X 平片

E.超声多普勒

C.B 超

18. 病例,25 岁,初产妇,40 周妊娠,有规律宫缩一小时来诊,当时宫口扩张 4cm,因宫缩强,宫口快速开全后 15 分钟顺当娩出一男婴,当即有鲜血流出,检查胎盘完整,子宫收缩良好,但有持续性鲜红色阴道流血少量,会阴无裂伤,分析其出血缘由为:

A.子宫收缩乏力出血

D.宫颈裂伤

B.羊水栓塞

E.凝血功能障碍

C.胎膜残留

19. 病例,28 岁,初孕,妊娠 36 周,近一周感乏力食欲差,作 SGPT256U 诊断为急性病毒性肝炎,应赐予高度重视及乐观治疗,是由于:

A.简洁合并妊高征及发生子痫

D.简洁发生宫缩乏力,产程延长

B.简洁进展为重症肝炎

E.简洁发生胎盘早期剥离

C.简洁发生畸胎

20. 24 岁孕妇,现妊娠 40 周 LOA,自述近 3 天胎动减弱,否认用药史,无阵发性腹痛,无流血及阴道流水来诊,为查明缘由应首选的检查方法是;

A.B 超检查胎盘成熟度

D.OCT 试验

B.胎心多普勒检查

E.12 小时胎动自我计数

C.NST 试验

21. 产妇,25 岁,产后四天,持续高热,体温在 $38.5-39.5^{\circ}\text{C}$ 左右,下腹苦痛,耻骨联合上 2cm 处可触及宫底,有明显压痛,恶露血性有臭味,分泌物做细菌培育,结果为阴性,而涂片中消灭大量细菌,此时最可能感染的菌群是:

A.大肠杆菌

D.金黄色葡萄球菌

B.厌氧菌

E.以上都不是

C.克雷白氏菌

22. 51 岁妇女宫活检切为宫颈癌,盆腔检查和直肠阴道检查显示宫旁组织未受累,但是阴道上段已被癌组织侵害,IVP 和乙状结肠镜检呈阴性一,但腹腔和盆腔的 CT 扫描显示增大的盆腔和腹主动脉旁淋巴结,按 FIGO3” 期,该患应定为:

A. II a

D.IIIb

B. II b

E.IV

C.IIIa

23. 一位孕^产置宫内节育器的 30 岁妇女,已确诊为妊娠 10 周,患者格外想连续妊娠,检查时觉察宫内节育器已不全脱落至子宫颈外口,最恰当的做法是:

- A.不做任何处理
- B.抗生素预防感染
- C.马上取出宫内节育器
- D.马上终止妊娠
- E.做腹腔镜检查

24. 药物流产最常用的药物是

- A.卡孕栓
- B.米索前列醇
- C.炔诺酮
- D.米非司酮
- E.缩宫素

1. 56 岁患者,绝经 5 年,近 3 月阴道不规章流血,妇科检查:宫颈光滑,子宫如孕 40 天大,质软,无压痛,探宫腔 7cm,分段诊刮:颈管未刮出组织,内膜质脆,入院后首选应实行治疗原则是:

- A.放射治疗
- B.孕酮类药物治疗
- C.化疗
- D.免疫治疗
- E.手术治疗

2. 一女患,26 岁,因胎膜早破行会阴侧切术分娩产后10 天,消灭寒战,高热,体温达 39℃,下腹部苦痛,恶露淡血性混浊,有异味,妇科检查冰冻骨盆,且有明显压痛,最可能的诊断是

- A.急性子宫内膜炎
- B.急性输卵管炎
- C.急性盆腔结缔组织炎
- D.急性盆腔腹膜炎
- E.布满性腹膜炎

3. 其次胎孕妇,37 孕周,原发性高血压合并重度子痫前期,3 小时前消灭持续腹痛,伴阴道少量出血,BP10/6kPa(75/45mmHg),脉搏 116 次/分,宫底剑下 2 横指。子宫硬有压痛,胎心音消逝,宫口容一指松,最恰当处理是

- A.人工破膜,催产素点滴引产
- B.乐观抢救休克,因胎儿已死,尽量阴道分娩
- C.待休克订正后行剖宫产
- D.人工破膜,等待自然分娩
- E.抢救休克同时行剖宫产术

4. 初产妇,24 岁,妊娠 38 周临产,产程进展顺当,宫口开全 1 小时,左枕前位,胎头+2,羊水III° 污染,间隔 5 分钟听 2 次胎心,胎心率听诊 80-90 次/分,此时应实行恰当处置是:

- A.马上行剖宫产术
- B.产钳完毕分娩
- C.马上静滴葡萄糖液
- D.马上静滴催产素
- E.等待自然分娩

5. 初产妇,会阴侧切后胎头吸引器助产,生儿体重 4200g,总产程 21 小时。产后 2 小时内阴道出血约 400ml,导致此产妇出血较多最可能的缘由是

- A.宫颈裂伤
- B.产后宫缩乏力
- C.胎盘残留
- D.产妇疲乏
- E.膀胱充盈

6. 初产,孕 32 周,头痛、胸闷及下肢浮肿 23 天,因腹痛来急诊,检查阴道少量出血,子宫收缩与间歇不明显,子宫较硬,面色苍白,脉搏细而快,BP10/6kPa(75/46mmHg)胎心 120 次/分。应实行哪项措施?

- A.马上抗休克,等待阴道分娩,
B.马上抗休克,静滴催产素引产
C.抗休克,同时扩张宫口引产
7. 关于妊娠合并乙型肝炎,以下哪项正确?
A.妊娠早期合并乙型肝炎时,不必考虑终止妊娠
B.妊娠中,晚期合并乙型肝炎时,不必考虑终止妊娠
C.越接近妊娠末期,进展为重症肝炎的可能越小
D.妊娠期肝炎,不易转变为慢性肝炎
E.妊娠合并肝炎时,子宫对催产素的敏感性降低
8. 50 岁女患,主诉外阴痒,伴多,稀,黄色,有腥臭,查:阴道粘膜充血明显有红色斑点,分泌物呈黄色泡沫状,最可能的诊断:
A.非特异性阴道炎
B.滴虫性阴道炎
C.念珠菌性阴道炎
D.阿米巴性阴道炎
E.老年性阴道炎
9. 32 岁,G₁P₀ 5 年前妊娠足月因胎儿窘迫行剖宫产术,此次孕 39 周,自然临产入院,查 LOA,胎心率 144 次/分,规律宫缩 6 小时后觉察子宫下段压痛,伴有血尿,此时宫口开大 8cm,胎心音好,宫缩 45 “/5 分,此时最恰当的处理是:
A.人工破膜,加速产程进展
D.马上剖宫产
B.马上产钳助产,完毕分娩
E.肌注冷静剂
C.用硫酸镁抑制宫缩
10. 23 岁已婚妇女,3 天前因孕 6 周在院外行人工流产手术,手术经过顺当。术后阴道流血量少,无腹痛。今日消灭下腹坠痛伴阴道血性分泌物增多。体检:体温 39℃,脉搏 110 次/分,律整。此时最适宜的处理是:
A.妇科检查
D.马上行清宫术
B.镜检 C.尿妊娠试验
E.后穹窿穿刺术
11. 初孕妇,孕 40 周,胎心率 162 次/分,不规章,宫口开全,先露+5,马上侧切助娩,生儿娩出后,有一次呼吸,心率 80 次/分,面色青紫,抢救首先应行:
A.气管插管
D.清理呼吸道
B.人工呼吸
E.刺激循环中枢
C.兴奋呼吸中枢
12. 26 岁妇女,停经 10 周,阵发性腹痛,伴阴道流血 14 小时,出血量多于月经,就诊时宫口开大 2cm,子宫如 10 周大小,最恰当的处理是
A.保胎休息
D.肌注催产素
B.肌注黄体酮
E.刮宫术
C.等待自然流产
13. 初孕妇 35 岁,妊 39 周,臀位,胎心好,胎膜未破,宫口开大 3cm,足先露,估量胎儿体重 3600g,最恰当处理是:
A.等待自然分娩
D.抬高孕妇臀部
B.马上剖宫产
E.应用抗生素
C.静滴催产素

14. 初孕妇 28 岁,妊娠 36 周近 2 周心悸,呼吸急促,疑心合并心脏病来院检查,以下哪项体征可诊断器质性心脏病?
- A.心率达 120 次/分
B.心界稍向左扩大
C.心律不齐有过早搏动
D.心尖部有 II 级收缩期吹风样杂音
E.心尖部有舒张期杂音
15. 38 岁教师,G 卅 P 拟,末次产于 8 年前。因经量增多 2 年就诊。本次月经已净 4 天。妇检:子宫前位,均匀增大如鸭卵,外表光滑、质硬、附件阴性。临床上应进一步询问的最重要病史是:
- A.有无发热、盗汗
B.有无性交痛
C.是否增多
D.避孕方法
E.有无痛经史
16. 已婚女性,19 岁,因尚将来月经收入院治疗。体型、容貌女性型,乳房发育正常,外阴未见特别,肛查触及子宫,双侧附件区未见特别。曾行黄体酮治疗,无撤药性出血,雌孕激素序贯治疗也未引起子宫出血,本病发病应在:
- A.下丘脑
B.垂体
C.肾上腺
D.卵巢
E.子宫
17. 患者 55 岁,绝经 5 年,3 天前开头少量阴道出血,少于月经量。妇检:宫颈重度糜烂,颗粒状,宫体略小,活动。此时应首选的关心检查方法是:
- A.阴道镜检查
B.宫颈活检
C.宫颈刮片
D.宫腔镜检查
E.分段诊断性刮宫
18. 28 岁,妊娠 40 周,规律宫缩 10 小时,宫口开全 20 分钟,头先露,棘下 2.5cm,,宫缩 25-30" /5-3",胎心率 140 次/分,子宫收缩力 4.00kPa(30mmHg),BP17.3/12kPa(130/90mmHg),下一步处理:
- A.产钳助娩
B.头吸助娩
C.剖宫产
D.加强宫缩
E.观看产程
19. 病例,25 岁,初产妇,40 周妊娠,有规律宫缩一小时来诊,当时宫口扩张 4cm,因宫缩强,宫口快速开全后 15 分钟顺当娩出一男婴,当即有鲜血流出,检查胎盘完整,子宫收缩良好,但有持续性鲜红色阴道流血少量,会阴无裂伤,分析其出血缘由为:
- A.子宫收缩乏力出血
B.羊水栓塞
C.胎膜残留
D.宫颈裂伤
E.凝血功能障碍
20. 女性 55 岁,绝经三年,阴道少量连续性流血一月余,无明显腹痛,阴道脱落细胞学检查巴氏 II 级,妇科检查:宫颈轻度糜烂,宫体略大,双侧附件正常,进一步处理方案是:
- A.切除子宫
B.广泛性全子宫切除术
C.广泛性全子宫切除及盆腔淋巴结去除术
D.诊断性刮宫及宫颈活组织检查
E.宫颈锥形切除术
21. 孕 1 产 0,38 孕周,2 个月前因感冒咽痛服红霉素片 3 天,近半个月觉察全身皮肤瘙痒,来院急诊,食欲正

常,无发热,检查BP17.3/12kPa(130/90mmHg)下肢浮肿(+),巩膜黄染,肝区无叩痛,SGPT40IU,血胆红素51 μmol/L,尿蛋白(+),最可能的诊断是:

- A.急性病毒性肝炎
- B.急性脂肪肝
- D.药物性肝炎
- E.妊高征肝损伤

C.妊娠肝内胆汁瘀积症

22. 一妇女 28 岁,因腹痛和不孕行腹腔镜检查,镜下见子宫常大,活动良好,双附件未见特别,双侧骶韧带腹膜有散在的紫褐色色素沉着,子宫颈的后壁腹膜有棕黄色斑块及园型腹膜缺陷,应首先考虑何种诊断:

- A.慢性盆腔炎
- B.盆腔结核
- C.盆腔腹膜炎
- D.卵巢癌
- E.子宫内膜异位症**

23. 一名 32 岁妇女,因经期腹痛并渐渐加剧前来就诊,检查子宫后倾,粘连固定,子宫峡部后壁可触及多个小结节,触痛明显,右附件区增厚,在附件区触及直径约 6cm 的囊性粘连包块,最可能的诊断是:

- A.慢性盆腔炎
- B.盆腔结核
- C.卵巢癌
- D.子宫内膜异位症**
- E.多发性浆膜下肌瘤

24. 一 24 岁初产妇,妊娠40 周,L.O.A.合并先心病,现已规律宫缩,在产程中对于心脏负担最重的,应属下述哪一期?

- A.分娩埋伏期
- B.分娩活跃期
- C.胎儿娩出期
- D.胎盘娩出期
- E.产褥期

C.胎儿娩出期

25. 一位 54 岁妇女,因盆腔肿物而做剖腹探查,术中见一侧卵巢生物,伴有网膜转移,最适当的术式是:

- A.网膜活检
- B.卵巢活检
- C.网膜转移瘤切除,单侧卵巢切除术
- D.大网膜切除术,双侧附件切除术
- E.大网膜切除,全子宫切除,双附件切除术**

1. 妊娠 8 个月孕妇,25 岁,近日患急性乙型肝炎,格外焦虑,担忧自己婴儿被感染,故急迫来我门诊询问部,母婴垂直传播机率:

- A.70%**
- B.50%
- C.30%
- D.25%
- E.0%

2. 26 岁女性,婚后 3 年不孕,近 4 年消灭经期腹痛而就诊,妇科检查子宫后倾正常大,宫骶韧带可触及痛性结节,为明确诊断还应询问哪种最常见病症?

- A.有无性交痛
- B.有无发热
- C.痛经有无进展性加重
- D.有无不规章阴道流血
- E.既往有无结核病史

C.痛经有无进展性加重

3. 初产妇,24 岁,妊娠 38 周临产,产程进展顺当,宫口开全 1 小时,左枕前位,胎头^不,羊水III° 污染,间隔 5 分钟听 2 次胎心,胎心率听诊 80-90 次/分,此时应实行恰当处置是:

- A.马上行剖宫产术
B.产钳完毕分娩
C.马上静滴葡萄糖液
4. 初产,26 岁,孕 36 周,子痫前期,实行硫酸镁静脉滴注,在应用过程中,哪项反映无 Mg 中毒反响或过量?
A.膝反射消逝
B.呼吸 14/分
C.尿量 200ml/24h
D.心率 100 次/分
E.血 Mg3.2mmol/L
5. 28 岁妇女,停经 40 天,阴道不规章少量流血 7 天,尿妊娠试验(+),赐予刮宫,刮出物病理检查结果为蜕膜组织,考虑最大可能是:
A.先兆流产
B.**异位妊娠**
C.功能失调性子宫出血
D.炎性子宫出血
E.葡萄胎
6. 初孕妇,妊娠足月,骨盆外测量:骶耻外径 19cm,髂嵴间径 25cm,髂棘间径 23cm,坐骨棘间径约 9cm,坐骨结节间径 7.5cm,该孕妇的骨盆属于:
A.扁平骨盆
B.均小骨盆
C.佝偻病性扁平骨盆
D.男性骨盆
E.漏斗型骨盆
7. 24 岁已婚妇女,停经 13 周后消灭不规章阴道流血,量不多,时断时续。停经 10 周时恶心呕吐明显。检查子宫底平脐。B 超见子宫腔内呈典型落雪状图象,该患最正确处理方案是:
A.赐予止吐剂,治疗频繁呕吐
B.赐子宫缩抑制剂,以削减阴道流血
C.**行负压吸宫术,去除子宫内容物**
D.行药物性流产
E.利凡诺羊膜腔内注射引产
8. 一位孕中期孕妇在门诊行妊高征的推测性诊断,以下哪项结果应嘱适当休息并需亲热随诊?
A.测得平均动脉后为 10kPa(75mmHg)
B.作转身试验 ,仰卧位舒张压较左侧卧位增加 2kPa(15mmHg)
C.**测得红细胞压积>35%,全血粘度比值>3.6**
D.行血管紧急素敏感试验 ,舒张压较试验前增加 2kPa(15mmHg)
E.以上都不是
9. 一住院妊高征孕妇,下述哪项关心检查方法能了解本病的根本病变?
A.全血粘度比值,血浆粘度比值
B.**眼底检查**
C.测红细胞压积
D.测尿雌激素/肌酐比值
E.测谷丙转氨酶
10. 初孕妇 36 岁,妊娠 36 周,产前检查:宫高 30cm,LSA,胎心率 140/分,推测胎儿在宫内安危状况最简易的方法是:
A.NST
B.OCT
C.尿 E3 连续测定
D.胎动计数
E.血清胎盘生乳素的测定
11. 初产妇28 岁,妊娠39 周,因其次产程延长,行低位产钳术,胎儿娩出后面部及全身皮肤呈青紫色,呼吸表

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/966222003124010135>