

主治医师（内分泌学）-体格检查(A1 型题)

1、判断成人发育正常的指标，不正确的是

- A. 头长为身高的 $1/5 \sim 1/6$
- B. 胸围等于身高的一半
- C. 两上肢展开的长度约等于身高
- D. 坐高等于下肢的长度
- E. 前臂曲侧或上臂背侧下 $1/3$ 处脂肪分布差异最小

2、某男性患者雄激素的作用不包括

- A. 皮脂腺分泌多，有痤疮
- B. 腋毛多
- C. 阴毛呈菱形分布
- D. 声音高调
- E. 睾丸和阴茎的发育

3、某女性患者雌激素的作用不包括

- A. 乳房发育
- B. 外阴发育
- C. 体毛过多
- D. 子宫发育
- E. 卵巢发育

4、判断营养状态的方法不正确的是

- A. 皮肤
- B. 皮下脂肪
- C. 毛发
- D. 体重指数
- E. 消耗增加

5、导致声音嘶哑的原因不正确的是

- A. 用嗓过度
- B. 肺癌纵隔淋巴结转移
- C. 气管内异物
- D. 贲门癌
- E. 声带小结

6、面具面容见于

- A. 肢端肥大症
- B. 震颤麻痹
- C. 甲亢
- D. 破伤风
- E. 长期应用糖皮质激素

7、有关体位的描述不正确的是

- A. 破伤风可出现角弓反张
- B. 肾结石可出现辗转体位
- C. 急性左心衰出现强迫仰卧位
- D. 先天性紫绀性心脏病可出现强迫蹲位
- E. 严重哮喘可出现强迫坐位

8、有关病理性脱发的原因不正确的是

- A. 某些内分泌疾病
- B. 所有发热性疾病
- C. 应用某些抗癌药物
- D. 神经营养障碍
- E. 头部皮肤疾病

9、关于蜘蛛痣正确的说法是

- A. 是一种似蜘蛛状的红痣
- B. 与体内性激素的多少有关
- C. 大多出现于上腔静脉回流区
- D. 妇女在妊娠期间皆可出现，但分娩后即消失
- E. 有蜘蛛痣，即可诊断为肝硬化

10、发热伴皮肤黏膜出血、淋巴肿大常见于

- A. 病毒性肝炎
- B. 斑疹伤寒
- C. 干酪性肺结核
- D. 急性白血病
- E. 胆道感染

11、关于皮下气肿，不正确的是

- A. 系胸部皮下组织积存气体
- B. 用手按压时有摩擦感
- C. 偶见局部产气杆菌感染
- D. 多见于胸肺、气管或胸膜受损后
- E. 严重时向头颈及腹部蔓延

12、口腔黏膜蓝黑色色素沉着，指缝、乳孕等色素沉着，见于

- A. 黏液性水肿
- B. 克汀病
- C. 肾上腺皮质功能不全
- D. 肢端肥大症
- E. Cushing 病

13、无汗时皮肤异常干燥的原因，不正确

- A. 尿毒症

- B. 甲状腺功能亢进
- C. 黏液性水肿
- D. 维生素 A 缺乏
- E. 硬皮病

14、痛风患者耳廓上见触痛性黄白色小结，因为

- A. 风湿肉芽肿
- B. 耳廓软骨炎
- C. 胆脂瘤
- D. 皮肤感染
- E. 尿酸盐沉积

15、有关颈静脉怒张正确的是

- A. 正常人坐位或平卧时颈外静脉显露
- B. 颈静脉充盈在锁骨上缘至下颌角距离的下 2 / 3 以内
- C. 提示左心房压力升高
- D. 提示右心房压力升高
- E. 常见于肺水肿

16、引起颈静脉怒张的常见原因不包括

- A. 肺水肿
- B. 右心衰竭

- C. 缩窄性心包炎
- D. 心包积液
- E. 上腔静脉阻塞综合征

17、甲状腺Ⅲ度肿大，表现为

- A. 可看到，不能触及
- B. 可触及，不能看到
- C. 肿大超过胸锁乳突肌外缘
- D. 肿大达到胸锁乳突肌内缘
- E. 肿大不超过胸锁乳突肌外缘

18、正常成人胸廓前后径与左右径之比为

- A. 1： 0. 5
- B. 1： 1
- C. 1： 1. 5
- D. 1： 2
- E. 1： 2. 5

19、乳头血性分泌物最常见于

- A. 乳腺癌
- B. 急性乳腺炎
- C. 乳腺纤维瘤

- D. 乳腺小叶增生
- E. 乳腺导管内良性乳突状瘤

20、呼吸深快见于

- A. 呼吸肌麻痹
- B. 过度紧张
- C. 严重鼓肠
- D. 大量腹水
- E. 肥胖

21、呼吸深慢见于

- A. 酸中毒
- B. 情绪激动
- C. 大量胸腔积液
- D. 重症肺炎
- E. 气胸

22、呼吸过缓见于

- A. 发热
- B. 胸膜炎
- C. 贫血
- D. 镇静剂过量

E. 腹水

23、毕奥呼吸常见于

A. 急性喉炎

B. 呼吸中枢功能障碍

C. 情绪激动

D. 右心功能不全

E. 左心功能不全

24、胸骨有压痛及叩痛，常见于

A. 气管内异物

B. 急性白血病

C. 急性支气管炎

D. 肋骨软骨炎

E. 再生障碍性贫血

25、叩诊可发现阳性体征的胸腔积液量为

A. 200～250ml

B. 150～200ml

C. 300ml 以上

D. 100～150ml

E. 100ml

26、大气道阻塞时

- A. 呼气费力
- B. 呼气时伴有广泛哮鸣音
- C. 常伴有湿啰音
- D. 常见于支气管哮喘
- E. 重者出现吸气时”三凹征”

27、正常心尖搏动位于第 5 肋间锁骨中线内侧

- A. 0. 1~0. 4cm
- B. 0. 5~1. 0cm
- C. 1. 1~1. 4cm
- D. 1. 5~1. 9cm
- E. 2. 0~2. 4cm

28、有关心前区震颤正确的是

- A. 常见于二尖瓣关闭不全
- B. 常见于主动脉瓣关闭不全
- C. 震颤系血液流经狭窄的瓣膜口或异常通道时产生的涡流所致
- D. 以手掌触诊确定震颤的具体部位和时相
- E. 可分为收缩期震颤、舒张期震颤

29、可在胸骨左缘第 3~4 肋间触及收缩期震颤的疾病是

- A. 肺动脉瓣狭窄
- B. 室间隔缺损
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 动脉导管未闭

30、心浊音界变小，甚至叩不出见于

- A. 肺实变
- B. 胸腔积液
- C. 肺气肿
- D. 心包积液
- E. 腹腔积液

100 次 / 分

- C. 坐位时消失
- D. 距第二心音较近
- E. 心肌张力不降低

33、有关正常心音的描述，不正确的是

- A. 正常只能听到第一心音(S1)和第二心音(S2)
- B. S1 音调低钝，强度较响

- C. S2 音调较高而脆，在心底部最响
- D. 部分儿童和青少年可闻及 S4
- E. S3 出现在心室舒张早期

34、有关开瓣音正确的是

- A. 出现于心底部
- B. 音调低
- C. 开瓣音提示瓣膜弹性和活动性尚好
- D. S2 后 0.05 秒
- E. 历时较长而响亮

35、导致 Austin-Flint 杂音的情况是

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 器质性二尖瓣狭窄
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 二尖瓣关闭不全
- E. 动脉导管未闭

36、第一心音增强见于

- A. 二尖瓣关闭不全
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 左心衰竭

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/967041015164006156>