北京住院医师儿外科Ⅰ阶段：新生儿外科

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题：新生儿肠腔内 β-葡萄糖醛酸苷酶的主要作用是（　）。A.水解结合胆红素

B.水解葡萄糖醛酸

C.水解间接胆红素

D.促进合成结合胆红素

E.促进合成葡萄糖醛酸转移酶

2、单项选择题：以下对破伤风杆菌描述错误的是（　）。A.为革兰阳性厌氧菌

B.为革兰阴性厌氧菌

C.具有芽胞

D.对外界环境抵抗力极强

E.能产生破伤风杆菌毒素

3、单项选择题：ABO 血型不和所致的新生儿溶血症常见的血型是（　）。A.母 A 型、子 O 型

B.母 B 型、子 A 型

C.母 O 型、子 A 型

D.母 A 型、子 AB 型

E.母 AB 型、子 A 型

4、单项选择题：新生儿出生体重 3.2kg，生后 48h 血清总胆红素 297.5 / μmol / L，未结合胆红素 289 μmol / L。在检查黄疸原因时，首选治疗方法是（　）。A.光照疗法

B.白蛋白输注

C.口服苯巴比妥（鲁米那）

D.交换输血

E.输血浆

5、单项选择题：关于肺表面活性物质，下列哪项是正确的（　）。A.肺表面活性物质在胎龄 18～20 周时出现，35～36 周达肺成熟水平

B.由肺泡Ⅰ型上皮细胞分泌产生

C.肺表面活性物质缺乏不是引起新生儿肺透明膜病的主要原因

D.肺表面活性物质人工制剂优于天然制剂

E.肺表面活性物质的主要成分为蛋白质

6、单项选择题：新生儿出生后感染性肺炎的特点哪项不正确（　）。A.口吐泡沫

B.体温正常或不升

C.发病时间多在 3 天以内

D.诊断靠肺部听到细湿啰音

E.可有气急、鼻煽，吸气时三凹征阳性

7、单项选择题：患儿，男，出生时 Apgar 评分 3 分，生后 2d，嗜睡，肌张力减退，时有惊厥，头颅 CT 扫描，可见右叶有低密度影。诊断为新生儿缺氧缺血性脑病，为控制惊厥，应首选何种药物（　）。A.安定肌注

B.利尿剂

C.水合氯醛灌肠

D.苯巴比妥钠

E.甘露醇

8、单项选择题：导致新生儿坏死性小肠结肠炎肠管黏膜损伤机制的说法正确的是（　）。A.低氧血症导致肠黏膜血管防御性收缩，导致肠管损伤

B.动脉导管未闭导致体循环血流增加

C.红细胞刺激肠黏膜微循环

D.母乳喂养

E.肠道细菌先感染肠黏膜

9、单项选择题：早产儿视网膜病变可分为几期（　）。A.1 期

B.2 期

C.3 期

D.4 期

E.5 期

10、单项选择题：下列关于新生儿坏死性小肠结肠炎确诊病例禁食时间的处理正确的是（　）。A.3 大

B.3～6 天

C.7～14 天

D.禁食到腹胀缓解为止

E.14～21 天

11、单项选择题：下列关于新生儿持续性肺动脉高压的发病机制的说法正确的是（　）。A.肺血管存在动静脉短路

B.肺血管痉挛

C.动脉导管未闭

D.呼吸机使用不当

E.NO 应用不当

12、单项选择题：关于肺泡表面活性物质，下列说法正确的是（　）。A.是由Ⅰ型肺泡细胞产生的

B.是由Ⅱ型肺泡细胞产生的

C.是呼吸道上皮细胞分泌产生的

D.是由呼吸道间质细胞产生的

E.以上说法均不正确

13、单项选择题：早产儿视网膜病变的阈前病变和阈值病变包括（　）。A.Ⅰ区的任何病变、后极部异常的血管和视网膜血管扩张、迂曲

B.Ⅱ区的 2 期+、后极部异常的血管和视网膜血管扩张、迂曲

C.Ⅲ区的 3 期+、后极部异常的血管和视网膜血管扩张、迂曲

D.后极部异常的血管和视网膜血管扩张、迂曲

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/968033076015006063