

2018年徐州市家庭医生团队服务技能竞赛笔试试题（护理组）

1、类风湿关节炎的临床特点，关节活动后（） [单选题] *

- A.症状减轻(正确答案)
- B.疼痛加重
- C.多关节对称性发作
- D.游走性

2、系统性红斑狼疮皮肤损害的典型表现是（） [单选题] *

- A.蝶形红斑(正确答案)
- B.蜘蛛痣
- C.盘状红斑
- D.瘀斑

3、使用抗甲状腺药物时，应特别注意观察哪种副作用发生？（） [单选题] *

- A.肝脏损害
- B.肾脏损害
- C.血管炎
- D.粒细胞减少(正确答案)
- E.弥漫性血管炎

4.甲亢患者最具特征的心血管体征为（） [单选题] *

- A.水冲脉
- B.心律失常

- C. 脉压增大
- D. 毛细血管搏动症
- E. 睡眠时心率增快(正确答案)

5. 抗甲状腺药物硫脲类、咪唑类的主要作用机制是 () [单选题] *

- A. 抑制甲状腺激素合成(正确答案)
- B. 抑制抗原抗体反应
- C. 抑制甲状腺激素释放
- D. 降低外周组织对甲状腺激素反应
- E. 使促甲状腺激素分泌降低

6. 糖尿病患者体内葡萄糖不能充分利用, 发生消瘦的原因是 () [单选题] *

- A. 口渴多饮
- B. 脂肪合成增多
- C. 无氧糖酵解增加
- D. 蛋白质和脂肪分解增多及失水(正确答案)
- E. 促进肌肉组织摄取葡萄糖

7. 下列不是人体主要内分泌腺的是 () [单选题] *

- A. 下丘脑
- B. 腺垂体、神经垂体
- C. 甲状腺
- D. 肝脏(正确答案)
- E. 肾上腺

8. 肥胖是指体重超过理想体重为 () [单选题] *

- A. 5%

B.10%

C.8%

D.20%(正确答案)

E.15

9. 62岁男性患者，因患糖尿病9年而长期接受胰岛素治疗。昨晚因多食后，今上午尿糖定性为+++，自行增加了12u胰岛素，1小时后突然感到心悸、饥饿、出冷汗。随即昏迷。为明确诊断，你认为应立即做下列哪项检查？（） [单选题] *

A、血糖(正确答案)

B、尿糖

C、血酮

D、尿酮

E、血pH值

10.下列哪项属于深感觉（） [单选题] *

A. 痛觉

B. 温觉

C. 触觉

D. 位置觉(正确答案)

11.某下肢瘫痪者，经查肢体不能自行抬起，此肌力应判断为（） [单选题] *

A. 0级

B. 1级

C. 2级(正确答案)

D. 3级

12.下列瘫痪病人的呼吸道护理，哪项是错误的？（） [单选题] *

- A. 室内空气流通、保暖
- B. 鼓励病人尽量咳嗽、排痰
- C. 喂食要慢以免呛入气管，注意口腔护理
- D. 对分泌物较多而咳嗽无力者应先翻身后吸痰(正确答案)

13.一般脑血栓形成患者，早期进行患肢功能锻炼宜在发病后几天进行？（） [单选题] *

- A. 3天
- B. 1周(正确答案)
- C. 2周
- D. 3周

14.瘫痪患者最常见的并发症是（） [单选题] *

- A. 肺部感染
- B. 尿路感染
- C. 便秘
- D. 褥疮(正确答案)

15.瘫痪肢体宜保持功能位，下列哪项是错误的 A [单选题] *

- A. 膝关节伸直(正确答案)
- B. 腕关节稍背曲
- C. 肘关节屈曲
- D. 踝关节垂直，膝关节外置一枕以防外旋

16.二甲双胍用于血糖控制，其药理作用主要是？（） [单选题] *

- A. 减少肝脏葡萄糖输出(正确答案)
- B. 促进胰岛素分泌

- C. 改善胰岛素抵抗
- D. 延缓碳水化合物在肠道的消化吸收

17. 深昏迷是最重要的体征是 A [单选题] *

- A. 瞳孔反射消失(正确答案)
- B. 压眶反射迟钝
- C. 病理反射阴性
- D. 角膜反射减弱

18. 引起脑出血最常见的原因是 A [单选题] *

- A. 高血压(正确答案)
- B. 脑动脉硬化
- C. 颈动脉硬化
- D. 脑动脉瘤

19. 高血压脑出血的最常见的破裂血管是 () [单选题] *

- A. 大脑中动脉
- B. 颈内动脉
- C. 颈外动脉
- D. 豆纹动脉(正确答案)

20. 高血压脑出血最易发生在 () [单选题] *

- A. 内囊(正确答案)
- B. 中脑
- C. 桥脑
- D. 小脑

21.男性，25岁，突发剧烈头痛，伴频繁呕吐，继之神志不清。检查：体温36.8℃，颈抗，肺无异常，肢体无偏瘫，您考虑为（）[单选题]*

- A. 脑出血
- B. 脑血栓形成
- C. 脑肿瘤
- D. 蛛网膜下腔出血(正确答案)

22.对头痛病人，下列护理措施哪项不妥（）[单选题]*

- A. 鼓励病人应用止痛药(正确答案)
- B. 鼓励病人进行理疗来缓解疼痛
- C. 鼓励病人进行放松训练
- D. 鼓励病人避免强光和噪音刺激，保持环境的安静

23.对感觉障碍的病人，护理措施中哪项不妥（）[单选题]*

- A. 向病人解释感觉障碍的原因
- B. 缓解病人紧张和不安的情绪
- C. 避免患处重压，防止压疮
- D. 对感觉障碍患肢使用热水袋保暖(正确答案)

24.瘫痪病人护理中，下列措施哪项不妥（）[单选题]*

- A. 保持肢体功能位，翻身、拍背
- B. 调整饮食以防便秘发生
- C. 鼓励病人多饮水
- D. 由于瘫痪肢体不易移动可将静脉输液放在瘫痪肢体侧(正确答案)

25.病人对压眶刺激出现痛苦表情，没有言语应答，且不能执行简单的命令，目前病人处于的状态是（）[单选题]*

- A . 昏迷
- B . 嗜睡
- C . 浅昏迷(正确答案)
- D . 深昏迷

26、健康教育的核心问题是 () [单选题] *

- A、有计划、有组织、有系统的社会和教育活动
- B、预防疾病、促进健康
- C、提高生活质量
- D、促使个体或群体改变不健康的行为和生活方式(正确答案)

27、健康促进是指 () [单选题] *

- A、个人与家庭采取健康行为
- B、家庭与社区采取健康行为
- C、社区与国家采取健康行为
- D、促使人们提高、维护、改善自身健康的过程(正确答案)

28、《2017 中国糖尿病管理指南》推荐的老年糖尿病目标血压是 () [单选题] *

- A、 < 140/ 80mmhg
- B、 < 130/ 80mmhg(正确答案)
- C、 < 140/ 90mmhg
- D、 < 130/ 90mmhg

29、以下关于居民健康档案的服务与管理中，最核心的要求应当是 () [单选题] *

- A、应用健康档案信息系统进行工作考核
- B、应用健康档案信息系统进行服务的统计与报表
- C、提高建档率

D、医务人员使用好健康档案，更好地为居民提供健康维护服务(正确答案)

30、居民健康档案的 17 位编码中，由建档机构自行编码的是 () [单选题] *

A、后 3 位

B、后 4 位

C、后 5 位(正确答案)

D、后 6 位

31、社区护理的特点不包括 () [单选题] *

A、以维持和促进人的健康为中心

B、面向家庭尤其是个人

C、具有高度自主性与独立性

D、管案时间长(正确答案)

32、护士与患者的沟通中，属于开放式的问题是 () [单选题] *

A、您昨晚睡得好吗

B、您现在头痛吗

C、您的胸部还疼吗

D、您现在有哪些不舒服(正确答案)

33、关于语言性沟通交流，下列哪项说法不妥： () [单选题] *

A、选择通俗易懂的语言，忌用医学术语

B 交谈的语速要适中

C、封闭式提问时病人能充分表达自己的想法和感受(正确答案)

D、称呼的选择要根据对方的身份、年龄、职业等，力求准确、适当

34、下列哪项沟通形式属于非语言沟通 () [单选题] *

A、表情、触摸(正确答案)

B、图片、幻灯

C、宣传册

D、讲座

35、在对某孕妇进行产后知识宣教沟通中，应采用的距离为（） [单选题] *

A、亲密距离

B、个人距离(正确答案)

C、社交距离

D、公众距离

36、关于语言性沟通交流，下列哪项说法不妥：（） [单选题] *

A、选择通俗易懂的语言，忌用医学术语

B、交谈的语速要适中

C、封闭式提问时病人能充分表达自己的想法和感受(正确答案)

D、称呼的选择要根据对方的身份、年龄、职业等，力求准确、适当

37、食物中毒最常见的类型是（） [单选题] *

A、化学性食物中毒

B、农药性食物中毒

C、霉菌性食中毒

D、细菌性食物中毒(正确答案)

38、最能反应昏迷病人病情的体征变化是（） [单选题] *

A、体温

B、脉搏

C、呼吸

D、神志(正确答案)

39、临终期病人表现出的心理反应为完全失望，沉默寡言是发生在（） [单选题] *

- A、否认期
- B、愤怒期
- C、协议期
- D、抑郁期(正确答案)

40、某肝癌晚期患者，肝区疼痛明显，辗转反侧，夜不能寐。病人已意识到治疗无望，身心非常痛苦。表现为绝望、悲伤、消沉、经常厌世的情绪。以下对该病人采取的护理措施中不妥的是（） [单选题] *

- A、安排家属陪护病人
- B、对病人进行健康教育和指导(正确答案)
- C、鼓励病人表达感受
- D、采取适当的措施保证病人休息及营养

41、为女性病人导尿第一次消毒外阴，错误的方法是（） [单选题] *

- A、病人屈膝仰卧，双腿略外展
- B、臀下垫橡胶单和中单
- C、用消毒液棉球消毒
- D、顺序是由内向外，自上而下(正确答案)

42、现场心肺复苏的黄金时间是几分钟（） [单选题] *

- A.3-5
- B.B.4-6(正确答案)
- C.C.8-10
- D.D.5-8

43、阿托品治疗有机磷杀虫药中毒时，无法缓解的临床表现是（） [单选题] *

A.呼吸困难

B.肌束震颤(正确答案)

C.流涎

D.腹痛

44、短暂性脑缺血发作(TIA)，出现相应的症状及体征，完全恢复最长应在（）

[单选题] *

A. 6小时内

B. 12小时内

C. 24小时内(正确答案)

D. 48小时内

45、女，32岁。购物时感头晕、恶心、乏力，随即意识丧失，摔倒在地，约1分钟自行苏醒，无大小便失禁，无遗留意识或肢体功能障碍。其意识丧失最可能的病因是（） [单选题] *

A. 迷走神经张力异常增高

B. 短暂性脑缺血发作(正确答案)

C. 心率失常

D. 低血糖症

46、痛风最常见的首发症状是：（） [单选题] *

A.急性关节炎(正确答案)

B.肾结石

C.关节畸形

D.痛风石

47、病人，女，68岁，近几年出现不明原因腰背疼痛、乏力，有时全身骨痛。无固定部位，劳累或活动后加重，不能负重。1天前外出因路滑摔倒，腿痛加重不能

活动，立即去医院就诊，诊断为“骨质疏松症，股骨颈骨折”。对该患者进行疾病早期饮食指导，以下错误的是：（） [单选题] *

- A.忌喝浓茶
- B.高钙饮食
- C.高蛋白饮食(正确答案)
- D.忌喝咖啡

48、男，15岁，双手腕、肘及膝关节肿痛，伴间断低热6个月，测抗链O抗体阳性，类风湿因子阴性，双手X像片示：腕骨间隙狭窄，有骨浸蚀现象，最可能的诊断是：（） [单选题] *

- A.系统性红斑狼疮
- B.类风湿关节炎(正确答案)
- C.骨关节炎
- D.反应性关节炎

49、一缺铁性贫血患者，每日口服铁剂治疗，护士应嘱咐患者如何服药：（） [单选题] *

- A.晨起空腹状态服药
- B.两餐之间或餐后服药(正确答案)
- C.可与牛奶同服
- D.避免与Vc同服

50、男性，64岁，主动脉瓣关闭不全，左心扩大，测左室射血分数(LVEF)40%，日常活动不引起症状，该病人的心功能诊断是（） [单选题] *

- A、心功能Ⅱ级
- B、心功能Ⅲ级
- C、心功能Ⅰ级

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/968136070117006027>