


急诊科试题及答案

一、单选题

1. 82 岁，女性，突发右侧胸痛，呼吸急促，行急诊 CT 检查，如图所示，可诊断为（ ）。




- A. 中央型肺癌
- B. 肺门淋巴结肿大
- C. 肺动静脉瘘
- D. 肺动脉栓塞
- E. 肺动脉瘤

【答案】D

【解析】没有试题分析

2. 男性患者，65 岁，因胸痛 1 个月就诊，胸片检查见图，下列诊断中最明确的是




- A. 右肺胸膜肥厚
- B. 右肺不张
- C. 右侧胸腔积液
- D. 右肺炎症
- E. 肺栓塞

【答案】B

【解析】没有试题分析


3. 18 岁，男，被人殴打后胸痛，请结合胸片选出最可能的诊断（ ）。



- A. 血气胸
 - B. 气胸
 - C. 胸腔积液
 - D. 肺气肿
 - E. 肺挫伤
- 【答案】A

【解析】没有试题分析

4. 男性患者，38 岁，突感胸部不适，X 线检查如图，最可能的诊断是（



- A. 肺部炎症
- B. 胸腔积液
- C. 肺结核
- D. 正常心、肺、膈
- E. 气胸

【答案】D

【解析】没有试题分析




5. 老年高血压患者饭后突发心前区剧痛，面色苍白，全身大汗淋漓，血压1 /60mmHg，心率 126 次/分，最可能的诊断为（）。

- A. 创伤性休克
- B. 神经性休克
- C. 失血性休克
- D. 过敏性休克
- E. 心源性休克

【答案】E

【解析】没有试题分析

6. 女，43 岁，急性胸骨后剧痛，腹痛腹胀、呕吐，影像检查如图，最佳的诊断是（）



- A. 后纵隔神经源性肿瘤
- B. 右下肺癌
- C. 食管裂孔疝并胃扭转
- D. 后纵隔畸胎瘤
- E. 后纵隔脓肿

【答案】C

【解析】没有试题分析

7. 不属于疼痛性质的是（）。

- A. 刺痛
- B. 刀割样痛
- C. 烧灼痛
- D. 绞痛
- E. 牵涉痛

【答案】E

【解析】没有试题分析

8. 患者女，28 岁。经常出现短暂性胸前刺 部位不定，痛时含硝酸甘油 1 2s

痛，

疼痛即消失，发作时心电图无明显 ST 段偏移，最可能诊断为（ ）
。 A. 心绞痛

B-自发性心、绞痛

。 . 心脏神经症

D. 变异型心绞痛

E. 稳定型心绞痛

【答案】C

【解析】没有试题分析

9. 可引起胸痛的胸壁疾病是（ ）。

A. 肺癌

B. 肋间神经炎

。 . 自发性气胸

D. 胸膜肿瘤

E. 胸膜炎

【答案】B

【解析】没有试题分析

10. 下列引起胸痛的原因，不是胸壁疾病的是（ ）。

A. 胸膜肿瘤

B. 肋间神经炎

C. 肋间骨折

D. 非化脓性软骨炎

E. 带状疱疹

【答案】A

【解析】没有试题分析

11. 发生急性心肌梗死时最先出现的症状是（ ）。

- A. /心律失常
- B. 低血压和休克
- C. 疼痛
- D. 呼吸困难，疼痛
- E. 恶心，呕吐

【答案】C

【解析】没有试题分析

12. 患者男，60岁。咳喘反复发作10年。1d前一阵剧烈咳嗽后突感左侧胸痛，呼吸困难，则可能是由于发生（）。

- A. 肺栓塞
- B. 急性心肌梗死
- C. 肺气肿
- D. 急性左心衰竭
- E. 自发性气胸

【答案】E

【解析】没有试题分析

二、A3/A4型题

以下提供若干个案例，每个案例有若干个考题。请根据提供的信息，在每题的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上按照题号，将所选答案对应字母的方框涂黑。

1. （共用题干）患者，男，36岁。因急性阑尾炎住院。在办理出院手续时突发呼吸困难伴剧烈胸痛。体格检查：发绀，双肺可闻及干、湿音，105次/min，P₂>A₂。

1. 立即给予的急救措施为（）。

- A. 阿司匹林
- B. 硝酸甘油
- C. 吸氧
- D. 吗啡

E. 停止活动

【答案】E

【解析】没有试题分析

2. 最可能的诊断是（提示：心电图示：电轴右偏，III 导联显著 Q 波和 T 波倒置，ST 段压低，I 导联 S 波深）（ ）。

火急性心肌梗死

B. 急性心力衰竭

。 . 急性肺梗死

D. 严重心律失常

E. 术后腹腔出血

【答案】C

【解析】没有试题分析

3. 为明确诊断，应考虑的检查是（ ）。

A. 腹部超声

B. 肺功能

C. 动脉血气分析

D. 胸部 CT

E. 超声心动图

【答案】D

【解析】没有试题分析

2. （共用题干）患者，女，58 岁。反复胸痛收入 ICU，拟“冠心病，心绞痛”，给予静脉滴注硝酸甘油，2h 后突然发生剧烈胸痛，伴呕吐，体检：患者无反应，脉搏测不出，心电监护示室颤。

1. 下列哪一项是最可能的诊断？（ ）

火心肌梗死

B. /心源性休克

。 . 心脏骤停

D. 充血性心衰

£. 心绞痛

【答案】C

【解析】没有试题分析

2. 下列哪一项是最佳的抢救措施？（）

- A. 气管插管辅助通气
- B. 同步电复律 1J
- C. 非同步电复律 2J
- D. 静脉注射利多卡因
- E. 静脉注射肾上腺素 1mg

【答案】C

【解析】没有试题分析

3. （共用题干）患者，男，54岁。胸痛气急，半卧位，HR130次/分，BP90/60mmHg，ECG示：急性前壁心肌梗死，测CO为2L/min。

1. 下列哪项不适宜采用？（）

- A. 多巴酚丁胺
- B. 多巴胺
- C. 硝酸甘油
- D. 去甲肾上腺素
- E. IABP

【答案】D

【解析】没有试题分析

2. 下列哪一项不适宜进行IABP？（）

火急性心肌梗死

- B. 休克
- 。 . 心脏手术
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 高血压

【答案】D

【解析】没有试题分析

4. （共用题干）患者，女，57岁。阵发性室上性心动过速患者，行射频消融术治疗，

术中突然出现胸痛、胸闷、烦躁、呼吸困难，血压 90/60mmHg（12/8kPa），两肺呼吸音清，心、界向两侧扩大，心率 120 次/min，各瓣膜听诊区未闻及杂音，奇脉（+）。

1. 患者最可能的诊断是（ ）。

A. 心脏压塞

B. 脑出血

C. 肺栓塞

D. 急性心肌梗死

E. 主动脉夹层

【答案】A

【解析】没有试题分析

2. 患者突然心跳停止，心肺复苏的同时，应首选的处理措施是（ ）。

A. 扩容

B. M 包穿刺引流

C. 改善通气

D. 胸膜腔内针刺减压

E. 溶栓治疗

【答案】B

【解析】没有试题分析

5. （共用题干）患者，男，65 岁。主因活动后背部剧烈疼痛 5h，双下肢无力 1h 入院。同时伴出汗、心慌、胸闷等不适。既往有高血压病史。体格检查：T36.5℃，BP140/90mmHg。唇发绀。心率 86 次/min，律齐，主动脉瓣 3/6 级舒张期杂音。右侧足动脉搏动摸不到，右下肢皮温低。

1. 为明确诊断应立即进行的检查项目包括（ ）。

A. 心电图

B. 胸部 X 线检查

C. 肺动脉造影

- D. 肺功能检查
- E. /心肌酶
- F. D-二聚体

【答案】A|B|E|F

【解析】没有试题分析

2. 应尽快做的处理包括（提示入院血患者仍有背部剧烈疼痛，不随体位改变而有所缓解，且呼吸急促，30次/min，面色苍白，大汗。心率110次/min，血压150/95mmHg 心电图无明显改变，心肌酶及）-二聚体结果无异常升高，X线示 主动脉影增宽。）（）。

- A. 静卧
- B. 吸氧
- C. 给予P-受体阻滞剂
- D. 静脉应用喘定
- E. 皮下应用低分子肝素
- F. 静脉注射吗啡
- G. 溶栓治疗

【答案】A|B|C|F

【解析】没有试题分析

3. 为明确诊断应检查（提示：治疗1d患者疼痛缓解，安静状态下呼吸平缓，血压120/72mmHg。心、率80次/min，律齐）（）。

- A. 肺动脉造影
- B. 肺功能
- C. 经胸超声心动图
- D. 冠状动脉造影
- E. CT
- F. MRI
- G. 主动脉造影

【答案】C|E|F|G

【解析】没有试题分析

4. 目前诊断为（提示：经胸超声心动图发现主动脉根部扩张，主动脉壁增厚；CT示：“双腔”主动脉）（）。

- A. 特发性肺动脉高压
- B. 主动脉夹层
- C. 先天性心脏病相关性肺动脉高压

»急性心脏压塞

£. 急性心肌梗死

「. 急性肺栓塞

【答案】B

【解析】没有试题分析

6. （共用题干）患者，男，63岁。主因胸骨后疼痛2h入院，活动时加重，伴大汗、恶心。既往有高血压、糖尿病、冠心病史。体格检查：血压104/55mmHg，心率112次/min，呼吸31次/min，体温37.1℃，心、律齐，各瓣膜区未闻及杂音，双肺呼吸音清，未闻及干湿性音，腹软，无压痛及反跳痛，双下肢轻度水肿。

1. 为明确诊断，应急行的检查是（）。

- A. 胸部X线
- B. 腹部超声
- 。 . 心肌酶
- D. 血常规
- E. /心电图
- F. 血、尿淀粉酶
- G. 腹部X线平片
- H. 尿常规

【答案】C|E

【解析】没有试题分析

2. 考虑目前患者的诊断是（提示：TnI升高，心电图示II、IILAVF导联ST段弓背样抬高。患者觉头晕，心率125次/min，血压85/40mmHg，双肺听诊可闻及弥漫水泡音）（）。

4 急性下壁心肌梗死

8. 急性前间壁心肌梗死

。 . 心源性休克

D. 肺栓塞

E. 气胸

F. 高血压

G. 糖尿病

【答案】 A|C|F|G

【解析】 没有试题分析

3. 目前应采取的治疗有（ ）。

A. 硝酸酯类药物扩冠治疗

B. 补液治疗

。 . 毛花苷丙强心治疗

D. 阿司匹林嚼服

E. 低分子肝素皮下注射

F. 美托洛尔控制心率治疗

6. 急诊 PCI 治疗

【答案】 B|D|E|G

【解析】 没有试题分析

7. （共用题干）病历摘要： 男性， 60 岁， 在抗洪抢险一线， 突然获悉其母病故后 发生胸痛， 呈持续性压榨样疼痛， 伴大汗淋漓 2 小时入急诊。 既往有高血压病史 5 糖尿病史 10 吸烟史 40 余年。 体检： 体温 36. 7C， 脉搏 85 次/分， 呼吸 23 次/分， 血压 138/80mmHg, 心律齐， 两肺听诊无异常， 腹软， 剑突下压痛（+ ）， 肝脾未及， 四肢活动正常。

1. 急诊时的诊断应考虑哪些急性病？ （ ）

火急性胆囊炎

8. 急性胰腺炎

。 . 心绞痛

D. 高血压病

E. 糖尿病

「 • 急性心肌梗死

G. 脑卒中

H. 气胸

【答案】A|C|F

【解析】没有试题分析

2. 急诊应进行哪些主要检查？（

A. 血常规

B. 腹部平片

C. 床边心电图

D. 头颅 CT 检查

E. 血清淀粉酶测定

F. 纤维胃镜检查

G. /心肌酶学测定

H. 大便常规和潜血试验

【答案】A|B|C|E|G

【解析】没有试题分析

3. 提示：进一步体检，病人神志清楚，颈无抵抗。心肺听诊无异常，腹软，腹部无明显压痛和反跳痛，墨菲氏征阴性，叩诊肝浊音界存在，病理征阴性。血常规 WBC $10\times 10^9/L$, N80%; CK2IU/L, CK-MB24IU/L;血清淀粉酶正常；腹部 B 超，胆囊未见异常。此时可以排除下列哪些疾病？（）

4 急性胆囊炎

B. /心绞痛

。 . 急性心肌梗死

D. 脑血管意外

E. 气胸

世急性胰腺炎

G. 胃穿孔

【答案】A|D|E|F|G

【解析】没有试题分析

4. 提示：床边心电图检查发现 STV1-5 弓背向上抬高 0.3mV, STIIIIIF 压低 0.2mV。

该病人明确的诊断有哪些？（）

4 急性胆囊炎

B. 变异型心绞痛

。 . 急性心肌梗死

D. 高血压病

E. 糖尿病

「. 急性心包炎

6. 胆心综合征

【答案】C|D|E

【解析】没有试题分析

5. 此病人确诊为急性广泛前壁心肌梗死，该患者急性心肌梗死的病因和诱因是（）。

A. 劳累和情绪激动

B. 高血压病

C. 糖尿病

D. 动脉粥样硬化

E. 吸烟过量

F. 老年

G. 慢性胃炎

H. 慢性胆囊炎

【答案】A|B|C|D|E

【解析】没有试题分析

6. 此时的急诊治疗措施应包括以下哪些？（）

A. 绝对卧床

B. 持续吸氧

C. 吗啡静脉注射

D. 持续心电监护

E. 持续静脉滴注硝酸甘油

F. 定期翻身

G. 静脉注射速尿

H. 极化液的应用

【答案】A|B|C|D|E|F

【解析】没有试题分析

7. 提示：经过综合处理后，患者胸痛仍不缓解，共持续近 3 小时。拟行静脉溶栓治疗，下列哪些是溶栓的一般适应证？（）

A. 年龄 60 岁

B. 发病 3 小时

。 . 急性广泛前壁心肌梗死

D. 有高血压病

E. 有房性早搏

F. 无心力衰竭

6. 心功能 KillipIV 级

【答案】A|B|C|E|F

【解析】没有试题分析

8. 提示：经静脉滴注链激酶 150 万 IU 后，患者胸痛明显缓解。以下哪些指标是冠脉开通的临床指标？（）

A. 疼痛迅速缓解

B. /心电图恢复正常

C. 出现 Q 波

D. ST 段下降超过 50%

E. /心肌酶迅速降至正常

F. CK - MB 高峰前移

G. 冠脉造影血管通畅

H. 出现频繁室性早搏或室性心动过速

【答案】A|D|F|H

【解析】没有试题分析

9. 提示：溶栓后 1 小时，患者出现室性心动过速。此时的处理要点是什么？（）

^心律平 70mg 静脉注射

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/975014243214012122>