

# 腹腔臃肿的定义及原因

腹腔臃肿是指腹部发生了异常的肿胀和肿大。这可能由于内脏器官受损、渗出液积聚、肠道阻塞等原因引起。及时发现并合理处理腹腔臃肿非常重要, 否则可能危及生命。

sa

by s s

# 腹腔臃肿的症状

## 腹部肿胀

腹部持续性肿大,可能出现胀痛感。胃部显得鼓起,双手按压时可触及到坚实的肿块。

## 肠道功能紊乱

肠道阻塞可能导致便秘、腹泻、肠鸣等症状。患者可能感到肠道蠕动异常。

## 饮食受限

由于肿胀,患者进食时容易感到饱胀,食欲下降。一些无法消化的食物可能会引起腹痛呕吐。

## 全身性症状

严重的腹腔臃肿还可能导致乏力、体重减轻、尿量减少等全身性症状。

# 腹腔臃肿的危险性



## 生命危险

严重的腹腔臃肿可能导致内脏器官受损, 如出现肝肾功能衰竭、心力衰竭等情况, 直接威胁生命。



## 紧急需处理

腹腔臃肿如果不能及时处理, 病情可能会迅速恶化。必须尽快寻求医疗帮助, 否则后果严重。



## 并发症风险

腹腔臃肿可能引发感染、出血、休克等并发症, 进一步增加病情的复杂性和危险性。

# 急救处理的目标

## 保护生命

急救的首要目标是维持患者的生命体征, 预防生命危险情况的发生。及时采取有效措施至关重要。

## 缓解症状

控制和缓解患者的疼痛、呼吸困难、出血等症状, 减轻其痛苦和不适, 改善其生命体征。

## 防止并发症

采取相应的处理措施, 防止感染、休克等并发症的发生, 避免病情恶化和二次损伤。

## 转运就医

在采取初步急救的基础上, 尽快将患者转运到专业医疗机构进行进一步诊治和救治。

# 急救处理的步骤

1

## 评估病情

迅速评估患者的生命体征和症状, 确定病情严重程度。

2

## 保护呼吸

保持患者呼吸通畅, 必要时提供人工呼吸支持。

3

## 控制出血

采取必要的止血措施, 防止出血性休克的发生。

4

## 预防感染

给予抗生素等预防感染, 保持无菌操作, 保护伤口。

急救处理腹腔脓肿的关键步骤包括: 评估患者病情、保护呼吸道、控制出血、预防感染等。这些步骤旨在维护生命安全, 缓解症状, 避免并发症。及时采取正确的急救措施至关重要。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/975024241042011242>