康复治疗三基考试三套含答案

康复试题〔一〕

一、单项选择题

1.康复医学强调采用综合措施，包括运动、理疗、回归社会和生活独立能力的提高。

2.康复的根本内涵不包括以残疾者和患者的器质障碍为核心。

3.单轴关节包括挠腕关节、拇指腕掌关节、髋关节和肩关节，以及挠尺近侧关节。

4.一患者神经系统受损后出现静止性震颤，最有可能是基底节出现病变。

5.烧伤常用部位夹板一般疗程是3~6个月。

6.造成大腿假肢呈划弧步态的原因是假肢太长。

7.康复医学的一级预防是指健身锻炼和合理的生活惯，防止疾病的发生。

8.中国助残日是每年五月第三个星期日。

9.康复医学的共性原则不包括被动参与。

10.关于视感知发育阶段，精细区分物体阶段是指 7 个月后。

11.心电运动试验的分类不包括等长收缩试验。

12.患者，男，30 岁，因事故被热气体烧伤躯干前面和双上肢，患者水泡较小，可见网状栓塞血管，微痛，感觉较迟钝，其烧伤深度和面积为浅Ⅱ度，36%。

13.脑卒中患者偏瘫侧肢体分期处于 BrunnstromⅡ期，康复治疗措施正确的选项是控制肌痉挛和异常运动模式，促进别

离运动的出现。同时，增强患侧肢体肌力、耐力训练，增强患侧肢体平衡和协调性训练，恢复提高肌张力，诱发主动运动，控制肌痉挛，促进选择性运动和速度运动更好的恢复。

14.根据选项，制动后肌肉重量下降最明显的时间是 5~7 天，需要注意的是这个时间可能因个人情况而有所不同。

15.选项 E 表达正确，因为心理过程包括认知、情绪、意志等方面，而其他选项表述不准确。

16.正确的发育顺序是抬头、翻身、坐、爬、站、走、跑、跳跃，选项 C 正确。

17.运动型记忆出现最早，因此选项 A 正确。

18.下肢烧伤后，如果膝关节后侧受伤，应该保持伸直位，选项 E 正确。

19.韦氏智力量表中，智商等级划分正确的选项是 DIQ 80~89 为低于平常，其他选项表述不准确。

20.波长在 3cm 左右的微波主要被表皮吸收，因此选项 A 正确。

21.正常步态中，足跟着地到足放平作用于膝关节的肌群主要是股四头肌，因此选项 B 正确。

22.支撑相占步行周期的比例是 60%，因此选项 D 正确。

23.穿衣失用属于视觉定向失认，因此选项 B 正确。

24.大剂量紫外线最大的吸收光谱为 297nm，因此选项 C 正确。

25.身体各部位对紫外线的敏感性不同，敏感性最低的部位是胸、腹，因此选项 D 正确。

26.对于一个伤口肉芽新鲜的创面，为促进伤口愈合，应该使用亚红斑量的紫外线剂量，因此选项 A 正确。

27.言语功能恢复的顶峰期为失语症患者发病后 3~6 个月，因此选项 C 正确。

28.常发生惯性脱位的关节是肩关节，因此选项 A 正确。

29.一位 35 岁的建筑工人在半个月前从高处摔伤，导致 T12 骨折和双下肢截瘫。查体发现双下肢肌力为 3 级，腱反射和踝反射活泼，肌张力高。使用哪种电诊断方法可以推测患者的预后？答案为 B，包括 ABAEP、BSEP、CVEP、DMCV、ESCV。

30.神经根型颈椎病是临床上最常见的颈椎病类型。其他类型包括脊髓型、椎动脉型、交感型和混合型。

31.提心吊胆、恐惧不安的心情常见于焦虑症，这种神经症没有明确的客观对象和具体的观念内容。

32.干扰电疗法最常用的治疗技术是固定法。

33.如果某个患者的改进 Barthel 指数评分为 60 分，那么意味着他有中度功能障碍。其他评分结果包括极其严重功能障碍、严重功能障碍、根本生活自理和完全生活自理。

34.当双下肢长度差异超过 4 厘米时，可能出现跳跃步态。

35.听觉诱发电位的潜伏期范围是 0 到 4.5 秒。

36.国务院批准的“五类残疾标准”不包括内脏残疾。其他包括听力、语言残疾、视力残疾、智力残疾和肢体残疾。

37.运动性言语中枢位于额下回，它位于优势半球。

38.支配大腿内侧群肌肉的神经是闭孔神经。

39.听觉发育完善的年龄是 4 岁。

40.在超短波进行微热量治疗时，大功率治疗仪浅作用时电极皮肤间隙为 3 到 4 厘米。

二、是非题

1.错误。力点位于阻力点与支点之间，主要作用是传递动力，但不一定保持平衡。

2.正确。

3.正确。

4.错误。正常成人颈干角平均为 127 度，范围为 125 到 130 度。大于此角度不代表髋内翻。

5.正确。

6.错误。康复医学工作模式是综合医疗模式。

7.错误。床向轮椅转移时，轮椅应放在患者的健侧，轮椅与床尾呈 30 到 45 度角。

8.正确。

9.错误。癌痛2级需要口服或皮下给药止痛。肌内注射麻醉剂不是治疗癌痛的首选方法。

1.正确答案：B。XXX决定“国际残疾人年”为1981年。

2.正确答案：D。声门裂是喉腔最狭窄的部位。

3.正确答案：A。痉挛肌点刺激疗法的频率为0.66~1Hz，波宽为0.1~0.5ms。

4.正确答案：E。康复学科内团队不包括骨科医生。

5.正确答案：A。进行直流电或直流电离子导入时电极衬垫的厚度要求大于1cm。

6.正确答案：C。小儿注意力不集中，容易疲劳，是由于神经髓鞘发育不完全。

7.正确答案：E。直流电药物离子导入疗法中，有阴极导入的药物可以是维生素C、碘、氯、溴等。

8.正确答案：A。功能障碍不一定就是残疾。

9.正确答案：C。前交叉韧带的主要作用是限制胫骨向前移位。

10.正确答案：C。与脐平面的皮肤感觉区相对应的脊髓节段为T10.

11.患者为一名50岁女性，患有脑卒中后右侧肢体偏瘫。目前，她能够捏住并松开拇指，手指能够半自主地进行小范围伸展。根据Brunnstrom分期，她处于D4期。

12.丹毒又称为网状淋巴管炎。

13.前臂旋前、旋后作业训练是指拧水龙头。

14.国内超短波治疗机的常用波长为7.37m。

15.味觉发育的关键时期为4~5个月。

16.竖脊肌是最强大的脊柱伸肌。

17.鸭步常见于臀中肌无力的情况。

18.让患者从不同场景、不同角度和不同人合影的照片中寻找他熟悉的人属于面容失认训练方法。

19.对于一名右踝关节扭伤 3 天、肿胀疼痛的患者，正确的超声波治疗方法是水下法。

20.一名因车祸致右踝以下足严重损伤的 15 岁女性患者需要进行小腿中下 1/3 处的截肢手术。

21.孤独症的核心病症是社会交往能力缺陷。

22.力和力臂的乘积在物理学中表示为力矩。

23.研究能量和力对生物体影响的学科称为生物力学。

24.小儿出现初步抽象思维的年龄为 3 岁后。

25.青少年期是心理卫生保健最关键的时期。

26.人体重心位于第 2 骶骨前缘。

27.Rood 治疗技术中的特殊感觉刺激不包括应力的刺激，但训练环境要光线明亮、色彩鲜艳，具有促进作用。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/975121220043011044