

超声波医学与技术(主管技师)《肝脏和脾脏在线测试》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

1、单项选择题: 患者男性, 45 岁, 有牧区生活史, 超声检查: 肝右叶可见一个 7cm×8cm 囊性占位, 包膜较厚, 回声高, 呈双层, 囊液透声不好, 囊液中有细小的点状回声, 可随体位改变而出现滚动, 最可能的诊断是 ()。A. 肝囊肿合并感染

- B. 肝血肿
- C. 肝包虫囊肿
- D. 肝囊腺瘤
- E. 胆管囊肿合并感染

2、单项选择题: 一慢性粒细胞白血病患者, 脾明显肿大, 脾实质内见多发不均匀低回声区, 病变形状为楔形, 基底较宽位于包膜面, 尖端指向脾门, 或为三角形及不规则形, 彩色多普勒显示病变区域内无血流信号, 最可能的诊断是 ()。A. 脾血管瘤

- B. 肿瘤浸润
- C. 脾梗死
- D. 局灶性炎性病变
- E. 脾转移癌

3、单项选择题: 患者男性, 30 岁。超声检查时, 发现肝右叶有一圆形无回声暗区, 囊壁光整菲薄, 后方回声明显增强, 最可能的诊断是 ()。A. 肝血管瘤

- B. 肝内门静脉横断面
- C. 肝囊肿
- D. 肝内肝静脉横断面
- E. 肝棘球蚴囊肿

4、单项选择题: 下列表现不支持原发性肝癌的是 ()。A. 肿块可单发或多发

- B. 肿块呈同心圆征
- C. 肝内巨大实性肿块、呈镶嵌征
- D. 边界清楚的弱回声结节
- E. 多有边缘弱回声晕

5、单项选择题: 患者, 男性, 60 岁, 进食后饱胀 2 个月余, 血便。超声检查肝右叶可见 34mm×36mm 边界清楚的强回声实性肿块, 外周绕以较宽的声晕, 中心部可见不规则无回声区, 呈”同心圆”征, 其余肝组织回声稍粗糙。升结肠可见假肾状实性肿块可能的原发癌为 ()。A. 肺癌

- B. 乳腺癌
- C. 肝癌
- D. 甲状腺癌

E. 结肠癌

6、单项选择题：镶嵌征是下列哪种疾病的特征性图像（ ）。A. 转移性肝癌

B. 原发性肝癌

C. 肝母细胞瘤

D. 肝囊腺瘤

E. 肝腺瘤

7、单项选择题：患者，32 岁，车祸后 3 小时，左侧肋骨骨折，血压正常。

该患者急行超声检查可见：腹腔大量液性暗区，脾周片状液性暗区，肝肾间隙条状液性暗区，盆腔片状液性暗区，脾被膜连续中断，此时可诊断为（ ）。A. 真性脾破裂

B. 中央破裂

C. 被膜下血肿

D. 被膜下血肿合并中央破裂

E. 边缘破裂

8、单项选择题：关于脾脏的测量，错误的是（ ）。A. 测量脾脏厚径时，需显示脾门和脾静脉

B. 脾脏显示最长时其下极最低点至下极最高点的距离为脾脏长径

C. 显示横断面图像，可测量其横径

D. 脾长轴断面呈类三角形，三角形的底为脾厚径

E. 测量自脾门垂直于脾对侧缘的距离为脾厚径

9、单项选择题：以下哪一项不是肝脓肿常见的声像特点（ ）。A. 病变区不均匀的中、低回声

B. 边界模糊

C. 壁较厚但光滑

D. 腔多呈典型液性暗区

E. 腔内可见较高的点状或斑片状回声

10、单项选择题：关于脾脏的描述，错误的是（ ）。A. 位于左季肋部稍靠后方的横膈下

B. 外形似蚕豆或较扁的半球状

C. 脏面近中央处呈略凹陷状为脾门

D. 脾脏长轴自右后向左前斜行

E. 脾脏前缘有 2~3 个切迹

11、单项选择题：患者男性，45 岁。因左上腹及锁骨上淋巴结肿大就诊，经淋巴结活检确诊为非霍奇金淋巴瘤，超声见脾脏增大，内可见小而弥漫的低回声小结节，最可能的诊断是（ ）。A. 脾血管瘤

B. 脾梗死

C. 脾脏恶性淋巴瘤

D. 脾血管内皮肉瘤

E. 脾错构瘤

12、单项选择题：下面对肝血管瘤的描述，错误的是（ ）。A. 呈圆球状、椭圆形或不规则形

B. 呈高回声、低回声、混合回声及无回声型

C. 内部及周边血流丰富

D. 较小高回声型呈浮雕状改变

E. 加压变形

13、单项选择题：以下对肝囊肿的描述，错误的是（ ）。A. 类圆形的无回声区

B. 囊壁菲薄、光滑、整齐

C. 内部透声良好的无回声

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/975203024210011212>