2021-2022 药学类之药学（中级）通关题库(附带答案)

单选题（共 80 题）

1、在用药过程中需要密切监测肝功能变化的药物是

A.酮康唑

B.庆大霉素

C.甲氧苄啶

D.去甲万古霉素

E.两性霉素 B

【答案】 A

2、采用凝胶法进行细菌内毒素检查时所用水应是

A.内毒素含量小于 0.015EU/ml 的灭菌注射用水

B.内毒素含量小于 0.03EU/ml 的灭菌注射用水

C.蒸馏水

D.纯化水

E.生理盐水

【答案】 A

3、属于特殊药品的有

A.毒性药品、麻醉药品、精神药品、放射药品

B.毒性药品、麻醉药品、急诊药品

C.毒性药品、一类精神药品、二类精神药品、贵重药品

D.抢救药品、麻醉药品、急诊药品

E.贵重药品、急诊药品

【答案】 A

4、突触前神经元轴突末梢释放神经递质是哪种离子内流诱发的

A.Ca2+

B.Na+

C.Cl-

D.K+

E.H+

【答案】 A

5、盐酸氟西汀属于哪一类抗抑郁药

A.去甲肾上腺素重摄取抑制剂

B.单胺氧化酶抑制剂

C.阿片受体抑制剂

D.5-羟色胺再摄取抑制剂

E.5-羟色胺受体抑制剂

【答案】 D

6、制备维生素 C 注射液时，加入亚硫酸氢钠是作为

A.防腐剂

B.矫味剂

C.乳化剂

D.抗氧剂

E.助悬剂

【答案】 D

7、治疗震颤麻痹最佳联合用药是（　　）。

A.多巴＋卡比多巴

B.左旋多巴＋卡比多巴

C.左旋多巴＋维生素 B6

D.卡比多巴＋维生素 B6

E.氯丙嗪＋左旋多巴

【答案】 B

8、药物作用强弱，主要取决于

A.吸收速度

B.消除速度

C.血浆蛋白结合

D.剂量

E.零级或一级消除动力学

【答案】 D

9、用作口服降血糖药的是

A.奥美拉唑

B.格列本脲

C.盐酸西替利嗪

D.呋塞米

E.卡托普利

【答案】 B

10、《中国药典》规定，参照细菌内毒素检查法检查，每 1000 青霉素单位中含细菌内毒素的量应小于

A.0.01EU

B.0.10EU

C.0.001EU

D.0.20EU

E.0.02EU

【答案】 B

11、下列关于氟烷描述错误的是

A.诱导期短，苏醒快

B.肌肉松弛作用较强

C.对呼吸道刺激明显

D.反复应用或可引起肝损伤

E.不增加心肌对儿茶酚胺的敏感性

【答案】 C

12、某弱酸药在 pH=5 时的非解离部分为 90.9%，其的近似值是

A.6

B.5

C.4

D.3

E.2

【答案】 A

13、能形成W/O型乳剂的乳化剂是

A.阿拉伯胶

B.硬脂酸钠

C.氢氧化钙

D.聚山梨酯80

E.十二烷基硫酸钠

【答案】 C

14、两性霉素B静脉滴注常引起寒战、高热、头痛、恶心、呕吐等症状，下列措施不能使其减轻的是

A.合用庆大霉素

B.抗组胺药物

C.地塞米松

D.减少用量或减慢滴注速度

E.解热镇痛药物

【答案】 A

15、泮库溴铵为

A.β-内酰胺抗生素

B.抗胃和十二指肠溃疡的药物

C.肌松药

D.降血糖药

E.降血脂药

【答案】 C

16、阿司匹林为

A.第一阶梯轻度疼痛用药

B.第二阶梯中度疼痛用药

C.第三阶梯重度疼痛用药

D.严重疼痛用药

E.轻微疼痛用药

【答案】 A

17、医师签名属于

A.处方内容正文

B.处方内容后记

C.处方内容主体

D.医嘱

E.处方内容前记

【答案】 B

18、关于药物稳定性叙述正确的是

A.通常将反应物消耗一半所需的时间称为有效期

B.大多数药物的降解反应可用零级、一级反应进行处理

C.药物降解反应是一级反应，药物有效期与反应物浓度有关

D.大多数情况下反应浓度对反应速率的影响比温度更为显著

E.温度升高时，绝大多数化学反应速率降低

【答案】 B

19、药物经济学分析方法中，以某一特定的临床治疗目的为衡量指标，并据此计算和比较成本与效果比率或每单位效果所需费用的方法是（　　）。

A.成本-效果分析

B.成本-效益分析

C.成本-效用分析

D.最小成本分析

E.最大效益分析

【答案】 A

20、仅对蛔虫、蛲虫混合感染有效的是

A.甲苯咪唑

B.氯硝柳胺

C.吡喹酮

D.哌嗪

E.噻嘧啶

【答案】 D

21、渗透泵型片剂控释的基本原理是

A.片外渗透压大于片内，将片内药物压出

B.片剂膜内渗透压大于片剂膜外，将药物从细孔压出

C.片剂外面包控释膜，使药物恒速释出

D.减小溶出

E.减慢扩散

【答案】 B

22、伴有支气管哮喘的心绞痛患者不宜选用

A.普萘洛尔

B.硝酸甘油

C.维拉帕米

D.双嘧达莫

E.以上均可用

【答案】 A

23、"医方是一种专家形象，在双方关系中居于完全主动地位；而患者对医学知识一知半解、甚至一无所知，处于被动地位，完全听命于医方发出的指令"反映的是( )的医患关系。

A.指导合作型

B.主动被动型

C.消费型

D.共同参与型

【答案】 B

24、首剂效应是指

A.指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应

B.是指药物治疗过程中所发生的任何不幸的医疗卫生事件，而这种事件不一定与药物治疗有因果报应关系

C.因先天性遗传异常，少数病人用药后发生与药物本身药理作用无关的有害反应

D.一些病人在初服某种药物时，由于机体对药物作用尚未适应而引起不可耐受的强烈反应

E.药物或药物在体内的代谢产物作为抗原刺激机体而发生的不正常的免疫反应

【答案】 D

25、阴凉处温度应保持在

A.2～10℃

B.0～10℃

C.≤20℃

D.≤25℃

E.≤30℃

【答案】 C

26、患者女，76 岁。曾患抑郁症，因高血压、糖尿病、双下肢水肿入院治疗，入院时血压 180/110mmHg，血糖 15.3mmol/L，给予卡托普利、氢氯噻嗪、胰岛素、文拉法辛治疗 10 日后，血压无明显下降，开始出现刺激性干咳，给予异丙嗪治疗效果不理想，血糖波动较大，下肢脚趾关节出现疼痛。

A.加用强效利尿剂

B.停用卡托普利

C.停用氢氯噻嗪

D.加大异丙嗪用量

E.加用钙拮抗剂

【答案】 C

27、反复用药后病原体对药物的反应性降低的是

A.精神依赖性

B.成瘾性

C.抗药性

D.两重性

E.耐受性

【答案】 C

28、螺内酯

A.可导致听力减退和暂时性耳聋

B.可引起女性面部多毛、男性乳房女性化

C.可致血糖升高

D.可引起巨幼红细胞性贫血

E.可致颅内出血加重

【答案】 B

29、以下药物无明显紫外吸收者为

A.维生素 B

B.维生素 E 的正己烷溶液

C.异戊巴比妥的酸性溶液

D.维生素 C 溶液

E.维生素 A 的异丙醇溶液

【答案】 C

30、关于紫外分光光度法叙述错误的是

A.紫外分光光度法是药物含量测定中较为常用的方法

B.紫外分光光度法分为对照品比较法和吸收系数法

C.紫外分光光度计主要由光源、单色光器、吸收池、检测器、显示器等五个部件构成

D.配有玻璃吸收池和石英吸收池各一套，可见光区使用 1cm 石英吸收池，紫外光区使用 1cm 玻璃吸收池

E.紫外分光光度计按其光学系统可分为单波长分光光度计和双波长分光光度计

【答案】 D

31、传统眼膏基质主要是由哪些材料组成的

A.聚乙二醇、羊毛脂

B.聚维酮

C.可可豆脂

D.黄凡士林、羊毛脂、液状石蜡

E.乙基纤维素

【答案】 D

32、女性，65 岁，诊断为高血压病 2 级，很高危组，III度房室传导阻滞，心力衰竭Ⅱ度，2 型糖尿病，查体：血压 165/95 mmHg，心率 100 次 / 分，面部潮红，辅助检查：钾离子：3.3 mmol/L，血尿酸升高，微量白蛋白尿，则该患者最适宜选用的降压药物为

A.氢氯噻嗪

B.贝那普利

C.普萘洛尔

D.硝苯地平

E.维拉帕米

【答案】 B

33、对青霉素过敏的革兰阳性菌感染者可用

A.以上都可以

B.氨苄西林

C.苯唑西林

D.红霉素

E.羧苄西林

【答案】 D

34、氨甲苯酸的作用机制是

A.抑制纤维蛋白酶原

B.抑制纤维蛋白酶原的激活因子

C.增加血小板聚集

D.促进肝脏合成凝血酶原

E.促进纤维蛋白溶解

【答案】 B

35、反复用药后病原体对药物的反应性降低的是

A.精神依赖性

B.成瘾性

C.抗药性

D.两重性

E.耐受性

【答案】 C

36、药品不良反应报告制度具体办法的制定部门是

A.卫生行政部门和中医药管理局

B.药品监督管理部门会同安全监管部门

C.药品监督管理部门会同卫生行政部门

D.卫生行政部门会同药品监督管理部门

E.中医药管理局会同国务院办公厅

【答案】 C

37、DNA 的功能是

A.复制的模板和基因转录的模板

B.反转录的模板

C.翻译的模板

D.翻译和反转录的模板

E.以上都不是

【答案】 A

38、脂质体的制备方法

A.研合法、熔和法和乳化法

B.热溶法

C.熔融法

D.薄膜分散法

E.分散法

【答案】 D

39、关于医疗机构的管理不正确的是

A.应当向患者提供所用药品的价格清单

B.应当按照规定的办法如实公布其常用药品的价格

C.购进药品，必须有真实、完整的药品购销记录

D.审核和调配处方的药剂人员必须是药师以上职称的药学技术人员

E.向患者提供的药品应当与诊疗范围相适应，并凭执业医师的处方调配

【答案】 A

40、抗过敏性休克时的首选药物是

A.肾上腺素

B.麻黄碱

C.去甲肾上腺素

D.异丙肾上腺素

E.多巴胺

【答案】 A

41、可致牙齿黄染的药物是

A.青霉素

B.四环素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/977126010136006110