

2024 年海南省吉阳区《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题内部题库【精练】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 氟马西尼用于解救的是（）

- A: 氰化物中毒
- B: 汞中毒
- C: 三唑仑中毒
- D: 有机磷中毒

答案：C

2. 饮酒可导致患者对该药的耐受性降低的药物是

- A: 卡马西平
- B: 苯妥英钠
- C: 维生素 B
- D: 利血平

答案：A

3. 适用于 L-dopa 治疗伴发疗效减退、症状波动的患者

- A: 左旋多巴
- B: 苯海索
- C: 恩托卡朋
- D: 司来吉兰

答案：C

4. 一般情况下，以洗胃方式解救经口中毒的有效时间是

- A: 中毒后 4~6 小时以内
- B: 中毒后 2~4 小时以内
- C: 中毒后 6~8 小时以内
- D: 毒物经口进入体内 4~6 小时以内

答案：D

5. 非甾体抗炎药的不良反应，偶可致无菌性脑膜炎

- A: 塞来昔布
- B: 布洛芬
- C: 保泰松
- D: 美洛昔康

答案：B

6. 患者，男，66 岁，身高 170cm，体重 85kg，以“头晕、胸闷、乏力 1 周”为主诉入院治疗。空腹血糖 11.2mmol / L，餐后血糖 16.5mmol / L。诊断结果：2 型糖尿病。既往有磺胺类药过敏史，一直服用硝苯地平控释片、辛伐他汀片、阿司匹林肠溶片控制高血压和冠心病。医师处方：二甲双胍 0.5gbid、消渴丸 10 丸（规格 30g / 120 丸）bid、罗格列酮 4mgqd 治疗。

- A: 磺胺类药过敏史患者不宜服用消渴丸
- B: 罗格列酮给药剂量不合理
- C: 消渴丸给药频次不合理
- D: 二甲双胍给药频次不合理

答案：A

7. (2021 年真题) 患者，男，59 岁，诊断为 2 型糖尿病，因口服降糖药疗效欠佳，给予预混胰岛素 30R 注射液。关于该患者用药教育的说法，错误的是 ()

- A: 未开启的胰岛素制剂应冷藏保存，冷冻后不可再使用
- B: 使用前应缓慢摇匀，确保给药剂量准确
- C: 胰岛素笔芯启用后不宜冷藏保存
- D: 应警惕发生低血糖，提醒患者随身携带木糖醇糖果

答案：D

8. 用于铜中毒的解毒剂是

- A: 乙酰胺
- B: 青霉胺
- C: 硫酸阿托品
- D: 维生素 K1

答案：B

9. 成人空腹血糖正常参考区间是

- A: 3.7~6.1mmol/L
- B: 3.5~6.1mmol/L
- C: 3.9~6.1mmol/L
- D: 3.3~5.5mmol/L

答案：C

10. 非甾体抗炎药的不良反应，可致肝损害，产生黄疸、肝炎

- A: 布洛芬
- B: 美洛昔康
- C: 保泰松
- D: 塞来昔布

答案：C

11. 促进尿酸排泄，用于痛风慢性期，应早餐后服用的药物是

- A: 苯溴马隆
- B: 非布司他
- C: 枸橼酸氢钾钠
- D: 拉布立酶

答案：A

12. 患者，男，35 岁，髋关节置换术后 7 天，患者右侧下肢肿胀、疼痛，抬高患肢后可好转。

- A: 华法林
- B: 肝素
- C: 利伐沙班
- D: 氯吡格雷

答案：D

13. 肝硬化患者应用利多卡因，可引起严重中枢神经系统疾病，引起药源性疾病的因素主要为

- A: 年龄因素
- B: 性别因素
- C: 遗传因素
- D: 基础疾病因素

答案：D

14. 服用药物对粪外观的影响，水杨酸钠

- A: 红至黑色
- B: 变红或黑色

C: 橘红至红色

D: 黄色

答案：A

15. 下列药物中，可经脑脊液途径给药的为

A: 氟尿嘧啶

B: 塞替派

C: 甲氨蝶呤

D: 长春新碱

答案：C

16. (2019 年真题) 患者，男，47 岁，2 型糖尿病史，饮食不规律，近期因口服降糖药疗效不佳欲改为三餐前即刻使用胰岛素或胰岛素类似物控制血糖，应选用的药物是

A: 普通胰岛素

B: 低精蛋白锌胰岛素

C: 门冬胰岛素

D: 精蛋白锌胰岛素

答案：C

17. 胰岛素的给药时间适宜餐前 5~10 分钟给药的胰岛素制剂种类是

A: 门冬胰岛素

B: 精蛋白锌胰岛素

C: 普通胰岛素

D: 赖脯胰岛素

答案：A

18. 前记

- A: 主要实验室数据
- B: 临床诊断、费别
- C: 对药物治疗的建设性意见与结果评价
- D: 医师签名、药品金额

答案：B

19. (2019 年真题) 患者，男，62 岁，无吸烟饮酒史，患高血压、高脂血症数年，未治疗。半年前就诊，查肝肾功能正常，按医嘱服用阿托伐他汀、氨氯地平。服药一个月后复查肝功能结果显示：AST145U/L，ALT134U/L，排除了其他疾病因素后，停用阿托伐他汀，肝功能逐步恢复正常。一个月后改用普伐他汀，再次出现肝功能异常。肝功能异常的不良反应与他汀类药物之间的因果关系应评价为

- A: 可能无关
- B: 肯定
- C: 很可能
- D: 可能

答案：B

20. 患者，男，72 岁既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。一个月前因出现哮喘症状就诊医师布地奈德气雾剂 200 μ g bid 吸入沙丁胺醇气雾剂 100 μ g prn 吸入，氨氯地平片 5mg qd 口服及硝酸甘油片 0.5mg prn 舌下含服治疗。

- A: 缬沙坦
- B: 维拉帕米
- C: 普萘洛尔
- D: 非洛地平

答案：A

21. 目前推荐治疗失眠的一线药物为（）

- A: 多塞平
- B: 硝西泮
- C: 艾司唑仑
- D: 佐匹克隆

答案：D

22. 能够影响叶酸利用障碍的药物有

- A: 甲氨蝶呤
- B: 苯乙双胍
- C: 秋水仙碱
- D: 二甲双胍

答案：A

23. 慢性肾盂肾炎治疗的关键是

- A: 延长给药疗程
- B: 积极寻找并去除易感因素
- C: 选用敏感抗菌药物
- D: 联合使用抗菌药物

答案：B

24. 脂溶性维生素吸收减少，是由于

- A: 脂肪组织随年龄增长而增加，血浆白蛋白浓度降低
- B: 胆汁分泌缺乏
- C: 肝药酶活性的个体化差异影响大于年龄的增长
- D: 肾功能随年龄增长而减退

答案：B

25. 以下抗菌药物中，适宜用于儿童患者的是

- A: 氟喹诺酮类
- B: 四环素
- C: 万古霉素
- D: 青霉素

答案：D

26. 舒肝丸与甲氧氯普胺合用

- A: 合用后抑制后者吸收，降低疗效
- B: 合用抑制呼吸，易致呼吸衰竭
- C: 合用后增加毒性，出现药物中毒
- D: 两者合用作用相反，互相降低药效

答案：D

27. 关于血清天冬氨酸氨基转移酶的叙述正确的是

- A: 天冬氨酸氨基转移酶 (AST) 与丙氨酸氨基转移酶 (GPT) 是同一概念
- B: 在慢性肝炎尤其是肝硬化时，AST 升高的幅度不如 ALT
- C: 天冬氨酸氨基转移酶主要存在于心肌、肝、肾、骨骼肌、胰腺等组织细胞中，同时也存在于正常人的血浆、胆汁、脑脊液及唾液中
- D: 天冬氨酸氨基转移酶的测定值只反映肝脏的功能

答案：C

28. 急性尿失禁首选哪种药物

- A: 钙通道阻滞剂
- B: 非甾体抗炎药
- C: 抗胆碱能药物
- D: 选择性 α_1 受体激动药

答案：C

29. 肠外营养 1g 氮能提供的热量是

A: 7kcal

B: 4kcal

C: 9kcal

D: 3kcal

答案：B

30. 使用后不能饮酒或含酒精饮料，以免发生“双硫仑样反应”的药物是

A: 甲硝唑含漱液

B: 西地碘含片

C: 氯己定含漱液

D: 地塞米松粘贴片

答案：A

31. 正常情况下，人血白细胞群体中占比例最小的分类细胞是

A: 嗜酸性粒细胞

B: 单核细胞

C: 嗜碱性粒细胞

D: 淋巴细胞

答案：C

32. 患者，女，72 岁，近一个月出现入睡困难，多梦易醒，尝试非药物治疗效果不明显，推荐的药物治疗方案是

A: 地西泮 5mgpoqn

B: 氯硝西泮 2mgpoqn

C: 苯巴比妥 100mgpoqn

D: 扎来普隆 5mgpoqn

答案: D

33. 耳蜗神经损伤及耳毒性

A: 阿奇霉素

B: 庆大霉素

C: 米诺环素

D: 氯霉素

答案: B

34. 患者通过电话、网络或信件询问是

A: 质问方式

B: 指令方式

C: 被动方式

D: 主动方式

答案: C

35. (2016 年真题) 患者，男，身高 180cm，体重 90kg，腰围 100cm，
其体重指数 (BMI) 是 ()。

A: 20

B: 18

C: 30.2

D: 27.8

答案: D

36. 无并发症的普通感冒一般几天后可痊愈

A: 5~10 日

B: 5~7 日

C: 2~3 日

D: 3~4 日

答案：B

37. 关于口腔溃疡药物治疗的说法,错误的是 ()

A: 氯己定如含漱液,每次 15-20ml,一日 2~3 次含漱

B: 复方甘菊利多卡因凝胶局部涂敷,一日 3 次,稍加按摩。

C: 补充复合维生素 B 和维生素 C 有利于促进溃疡面愈合

D: 西地碘含片,一次 6mg 一日 4 次含服

答案：D

38. 原发性蛛网膜下腔出血的常见病因为 ()

A: 动脉炎

B: 脑血管畸形

C: 颅内动脉瘤

D: 高血压性动脉硬化

答案：C

39. 药物临床评价是指

A: 对药品治疗效果、不良反应、用药方案、贮存稳定性及药品经济学的评估

B: 对药物临床前研究的一切新药申报资料的真实性和科学性进行的评估

C: 新药上市以后对药品的理化性质、质量和价格的评估

D: 新药临床研究在未上市以前进行的利益与风险关系的评估

答案：A

40. 儿童 2 型糖尿病患者宜选用的药物是

- A: 罗格列酮
- B: 阿卡波糖
- C: 二甲双胍
- D: 格列喹酮

答案：C

41. 心血管疾病患者感冒时退热建议选用的药物是

- A: 奥司他韦
- B: 布洛芬
- C: 金刚烷胺
- D: 对乙酰氨基酚

答案：D

42. 慢性痛风和痛风性肾病为抑制尿酸生成可选用

- A: 秋水仙碱
- B: 别嘌醇
- C: 苯溴马隆
- D: 泼尼松龙

答案：B

43. 为保障用药安全，需要进行血药浓度监测的药物是

- A: 罗红霉素
- B: 地高辛
- C: 青霉素
- D: 对乙酰氨基酚

答案：B

44. 下列有关焦虑症的叙述，错误的是

- A: 社交焦虑障碍严重者可表现为回避社交，导致社交隔离
- B: 大多数焦虑症起源于儿童或者青春期
- C: 惊恐发作是焦虑症最常见的表现形式
- D: 焦虑症有家族聚集性，女性焦虑症的患病率较高

答案：C

45. 对衣物或毛发具有氧化漂白作用，应尽量避免接触的痤疮治疗药是

- A: 过氧化苯甲酰
- B: 维 A 酸
- C: 口服短效避孕药
- D: 米诺环素

答案：A

46. 血常规是最常用的医学检查指标，血常规异常可提示人们罹患某些疾患荨麻疹患者常出现的血常规检查异常是

- A: 血红蛋白减少
- B: 中性粒细胞增多
- C: 血小板计数增多
- D: 嗜酸性粒细胞增多

答案：D

47. 可迅速崩解和释放药物的制剂

- A: 滴丸剂
- B: 透皮贴剂
- C: 泡腾片剂
- D: 膜剂

答案：C

48. 女，37 岁，前来药店购买退热药，药师应进行的咨询与指导，错误的是

- A: 如果得知顾客为本人购药，且已经服用过对乙酰氨基酚 3 日，症状未缓解，药师可建议患者联合服用布洛芬口服液
- B: 顾客告知自己母亲 72 岁，有慢阻肺病史，昨日出现头痛、肌肉酸痛、咽痛、咳嗽，前来替母亲购药，药师应建议顾客带家属就医，不宜自我药疗
- C: 如果顾客购买对乙酰氨基酚口服液，应告知患者 3 天后症状未缓解需及时就医
- D: 若经过咨询得知顾客是为家里 3 岁女儿购买，不应推荐阿司匹林

答案：A

49. 单侧头痛伴光敏感、恶心、呕吐提示

- A: 脑血管意外
- B: 脑肿瘤
- C: 偏头痛
- D: 脑膜炎

答案：C

50. 关于胃黏膜保护剂胃舒平的服药方式，正确的是

- A: 直接吞咽
- B: 餐后服用
- C: 宜多饮水，减轻刺激
- D: 餐前服用，充分咀嚼后咽下

答案：D

51. 病毒性肝炎、肝硬化等可引起

- A: 尿蛋白检测阳性

- B: 尿胆红素检测阳性
- C: 尿酸碱度降低
- D: 尿酸碱度增高

答案：B

52. 用量过大可引起低血糖反应的是

- A: 胰岛素
- B: 甲状腺素
- C: 炔雌醇
- D: 糖皮质激素

答案：A

53. 可引起血小板减少症的抗肿瘤药物是

- A: 利巴韦林
- B: 阿昔洛韦
- C: 甲氨蝶呤
- D: 阿洛司琼

答案：C

54. 患者女 45 岁，既往有心律失常(Q-T 间期延长)、低钾血症近日因发热、咳嗽、咳痰就诊，诊断为社区获得性肺炎。该患者不宜选用的药物是()

- A: 莫西沙星
- B: 阿莫西林
- C: 头孢呋辛酯
- D: 氨溴索

答案：A

55. 可以导致中性粒细胞减少的药物是

- A: 甲巯咪唑
- B: 头孢氨苄
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 辛伐他汀

答案：A

56. (2015 年真题) 处方中“餐后给药”的外文缩写是 ()。

- A: qn
- B: Ac
- C: pc
- D: po

答案：C

57. 患者，男性，30 岁，确诊为支气管哮喘，入院治疗 3 周，经正规治疗病情缓解，仅偶有胸闷，出院时医生嘱咐了一些用药注意事项。

- A: 异丙托溴铵气雾剂
- B: 酮替酚
- C: 二丙酸倍氯米松气雾剂
- D: 特布他林气雾剂

答案：C

58. 属于单胺氧化酶抑制剂的药品是

- A: 奥美拉唑
- B: 度洛西汀
- C: 雷尼替丁
- D: 吗氯贝胺

答案：D

59. 患者，男，38 岁，因“心房颤动”服用华法林治疗 2 年余，后因抑郁使用氟西汀，用药后 INR 升高并出现咳血症状，出现该症状的主要原因是

- A: 氟西汀具有较强的血浆蛋白结合力，导致血中游离的华法林浓度升高
- B: 氟西汀可增加华法林的吸收，导致华法林血药浓度升高
- C: 氟西汀可抑制 CYP2C9，导致华法林血药浓度升高
- D: 氟西汀抑制华法林的肾脏排泄，导致华法林血药浓度升高

答案：A

60. 口服避孕药对机体代谢的影响，正确的为

- A: 低密度脂蛋白升高
- B: 甘油三酯降低
- C: 糖耐量异常
- D: 高密度脂蛋白降低

答案：C

61. 静脉注射两性霉素 B 的适宜溶媒是

- A: 0.9%氯化钠注射液
- B: 50%葡萄糖注射液
- C: 5%葡萄糖注射液
- D: 复方氨基酸注射液

答案：C

62. 患者，女，21 岁，未婚，患有甲状腺功能亢进症，应用丙硫氧嘧啶 150mg tid 治疗 4 个月后，出现体重增加，乏力，怕冷，突眼加重，治疗方案应该调整为()

- A: 换用另一种抗甲状腺药物
- B: 放射性 I
- C: 加大丙硫氧嘧啶用量
- D: 丙硫氧嘧啶减量并加甲状腺素片

答案：D

63. 代表乙型肝炎病毒表面抗体的是

- A: HBcAb
- B: HBeAg
- C: HBsAb
- D: HBeAb

答案：C

64. 属于容积性泻药的是

- A: 硫酸镁
- B: 乳果糖
- C: 开塞露
- D: 番泻叶

答案：A

65. 每 1 疗程期间应停药 3 天的是

- A: 泼尼松
- B: 别嘌醇
- C: 秋水仙碱
- D: 苯溴马隆

答案：C

66. 一般来讲，细菌药敏试验的报告不包括

- A: 涂片、培养鉴定
- B: 临床信息（送检科室、临床诊断、标本类型等）
- C: 临床治疗方案
- D: 药敏试验（细菌名称、药物通用名、试验方法以及敏感结果判定）

答案：C

67. 冠心病二级预防的“ABCDE”方案中，“D”是指

- A: 阿司匹林和 ACEI
- B: β 受体阻断剂和血压控制
- C: 健康教育和运动
- D: 控制饮食和糖尿病

答案：D

68. 应用华法林抗凝过程中，出现严重出血时，可应用急救的药物是

- A: 维生素 K1
- B: 维生素 K4
- C: 维生素 B1
- D: 维生素 K3

答案：A

69. 抗真菌药

- A: 中性粒细胞减少
- B: 血红蛋白量增多
- C: 血小板减少
- D: 嗜酸性粒细胞减少

答案：A

70. 不宜与蛋白质食物合用的药物是

- A: 左旋多巴
- B: 辛伐他汀
- C: 硫酸亚铁
- D: 磺胺类药物

答案：A

71. (2017 年真题) 治疗滴虫性阴道炎首选的药物是 ()

- A: 伏立康唑片
- B: 莫匹罗星软膏
- C: 吡哆美辛栓
- D: 甲硝唑栓

答案：D

72. 无治疗指征补钙

- A: 盲目联合用药
- B: 非适应证用药
- C: 过度治疗用药
- D: 超适应证用药

答案：C

73. 患者,女,30 岁,既往体健,无癫痫病史怀孕 8 个月,突然出现抽搐,从小腹开始,发展至全身,口唇发绀,意识丧失,诊断为子痫,应选用的治疗方法是 ()

- A: 5%氯化钙注射液静脉滴注
- B: 50%葡萄糖注射液湿敷
- C: 25%硫酸镁注射液稀释后静脉注射
- D: 50%硫酸镁溶液口服

答案：C

74. 敌百虫中毒应

- A: 禁止使用肟类复能剂
- B: 不宜用碳酸氢钠溶液洗胃
- C: 静脉注射毒毛花苷 K 或毛花苷丙
- D: 静脉滴注烟酰胺

答案：B

75. 下列关于巨幼细胞性贫血的说法错误的是()

- A: 全胃切除的巨幼细胞性贫血患者需要终生维持治疗
- B: 老年人和酗酒者为高危人群
- C: 可静脉滴注维生素 B₁₂100~500 μg
- D: 恶性贫血者需要终生维持治疗

答案：C

76. 小檗碱、盐酸地芬酯、八面体蒙脱石用于细菌性腹泻，应评判为

- A: 联合用药不适宜
- B: 过度治疗用药
- C: 无适应证用药
- D: 有禁忌证用药

答案：A

77. (2018 年真题) 可以引起视物模糊、红绿色视野受限的药物是()

- A: 链霉素
- B: 对氨基水杨酸钠
- C: 异烟肼
- D: 乙胺丁醇

答案：D

78. 糖尿病患者尿常规检查可发现

- A: 尿葡萄糖阳性
- B: 尿胆红素阳性
- C: 尿血红蛋白阳性
- D: 尿淀粉酶增高

答案：A

79. 心律失常患者用药治疗期间应该禁用的是

- A: 浓茶
- B: 咖啡
- C: 烟
- D: 酒

答案：A

80. 高血压合并心力衰竭高血压患者的降压目标

- A: <120 / 80mmHg
- B: <130 / 80mmHg
- C: <140 / 90mmHg
- D: <150 / 90mmHg

答案：C

81. 茶碱、咖啡因、可卡因等容易引起癫痫发作，属于

- A: 药源性肾损害
- B: 药源性血损害
- C: 药源性神经损害
- D: 药源性肝损害

答案：C

82. 应用患儿年龄、体重或体表面积等计算用药剂量，显示儿童用药应该

- A: 密切监护
- B: 严格掌握用药剂量
- C: 根据儿童特点选择适宜的给药方案
- D: 避免食物的影响

答案：B

83. 患者，女，71 岁，2 型糖尿病史 10 年。化验结果糖化血红蛋白 (HbA) 9.2%，空腹血糖 10.5mmol/L，餐后血糖 15.5mmol/L。目前服用二甲双胍片 0.5gtidpo，格列美脲片 2mgtidpo，罗格列酮片 2mgbidpo，甲钴胺片 0.5mgtidpo，羟苯磺酸钙胶囊 250mgbidpo。

- A: 立刻口服糖水或糖块
- B: 立刻舌下含服硝酸甘油片
- C: 立刻服用美托洛尔片
- D: 立刻喝白开水 200mL

答案：A

84. 以下评判为"过度治疗用药"的处方用药中，正确的是

- A: 忽略病情和患者的基础疾病
- B: 滥用糖皮质激素、白蛋白、二磷酸果糖
- C: 盲目而无效果地应用肿瘤辅助治疗药
- D: 应用两种或两种以上一药多名的药物

答案：B

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

85. 某患者，女性，28 岁，近半年出现面色苍白、头晕、乏力，近日头晕加重，并出现心慌、气短，到医院就诊，血常规检查示 $Hb < 90g / L$ 。

- A: 维生素
- B: 氨基酸
- C: 维生素 B1
- D: 奥美拉唑

答案：D

86. 利大于弊才有实际意义体现

- A: 规范性
- B: 安全性
- C: 有效性
- D: 经济性

答案：C

87. （2021 年真题）患者，女，58 岁，诊断为骨性关节炎，经洛索洛芬单药治疗疼痛缓解不理想可联合使用的药物是（）

- A: 双氯芬酸
- B: 曲马多
- C: 美洛昔康
- D: 阿司匹林

答案：B

88. 氟乙酰胺中毒的特效解毒剂是

- A: 青霉胺
- B: 维生素 K

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》资格考试必刷 200 题题库，word 格式
可自由下载编辑，附完整答案！

C: 乙酰胺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/978033107044007022>