

广东省江海区《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题大全带答案（基础题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 能改善眼部干燥症状,缓解视疲劳的药物是()

- A: 聚乙烯醇滴眼
- B: 山莨菪碱滴眼液
- C: 硫酸锌滴眼液
- D: 可的松滴眼液

答案: A

2. 对于绝经综合征患者,可根据患者的病情或用药需求,采用不同的药物制剂或给药方式进行绝经激素治疗(MHT)

- A: 戊酸雌二醇 / 雌二醇-醋酸环丙孕酮片
- B: 雌二醇 / 雌二醇-地屈孕酮片
- C: 雌二醇一屈螺酮片
- D: 17 β 一雌二醇

答案: C

3. 服用后容易引起结晶尿,药师在指导用药时应告知患者多饮水的药物是:

- A: 红霉素
- B: 磺胺甲恶唑
- C: 阿奇霉素
- D: 头孢呋辛

答案：B

4. 可用于治疗口腔溃疡，大剂量服用后，尿液可能呈黄色的药物是

A: 复合维生素 B

B: 维生素 C

C: 维生素 A

D: 维生素

答案：A

5. 严重烧伤患者尿常规检查可发现

A: 尿葡萄糖阳性

B: 尿胆红素阳性

C: 尿血红蛋白阳性

D: 尿淀粉酶增高

答案：C

6. 恢复期

A: 1~6 个月

B: 1~3 个月

C: 2 周

D: 1 个月内

答案：A

7. (2021 年真题) 患者，女，65 岁，体检结果示：低密度脂蛋白胆固醇 5.7mmol/L，颈动脉粥样硬化斑块，宜选用的药物是 ()

A: 氢氯噻嗪

B: 阿托伐他汀

C: 丙硫氧嘧啶

D: 甲巯咪唑

答案：B

8. 患者，男，72 岁，既往有高血压、心绞痛、心力衰竭、房室传导阻滞和胃溃疡病史。1 个月前因出现哮喘症状就诊。医师处方：布地奈德气雾剂 200 μ g bid 吸入，沙丁胺醇气雾剂 100 μ g pm 吸入，氨氯地平片 5mg qd 口服及硝酸甘油片 0.5mg pm 舌下含服。

A: 硝酸甘油剂量不足

B: 沙丁胺醇的不良反应

C: 布地奈德剂量太大

D: 氨氯地平的不良反应

答案：B

9. 开具新药或增加药物前需考虑患者总体情况和药物相互作用，是指

A: 修订医嘱及时沟通

B: 医嘱清楚准确

C: 医嘱完整不漏项

D: 实现个体化治疗

答案：D

10. 血糖正常、尿葡萄糖阳性可以提示患者可能

A: 伴心肌梗死

B: 伴肾性肾小球肾炎

C: 伴活动性指端肥大症

D: 伴甲状腺功能亢进

答案：B

11. 弥漫性青铜色色素沉着

- A: 博来霉素
- B: 氟尿嘧啶
- C: 柔红霉素
- D: 白消安

答案：D

12. 用于估算透析清除率的是（）

- A: CoCkroft-GAut 公式
- B: CoChrAnE 分级
- C: CLHD 公式
- D: NCEMERP 标准

答案：C

13. 患者，男，70 岁，2 周前因缺血性脑卒中入院，经积极治疗，病情显著缓解后出院，目前无其他伴随疾病，为进行心脑血管事件的二级预防，应首选的药物是

- A: 阿司匹林
- B: 氯吡格雷
- C: 肝素
- D: 利伐沙班

答案：A

14. 患者，男，1 岁，近期出现乏力、下肢步态不稳、行走困难、嗜睡。经临床检查，各项血细胞均偏低；血涂片中可见多数大卵圆形的红细胞，中性粒细胞分叶过多，可见 5 叶或 6 叶以上的分叶，偶可见巨大血小板。确诊为巨幼细胞贫血，应给予的治疗药物是

- A: 叶酸片、维生素 B12 片
- B: 硫酸亚铁片

C: 输入新鲜血浆

D: 促红细胞生成素注射剂

答案：A

15. 沿疗滴虫性阴道炎首选的药物是()

A: 吡哆美辛栓

B: 伏立康唑片

C: 莫匹罗星软膏

D: 甲硝唑栓

答案：D

16. 患者,男,60岁,因轻度冻疮(无破溃)到药店购药,药师应推荐的药品是()

A: 特比萘芬乳膏

B: 10%樟脑软膏

C: 利巴韦林软膏

D: 氢化可的松软膏

答案：B

17. 血清淀粉酶检查超过正常值

A: 诊断痛风

B: 诊断心肌梗死

C: 诊断急性胰腺炎

D: 诊断消化性溃疡

答案：C

18. 可能引起肺间质病变的药物是()

A: 羟氯喹

- B: 硫唑嘌呤
- C: 甲氨蝶呤
- D: 柳氮磺吡啶

答案：C

19. 药学服务的对象涉及面广，其服务中心是()。

- A: 以医师为中心的药学服务
- B: 以药师为中心的药学服务
- C: 以医院为中心的药学服务
- D: 以患者为中心的药学服务

答案：D

20. 同时具有短效和长效(双时相)作用的胰岛素/胰岛素类似物是

- A: 低精蛋白锌胰岛素
- B: 甘精胰岛素
- C: 普通胰岛素
- D: 预混胰岛素

答案：D

21. 治疗结核病的患者的注意事项错误的是

- A: 充分了解抗结核药物服用中可能出现的不良反应，一旦出现要及时报告医生
- B: 患者所用食具应于餐后煮沸消毒
- C: 口服抗结核药可自行决定饭后服用
- D: 增强体质增加高蛋白和维生素的摄入，日光浴

答案：C

22. 在中成药活胃胶囊、神曲胃痛片、陈香白露片、复方陈香味片、复方田七胃痛片中，所含有的共同组分是

- A: 氢氧化铝
- B: 氧化镁
- C: 碳酸镁
- D: 碳酸氢钠

答案：D

23. 对主要临床表现和体征进行明确、具体的描述；如过敏性皮疹的类型、性质、部位、面积大小等

- A: ADR / ADE 过程描述
- B: 用药起止时间
- C: 用药原因
- D: 不良反应 / 事件的结果

答案：A

24. 抑制前列腺内双氢睾酮水平，达到降低雄激素水平，提高最高尿流率的是（）

- A: 索利那新
- B: 特拉唑嗪
- C: 哌唑嗪
- D: 度他雄胺

答案：D

25. 心血管疾病患者感冒时退热建议选用的药物是

- A: 金刚烷胺
- B: 布洛芬
- C: 奥司他韦

D: 对乙酰氨基酚

答案：D

26. 脂溶性中等，作用持续 3~6h 的是

A: 硫喷妥

B: 苯巴比妥

C: 戊巴比妥

D: 巴比妥

答案：C

27. 妊娠期妇女甲亢首选

A: 碘化钾

B: 丙硫氧嘧啶

C: 放射性 ^{131}I

D: 甲巯咪唑

答案：B

28. 长期应用苯二氮类药物不能突然停止使用，是因为（）

A: 首剂效应

B: 后遗效应

C: 药物依赖

D: 毒性反应

答案：C

29. 不宜选用静脉滴注 5%碳酸氢钠注射液碱化尿液的情况是

A: 苯妥英钠中毒

B: 异戊巴比妥中毒

C: 司可巴比妥中毒

D: 苯巴比妥中毒

答案：B

30. 药品不良反应按照程度分为轻度、中度、重度三级。

A: 没有临床症状，无需治疗

B: 指轻微的反应或疾病，症状不发展，一般无需治疗

C: 指不良反应症状不明显，重要器官或系统功能有轻度损害

D: 指不良反应症状明显，重要器官或系统功能有中度损害

答案：D

31. 某患者，女，45 岁，身高 160cm，体重 75kg，临床诊断为 2 型糖尿病。实验室检查：空腹血糖 8.7mmol/L，餐后 2 小时血糖 13.1mmol/L，糖化血红蛋白 7.1%。经饮食控制、规律锻炼，血糖控制仍未达到理想水平。

A: 二甲双胍

B: 胰岛素+二甲双胍

C: 胰岛素

D: 格列齐特

答案：A

32. 药库接受了一批药品，其中需要在冷处贮存的是

A: 西地碘片

B: 硫普罗宁片

C: 乳酶生片

D: 双歧三联活菌胶囊

答案：D

33. 属于浓度依赖性抗生素的是

- A: 青霉素
- B: 林可霉素
- C: 多黏菌素
- D: 美沙拉秦肠溶片

答案：C

34. 引起发冷、寒战、面部和四肢发绀，继而发热等输液反应的 DMARDs 是

- A: 利妥昔单抗
- B: 硫唑嘌呤
- C: 氯喹
- D: 环孢素

答案：A

35. 药物经济学研究的 4 种方法的主要差别在于

- A: 对于用药结果的不同测量
- B: 所采用的实验研究方法不同
- C: 计算不同类型的成本
- D: 用药成本的不同测量上

答案：A

36. ADR 报告表对不良反应的主要临床表现和体征进行明确、具体的描述；如过敏性皮疹的类型、性质、部位、面积大小等；所对应的项目是

- A: 不良反应 / 事件的结果
- B: ADR / ADE 过程描述
- C: 用药原因
- D: 用药起止时间

答案：B

37. 用半衰期较长的药物或缓控释制剂，每日 1 次给药

- A: 使用分时药盒和用药记录
- B: 使患者了解药物的重要性
- C: 针对患者生理及心理特点选药
- D: 简化治疗方案

答案：D

38. 大剂量或连续使用顺铂导致

- A: 前列腺素合成障碍
- B: 肾小管坏死
- C: 阻塞肾小管、肾小球
- D: 肾间质纤维化

答案：B

39. 某批次青霉素钠原料 1mg 相当于 1670 单位效价，生产规格为 80 万 U 支的青霉素钠产品，每支所需的装量是（）

- A: 0.48g
- B: 1.33g
- C: 1.33mg
- D: 2.088mg

答案：A

40. 处方是医疗活动中关于药品调剂的重要书面文件。处方按其性质分为法定处方和医师处方。《处方管理办法》还将处方分为麻醉药品处方、急诊处方、儿科处方、普通处方等。印刷用纸根据实际需要用颜色区分，并在处方右上角以文字注明。

- A: 病区领药单
- B: 临床诊断书
- C: 药品出库单
- D: 病区用药医嘱单

答案：D

41. 患者，女，32 岁，2 天前无明显诱因出现尿频、尿急、尿痛，伴腰痛。查体：T38℃，肾区叩击痛。血常规见 WBC $15 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞百分比 85%。尿常规见尿液浑浊，尿蛋白阳性，镜检白细胞满视野。

- A: 左氧氟沙星
- B: 克林霉素
- C: 罗红霉素
- D: 庆大霉素

答案：A

42. “沟通技能”在药学服务工作中最重要的作用是

- A: 用药监督作用
- B: 药物警戒作用
- C: 双向交流作用
- D: 应对投诉作用

答案：C

43. 静脉滴注青霉素的适宜溶媒是

- A: 复方氯化钠注射液
- B: 5%葡萄糖注射液
- C: 50%葡萄糖注射液
- D: 0.9%氯化钠注射液

答案：D

44. 细菌感染性腹泻患者宜选用

- A: 乳果糖
- B: 干酵母
- C: 阿苯达唑
- D: 小檗碱

答案：D

45. (2018 年真题) 干眼症可选用 ()

- A: 玻璃酸钠滴眼液
- B: 色甘酸钠滴眼液
- C: 七叶洋地黄双苷滴眼液
- D: 氧氟沙星滴眼液

答案：A

46. 下列药物中，可引起黑便的药物为 ()

- A: 铝碳酸镁
- B: 复方氢氧化铝
- C: 枸橼酸铋钾
- D: 硫糖铝片

答案：C

47. 患者，女，30 岁，情感低落、反应迟钝半年余，晨重夜轻，临床诊断为抑郁症。

- A: 2 周
- B: 1 周
- C: 4 周

D: 3 周

答案：A

48. 淋巴细胞正常参考区间是

A: 0.01~0.05

B: 0.03~0.08

C: 0~0.01

D: 0.20~0.40

答案：D

49. 毒物种类很多，中毒方式各异，虽然有的毒物中毒尚无特效解毒药，但救治原则基本相同。

A: 硫喷妥钠

B: 巴比妥

C: 苯巴比妥

D: 异戊巴比妥

答案：D

50. 关于粪胆原和粪隐血叙述正确的是

A: 正常情况下，粪便中的粪胆原检查呈阳性反应

B: 粪胆原大部分以原形的形式经直肠被排出体外

C: 一般情况下，粪便中可见红细胞，但检测结果通常为阴性

D: 只有在消化道出现溃疡的情况下，才会粪隐血呈阳性

答案：A

51. 关于尿路感染的说法，不正确的是

A: 多见于育龄期和绝经后女性

B: 男性发病率稍高

C: 由细菌感染引起

D: 大肠杆菌感染最为常见

答案: B

52. 患者男,70 岁高血压病史 14 年,服用依那普利 20mg/日,平时血压控制不佳今晨大便时突然出现头疼、头晕,随即出现右侧肢体活动不利。血压为 190/100mmHg,头颅 CT 检查结果为左侧脑出血,出血量约 10ml,拟采用内科治疗,该患者首先应采取的治疗措施是 ()

A: 静脉滴注甘露醇注射液

B: 肌肉注射利血平注射液

C: 口服氨氯地平片

D: 静脉滴注硝酸甘油注射液

答案: A

53. 滴虫性阴道炎

A: 甲硝唑

B: 咪康唑

C: 庆大霉素

D: 聚甲酚磺醛

答案: A

54. 某女性,64 岁,既往高血压病病史 15 年,活动后心悸、气短 3 年,2 小时前无明显诱因突发发生喘憋。体检:端坐体位,BP190/110mmHg,R30 次/分,Bp108 次/分,心界向左侧扩大,双肺可闻及广泛湿啰音。

A: 硝苯地平

B: 多索茶碱

C: 西地兰

D: 硝普钠

答案: C

55. 宜睡前应用，用药后 1~2 小时不应排尿的是

A: 含漱剂

B: 舌下片

C: 咀嚼片

D: 阴道栓剂

答案: D

56. 患者，男，66 岁，帕金森病史 3 年，服用复方左旋多巴控制病情，药师对患者及其家属进行的用药指导错误的是

A: 早、中餐应高蛋白饮食，减少碳水化合物的摄入

B: 不能自行停药或随意改变剂量

C: 应避免同时进食蛋白质类食物，应隔开 2~3h

D: 为达到治疗效果，应小剂量滴定增量

答案: A

57. 患者，男，65 岁，患有骨质疏松症，根据患者饮食习惯，每日需补充元素钙 600mg，药师为其推荐碳酸钙(0.5g/片)，该患者适宜的用法用量是()

A: 4 片 qd

B: 6 片 qd

C: 2 片 tid

D: 1 片 tid

答案: D

58. 阿托品与小活络丹合用

- A: 合用抑制呼吸，易致呼吸衰竭
- B: 合用后增加毒性，出现药物中毒
- C: 合用后抑制后者吸收，降低疗效
- D: 两者合用作用相反，互相降低药效

答案：B

59. 下列药学服务的对象中，不属于药学服务的特殊人群是

- A: 血液透析者
- B: 住院患者
- C: 特殊体质者
- D: 小儿、老人

答案：B

60. 《中国药典》规定"凉暗处"除避光外，温度不应超过（）

- A: 4℃
- B: 10℃
- C: 15℃
- D: 20℃

答案：D

61. （2017 年真题）患者女，6 岁，因发热体温 38.6℃、头痛、鼻塞、流涕咳嗽、无痰就诊。实验室检查：白细胞、中性粒细胞计正常。临床诊断为普通感冒。

- A: 维生素 C 片
- B: 葡萄糖酸锌口服液
- C: 感冒清热冲剂
- D: 头孢克洛干混悬剂

答案：D

62. 治疗抗肿瘤药物引起的恶心、呕吐等不良反应。可选用的止吐药物是

- A: 昂丹司琼
- B: 奥美拉唑
- C: 雷尼替丁
- D: 维生素 B6

答案：A

63. 观察人体对新药的耐受程度和药动学评价阶段是

- A: IV 期临床试验
- B: III 期临床试验
- C: I 期临床试验
- D: II 期临床试验

答案：C

64. (用药导致的血常规异常) 甲基多巴

- A: 血小板减少
- B: 血红蛋白量增多
- C: 中性粒细胞减少
- D: 嗜酸性粒细胞减少

答案：D

65. 丙烯腈、氟化物、一氧化碳、重金属等中毒的特殊解毒剂

- A: 纳洛酮
- B: 乙酰半胱氨酸
- C: 谷胱甘肽
- D: 二巯丁二钠

答案：C

66. 除胰岛功能低下外，主要引起血糖超过正常参考区间高限的疾患是

- A: 肝癌、重症肝炎
- B: 激素分泌功能衰退
- C: 肾功能衰减
- D: 激素分泌功能亢进

答案：D

67. 具有降低 TC、LDL-C 和 TG，升高 HDL-C 的作用的是（）

- A: 普罗布考
- B: 他汀类
- C: 烟酸类
- D: 依折麦布

答案：C

68. 在病情危重抢救时最常用的是

- A: 直肠给药
- B: 肌肉注射
- C: 口服给药
- D: 静脉注射

答案：D

69. 患者，女，55 岁，因"反复发作胸骨后疼痛 2 年，伴反酸，胃灼热，间断积食"而就诊。食管测压提示食管下括约肌(LES)压力<6mmHg，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病，医师处方：奥美拉唑肠溶片 20mgbid 强化抑酸治疗。

- A: 适宜餐前 30 分钟服用

B: 应正片吞服

C: 长期用药后可能会出现维生素 K 缺乏

D: 用药后可能出现口干，便秘等不良反应

答案：C

70. (2018 年真题) 患者, 女, 68 岁, 体重 45kg, 因发热、咳嗽咳痰入院治疗, 临床诊断为社区获得性肺炎。化验结果: 白细胞计数

$11.76 \times 10^9/L$, 肌酐清除率 18ml/min 。该患者使用下列抗菌药物治疗时不需要减量的是 ()

A: 阿莫西林

B: 头孢噻肟钠

C: 左氧氟沙星

D: 莫西沙星

答案：D

71. 贮存温度在 2°C 以上时, 温度越低, 对多数药品保管越有利。降钙素鼻喷雾剂说明书标明“冷处”贮存, 其贮存条件是指

A: 温度不超过 20°C

B: 温度在 $10^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ 之间

C: 温度在 $2^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ 之间

D: 避光, 温度不超过 -5°C

答案：C

72. 下列疾病中, WHO 视为艾滋病最常见的机会性感染的是

A: 腹泻

B: 肺炎

C: 结核病

D: 卡氏肉瘤

答案：C

73. 抗凝治疗

- A: 阿司匹林
- B: 低分子肝素
- C: 阿替普酶
- D: 巴曲酶

答案：B

74. (治疗消化性溃疡的胃黏膜保护剂)可促进胃黏膜-黏液分泌与内源性前列腺素生成的药物是 ()

- A: 碳酸镁
- B: 硫糖铝
- C: 米索前列醇
- D: 雷贝拉唑

答案：C

75. 后记

- A: 对药物治疗的建设性意见与结果评价
- B: 临床诊断、费别
- C: 主要实验室数据
- D: 医师签名、药品金额

答案：D

76. 患者，男，32 岁。急性铅中毒，应用硫酸镁导泻，适宜的给药途径是

- A: 静脉注射
- B: 直肠给药

C: 吸入给药

D: 口服给药

答案: D

77. 真菌引起阴道炎 ()

A: 咪康唑

B: 甲硝唑

C: 聚甲酚磺醛

D: 庆大霉素

答案: A

78. 患者，男，48 岁。十二指肠溃疡病史 2 年，近感头痛、眩晕而就诊。查体：血压 160/100mmHg。经一段时间观察及定期检查后，医师诊断为高血压病。

A: 氢氯噻嗪

B: 可乐定

C: 胍屈嗪

D: 利血平

答案: D

79. 对流行性结膜炎可选用

A: 硫酸锌滴眼液

B: 杆菌肽眼膏

C: 碘苷滴眼液

D: 1%泼尼松龙滴眼液

答案: C

80. (2016 年真题) 甲状腺功能亢进患者服用丙硫氧嘧啶，可引起的典型药源性疾病是 ()。

- A: 慢性肾衰竭
- B: 粒细胞减少症
- C: 消化性溃疡
- D: 溶血性贫血

答案：B

81. 患者用药咨询的内容是

- A: 栓剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法
- B: 减肥、补钙、补充营养素
- C: 不宜选用氯化钠注射液溶解的药品
- D: 抗菌药物的合理使用

答案：A

82. 稳定型心绞痛发作时的治疗选用

- A: 氯贝丁酯
- B: 硝酸甘油
- C: 低分子肝素
- D: 阿司匹林

答案：B

83. 服用头孢曲松、甲硝唑、氯丙嗪等应该禁用的是

- A: 烟
- B: 食醋
- C: 酒
- D: 浓茶

答案：C

84. 患者,男,80 岁,临床诊断为前列腺增生,给予多沙唑嗪治疗。药师对该患者的用药指导正确的是()

- A: 睡前服用,起床站立时应缓慢,预防体位性低血压
- B: 睡前服用,注意监测肾功能
- C: 睡前服用,定期监测肝功能
- D: 每日服用一次,定期监测血糖,防止发生低血糖反应

答案: A

85. 被认为是动脉粥样硬化的主要致病因子的是

- A: 三酰甘油酯
- B: 总胆固醇
- C: 极高密度脂蛋白胆固醇
- D: 低密度脂蛋白胆固醇

答案: D

86. 处方中"餐前给药"的外文缩写是

- A: qn
- B: pc
- C: ac
- D: po

答案: C

87. 患者,男,72 岁,以“间断发热、纳差、精神抑郁半年,再发高热 1 天”为主诉入院,既往体健,无高血压、糖尿病、冠心病史。入院时查体: T36.9℃, P88 次/分, R22 次/分, BP112 / 77mmHg, 可触及颈部、锁骨上、腋下多部位浅表淋巴结肿大。经实验室检查、影像学检查,确诊为非霍奇金淋巴瘤。

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/978102074004007024>