

普通外科专科理论考试试题

一、选择题

1. 关于低钾血症的病因，下列哪项是错误的（ ） [单选题] *

A . 频繁呕

B . 长期胃肠减压

C . 急性肾功能衰竭✓

D . 碱中毒

E . 注射大量葡萄糖和胰岛素

2. 当病人输入大量库存血后容易出现（ ） [单选题] *

A . 低血钾

B . 低血钙

C . 低血钠

D . 高血钠

E . 高血钾✓

3. 高钾血症是指血钾超过（ ） [单选题] *

A . 3.5 mmol / L

B . 4mmol / L

C . 4.5 mmol / L

D . 5 mmol / L

E . 5 . 5mmol / L✓

4. 肠痿引起的酸碱失衡类型是 () [单选题] *

A . 低钾低氯性碱中毒

B . 呼吸性碱中毒

C . 呼吸性酸中毒

D . 代谢性碱中毒

E . 代谢性酸中毒✓

5. 观察休克病情变化最简便有效的指标是 () [单选题] *

A . 生命体征

B . 神志

C . 尿量✓

D . 皮肤色泽

E . 中心静脉压

6. 发生多系统器官功能障碍时，最先受累的器官是 () [单选题] *

A . 心

B . 肺✓

C . 肾

D . 脑

E . 肝

7. 休克病人快速输液时，应警惕 () [单选题] *

A . 局部胀痛

B . 液体渗出血管外

C . 血液过度稀释

D . 肺水肿及心力衰竭✓

E . 血压升高

8. 休克病人采取中凹位，其目的是（ ）[单选题] *

A . 增加回心血量

B . 有利于呼吸

C . 减轻腹痛

D . 减轻下肢水肿

E . 增加回心血量及减轻呼吸困难✓

9. 硬膜外麻醉最严重的并发症是（ ）[单选题] *

A . 血压下降

B . 血管扩张

C . 尿潴留

D . 全脊髓麻醉✓

E . 呼吸变慢

10. 下列哪种麻醉方法不是局部麻醉（ ）[单选题] *

A . 表面麻醉

B . 局部浸润麻醉

C . 局域阻滞麻醉

D . 吸入麻醉✓

E . 神经阻滞

11. 预防全麻病人发生误吸的主要措施是（ ）[单选题] *

A . 选择静脉麻醉

B . 术前用阿托品

C . 术前用止吐药

D . 术前禁食禁饮✓

E . 术前放置胃管

12. 全身麻醉患者清醒前最危险的意外及并发症是 () [单选题] *

A . 呕吐物窒息✓

B . 体温过低

C . 坠床

D . 引流管脱出

E . 意外损伤

13. 关于全麻后的护理，下列叙述哪项不正确(E)[单选题] *

A . 病人未完全清醒，取侧卧位或去枕平卧✓

B . 长时间未清醒时，应定时翻身

C . 保持呼吸道通畅

D . 监测血压、呼吸 E . 清醒病人可常规进食

14. 腰麻后病人去枕平卧 6 ~ 8h 主要是预防 () [单选题] *

A . 头痛 C . 低血压 E . 腰痛✓

C . 低血压 E . 腰痛

C . 低血压 E . 腰痛 B . 呕吐

E . 腰痛 B . 呕吐

E . 腰痛 B . 呕吐 D . 切口痛

15. 手术前期是指 () [单选题] *

- A . 病人患病至手术前
- B . 决定手术治疗起至进入手术室✓
- C . 术前 2
- d
- E . 送手术通知单至手术时

16. 属于择期手术的是 () [单选题] *

- A . 直肠癌根治术
- B . 慢性阑尾炎急性发作
- C . 脾破裂
- D . 腹股沟疝修补术✓
- E . 胃溃疡穿孔修补术

17. 属于限期手术的是 () [单选题] *

- A . 直肠癌根治术✓
- B . 强直性脊柱炎行髋关节置换术
- C . 大隐静脉高位结扎术
- D . 腹股沟疝修补术
- E . 胃溃疡穿孔修补术

18. 拔出胃肠减压管最可靠的指征是 () [单选题] *

- A . 体温正常
- B . 腹胀消失
- C . 肛门排气✓
- D . 肠蠕动恢复

E . 吸出液体量少

19. 术后早期活动的优点，下列哪项不对（ ）[单选题] *

A . 减少血栓性静脉炎的发生

B . 减少伤口感染的机会✓

C . 减少肺部并发症

D . 防止腹胀.便秘

E . 促进排尿功能的恢复

20. 术后尿潴留的处理，首先是（ ）[单选题] *

A . 严格无菌操作下导尿

B . 诱导排尿✓

C . 耻骨上穿刺

D . 禁饮水

E . 应用利尿剂

21. 利用体质指数判断营养不良的标准是（ ）[单选题] *

A . <16.5 为消瘦， ≥ 20 为超重

B . <18.5 为消瘦， ≥ 20 为超重

C . <18.5 为消瘦， ≥ 24 为超重✓

D . <20.5 为消瘦， ≥ 24 为超重

E . <20.5 为消瘦， ≥ 25 为超重

22. 胃肠内外营养支持的代谢并发症有（ ）[单选题] *

A . 脓毒症

B . 空气栓塞

C . 静脉炎、血栓形成

D . 气胸、血胸

E . 低血糖✓

23. 乳腺癌常常发生于乳腺的哪个部位 () [单选题] *

A . 乳腺外上象限✓

B . 乳腺内上象限

C . 乳腺外下象限

D . 乳晕内

E . 乳腺内下象限

24. 乳腺癌淋巴道转移最常转移至 () [单选题] *

A . 腋窝淋巴结✓

B . 锁骨下淋巴结

C . 锁骨上淋巴结

D . 胸骨旁淋巴结

E . 胸导管

25. 最常见的腹外疝是 () [单选题] *

A . 腹股沟斜疝✓

B . 腹股沟直疝

C . 股疝

D . 脐疝

E . 切口疝

26. 腹外疝的发病基础是 () [单选题] *

- A . 营养不良
- B . 腹壁薄弱或缺损✓
- C . 腹内压增高
- D . 腹部穿透伤
- E . 继发于腹部内脏损伤

27. 以下哪种原因不引起腹内压力增高 () [单选题] *

- A . 举重
- B . 腹水
- C . 腹泻✓
- D . 排尿困难
- E . 慢性咳嗽

28. 腹外疝最常见的疝内容物是 () [单选题] *

- A . 大网膜
- B . 膀胱
- C . 小肠✓
- D . 直肠
- E . 乙状结肠

29. 疝内容物被嵌顿时间较久 , 发生血循环障碍而坏死称为 () [单选题] *

- A . 难复性疝
- B . 嵌顿性疝
- C . 绞窄性疝✓
- D . 易复性疝

E．滑动性疝

30. 绞窄性疝与嵌顿性疝的主要区别是（ ）[单选题] *

A．疝块的大小

B．疝内容物能否回纳

C．是否出现肠梗阻

D．疝块有无压痛

E．疝内容物有无血运障碍✓

31. 疝内容物与疝囊发生粘连而不能完全回纳入腹腔的疝是（ ）[单选题] *

A．易复性疝

B．滑动性疝

C．难复性疝✓

D．嵌顿性疝

E．绞窄性疝

32. 斜疝修补术后早期，最适宜的卧位是（ ）[单选题] *

A．半卧位

B．仰卧位，膝部垫枕✓

C．俯卧位

D．斜坡卧位

E．侧卧位

33. 腹股沟斜疝术后伤口压沙袋和用丁字带托起阴囊的目的是（ ）[单选题] *

A．防止切口裂开

B．防止阴囊水肿✓

C . 防止切口感染

D . 防止术后复发

E . 防止切口水肿

34. 下列哪项不是腹膜炎病人采用半卧位的目的 () [单选题] *

A . 利于渗液积聚于盆腔

B . 利于腹肌松弛 , 以减轻疼痛

C . 防止下肢静脉血栓形成✓

D . 利于炎症局限及引流

E . 利于呼吸及循环

35. 急性腹膜炎治疗后最常见的残余脓肿是 () [单选题] *

A . 膈下脓肿

B . 盆腔脓肿✓

C . 肠间隙脓肿

D . 肝脓肿

E . 脾脏周围脓肿

36. 急性腹膜炎腹痛的特点是 () [单选题] *

A . 阵发性绞痛

B . 持续性疼痛阵发性加剧

C . 腹痛向肩胛部放射

D . 持续性剧烈疼痛✓

E . 钻顶样绞痛

37. 下列哪组症状应怀疑膈下脓肿 () [单选题] *

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/978105051053006033>